

# Tentamen Dynamische Systemen

29 juni 2011

Begin ieder van de drie hoofdopgaven op een nieuw vel en zet daarop je naam en studentnummer. Daar waar een plaatje is gegeven, mag je gebruik maken van ‘graphical analysis’, ofwel kijken naar het plaatje. Anders niet, tenzij dit anders aangegeven is. Resultaten uit het boek ‘An introduction to chaotic dynamical systems’ van Robert L. Devaney mogen gebruikt worden, tenzij deze expliciet gevraagd worden. Een grafische rekenmachine is niet toegestaan.

## Opgave 1

Beschouw de afbeelding  $f : S^1 \rightarrow S^1 : e^{i\theta} \mapsto e^{4i\theta}$ . Hierbij is  $S^1$  de eenheidscirkel in het complexe vlak  $\mathbb{C}$  bestaande uit punten van de vorm  $e^{i\theta}$ . De afbeelding  $f$  verviervoudigt dus de hoek van een punt.

We weten dat het dynamische systeem dat door  $f$  wordt gegeven chaotisch is. De topologische transitiviteit bijvoorbeeld volgt uit het feit dat er voor elk segment  $I$  van de cirkel  $S^1$  een  $n$  is zodat  $f^n(I) = S^1$ .


Beschouw nu  $g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 8x^4 - 8x^2 + 1$ . Er geldt  $g([-1, 1]) = [-1, 1]$ . Met behulp van de chaos van  $f$  zullen we laten zien dat de afbeelding  $g : [-1, 1] \rightarrow [-1, 1]$  een chaotisch dynamisch systeem geeft. Zij  $h : S^1 \rightarrow [-1, 1] : e^{i\theta} \mapsto \cos(\theta)$ . Merk op dat  $h$  continu is maar niet bijtief.

- (a) **(5ptn)** Laat zien dat  $h \circ f = g \circ h$ .
- (b) **(10ptn)** Laat zien dat  $g$  gevoelige afhankelijkheid van beginvoorwaarden heeft.
- (c) **(10ptn)** Laat zien dat de periodieke punten van  $g$  dicht liggen in  $[-1, 1]$ .

## Opgave 2

Zij  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  de functie gegeven door

$$f(x) = \begin{cases} 5x & \text{als } x \leq \frac{3}{10}, \\ -5x + 3 & \text{als } \frac{3}{10} \leq x \leq \frac{7}{10}, \\ 5x - 4 & \text{als } x \geq \frac{7}{10}. \end{cases} \quad (1)$$



Figuur 1: De grafiek van  $f$ .

In Figuur 1 is de grafiek van  $f$  afgebeeld. In deze opgave zullen we de dynamica van  $f$  op de verzameling

$$\Lambda = \{x \in [0, 1] \mid \forall n \in \mathbb{N} : f^n(x) \in [0, 1]\} \quad (2)$$

bestuderen door ze in verband te brengen met een eenvoudiger dynamisch systeem.

Hiertoe definiëren we de ruimte  $\Sigma_3$  van rijtjes bestaande uit nullen, enen en tweeën, d.w.z.

$$\Sigma_3 := \{\mathbf{s} = (s_0 s_1 s_2 s_3 s_4 \dots) \mid s_i \in \{0, 1, 2\}\} \quad (3)$$

en de afbeelding  $\sigma : \Sigma_3 \rightarrow \Sigma_3 : (s_i)_{i \in \mathbb{N}} \mapsto (s_{i+1})_{i \in \mathbb{N}}$ . Op  $\Sigma_3$  is er de metriek

$$d(\mathbf{s}, \mathbf{t}) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{|s_i - t_i|}{3^i}. \quad (4)$$

(a) **(10ptn)** Laat zien dat  $\sigma$  continu is.

Voor de volgende deelvraag mag je gebruik maken van het volgende feit. Zij  $\mathbf{s}, \mathbf{t} \in \Sigma_3$  met  $s_i = t_i$  voor  $i = 0, 1, \dots, n$ . Voor de afstand tussen  $\mathbf{s}$  en  $\mathbf{t}$  geldt dan de afchatting  $d(\mathbf{s}, \mathbf{t}) \leq 3^{-n}$ . Indien geldt dat  $d(\mathbf{s}, \mathbf{t}) < 3^{-n}$  dan volgt dat  $s_i = t_i$  voor  $i = 0, 1, \dots, n$ .

(b) **(10ptn)** Laat zien dat er een dichte baan van  $\sigma$  in  $\Sigma_3$  bestaat.

Om de twee dynamische systemen met elkaar in verband te brengen definiëren we de volgende intervallen:

$$I_0 = [0, \frac{1}{5}], \quad I_1 = [\frac{2}{5}, \frac{3}{5}] \quad \text{en} \quad I_2 = [\frac{4}{5}, 1]. \quad (5)$$

en de afbeelding  $S : \Lambda \rightarrow \Sigma_3$  waarbij  $S(x) = (s_0 s_1 s_2 \dots)$  en  $s_i$  gegeven wordt door  $f^i(x) \in I_{s_i}$ .

(c) **(10ptn)** Laat zien dat  $S$  injectief is.

(d) **(5ptn)** Laat zien dat  $S \circ f|_\Lambda = \sigma \circ S$ .

### Opgave 3

We beschouwen de familie  $\{f_\lambda\}_{\lambda \in \mathbb{R}}$  van functies

$$f_\lambda : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \lambda \arctan(x) \quad (6)$$

en de familie  $\{g_\mu\}_{\mu \in \mathbb{R}}$  van functies

$$g_\mu : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2 + (2 - \mu)x - 2\mu = (x + 2)(x - \mu). \quad (7)$$

(a) **(10ptn)** Teken een plaatje van de grafiek van  $f_{-1}$ . Laat zien dat  $\lambda = -1$  een bifurcatiepunt is en benoem het type bifurcatie.

(b) **(10ptn)** Teken een plaatje van de grafiek van  $g_{-2}$ . Bereken de twee zadelbifurcatiepunten  $\mu_1$  en  $\mu_2$ .

(c) **(10ptn)** Laat zien dat  $g_{-2}$  niet topologisch geconjugeerd kan zijn met  $g_{-10}$  en ook niet met  $g_{10}$ .