

# Groepentheorie voor natuurkundigen

G.J. Heckman  
Mathematisch Instituut KUN  
Nijmegen

Voorjaar 2002

## Inhoud

- §1. Groepen en ondergroepen.
- §2. Nevenklassen en conjugatieklassen.
- §3. Normaaldelers en homomorfismen.
- §4. Representaties.
- §5. Karakters.
- §6. Karaktertabellen van enkele groepen.
- §7. Moleculaire trillingen.

Groepentheorie is de wiskundige taal die ten grondslag ligt aan het begrip symmetrie. In de eerste 6 paragrafen wordt uitgelegd hoe deze taal in beginsel moet worden gesproken. In de slotparagraaf wordt een toepassing besproken afkomstig van Wigner in 1930 ter bepaling van het vibratiespectrum van een symmetrisch molecuul zoals  $NH_3$ ,  $CH_4$  of  $C_{60}$ . Er zijn veel andere toepassingen van groepentheorie in de natuurkunde te noemen bijvoorbeeld in de kristallografie of de theorie van elementaire deeltjes. Niet voor niets dragen een aantal groepen de namen van bekende natuurkundigen zoals Galilei, Lorentz, Poincaré, Heisenberg en de Sitter. Een goed boek over dit onderwerp is S. Sternberg, *Group theory and physics*, Cambridge University Press, 1994. Met name voor een vervolgstudie op hetgeen in deze syllabus wordt uitgelegd is dit boek een aanrader.



# 1 Groepen en ondergroepen

**Definitie 1.1** Een *groep*  $G$  is een verzameling  $G$  waarin voor elk paar elementen  $a, b \in G$  een element  $ab \in G$  (genaamd het *product* van  $a$  en  $b$ ) is voorgeschreven zodat

1.  $(ab)c = a(bc) \forall a, b, c \in G$ ,
2.  $\exists e \in G$  met  $ea = ae = a \forall a \in G$ ,
3.  $\forall a \in G \exists a^{-1} \in G$  met  $aa^{-1} = a^{-1}a = e$ .

De afbeelding  $G \times G \ni (a, b) \mapsto ab \in G$  heet de *productregel* of *vermenigvuldiging* van de groep  $G$ . De eerste eigenschap heet de *associativiteit* van de vermenigvuldiging. Het element  $e \in G$  heet het *eenheidselement* van  $G$ , en  $a^{-1}$  heet de *inverse* van  $a$ . Het aantal elementen van een groep  $G$  heet de *orde* van  $G$ , en wordt genoteerd  $|G|$ . Twee elementen  $a, b \in G$  *commuteren* als  $ab = ba$ . Een groep waarvan elk tweetal elementen commuteert heet *abels* of *commutatief*.

**Opmerking 1.2** Soms wordt het product  $ab$  van  $a$  en  $b$  ook aangegeven met  $a \cdot b$  of ook  $a + b$ , maar deze laatste notatie alleen voor een abelse groep en  $a + b$  heet dan de som van  $a$  en  $b$ . Evenzo spreekt men dan over het nulelement  $n$  (i.p.v. de eenheid  $e$ ) en de tegengestelde  $-a$  (i.p.v. de inverse  $a^{-1}$ ).

**Opmerking 1.3** De volgende uitspraken kunnen eenvoudig worden afgeleid uit de definitie van een groep  $G$ .

1. Er is precies één eenheidselement  $e$ .
2. Elk element  $a$  heeft precies één inverse  $a^{-1}$ .
3.  $\forall a, b \in G$  geldt  $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ .
4. De uitkomst van een product van drie of meer elementen is onafhankelijk van hoe de haakjes geplaatst zijn (en om deze reden zullen we in een herhaald product dan ook geen haakjes meer schrijven).

**Voorbeeld 1.4** Zij  $F = \mathbb{Z}, \mathbb{R}$  of  $\mathbb{C}$ . De *optelgroep van  $F$*  is als verzameling  $F$  met groepsbewerking optellen.

**Voorbeeld 1.5** Zij  $F = \mathbb{R}$  of  $\mathbb{C}$ . De *vermenigvuldigingsgroep  $F^\times$  van  $F$*  is als verzameling  $F^\times = F - \{0\}$  met groepsbewerking vermenigvuldigen.

**Voorbeeld 1.6** Zij  $F = \mathbb{R}$  of  $\mathbb{C}$  en  $V$  een vectorruimte over  $F$  van dimensie  $n < \infty$ . De verzameling

$$GL(V) = \{A : V \rightarrow V; A \text{ is lineair, } \det(A) \neq 0\}$$

vormt een groep met als productregel samenstellen van lineaire afbeeldingen. Deze groep  $GL(V)$  heet de *algemene lineaire groep* van  $V$  (in het engels general linear group). Nemen we  $V = F^n$  dan krijgen we

$$GL_n(F) = \{A \in \text{Mat}_n(F); \det(A) \neq 0\}$$

met als productregel matrixvermenigvuldigen. De groep  $GL_n(F)$  is de algemene lineaire groep over  $F$  in dimensie  $n$ . Merk op dat  $GL_1(F) = F^\times$ .

**Voorbeeld 1.7** Zij  $V_4 = \{e, a, b, c\}$  een verzameling van 4 elementen. Nemen we als productregel  $a^2 = b^2 = c^2 = e$ ,  $ab = ba = c$ ,  $bc = cb = a$ ,  $ca = ac = b$  dan wordt  $V_4$  een (abelse) groep van order 4. De groep  $V_4$  heet wel de *viergroep van Klein*.

**Voorbeeld 1.8** De *symmetrische groep*  $S_n$  is als verzameling de collectie van permutaties van de verzameling  $\{1, 2, \dots, n\}$ . Een permutatie  $\sigma \in S_n$  wordt weergegeven door een matrix

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

en de orde van  $S_n$  is dus  $n!$ . De productregel voor  $S_n$  is samenstellen van permutaties, dus bijvoorbeeld

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

en we zien dat  $S_n$  voor  $n \geq 3$  niet abels is.

**Definitie 1.9** Een *ondergroep*  $H$  van een groep  $G$  is een deelverzameling  $H \subset G$  waarvoor geldt

1.  $e \in H$ ,
2.  $a, b \in H \implies ab \in H$ ,
3.  $a \in H \implies a^{-1} \in H$ .

We noteren  $H < G$  voor een ondergroep  $H$  van  $G$ . Als  $H < G$  dan is  $H$  op natuurlijke manier weer een groep door beperking van de productregel in  $G$  tot elementen van  $H$ .

**Voorbeeld 1.10** Voor elke groep  $G$  zijn  $\{e\}$  en  $G$  ondergroepen. Dit zijn de triviale ondergroepen van  $G$ . Voor  $a \in G$  is de deelverzameling

$$\langle a \rangle = \{a^j; j \in \mathbb{Z}\}$$

ondergroep van  $G$ , de zogenaamde *cyclische ondergroep* van  $G$  voortgebracht door  $a$ . Hierbij is  $a^0 = e$ , en  $a^j = a a \dots a$ ,  $a^{-j} = a^{-1} a^{-1} \dots a^{-1}$  beide met  $j \geq 1$  factoren, zodat  $a^i a^j = a^{i+j} \forall i, j \in \mathbb{Z}$ . De *orde van een element*  $a \in G$  is per definitie de orde van de ondergroep  $\langle a \rangle$ , en indien eindig gelijk aan het kleinste getal  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $n \geq 1$  met  $a^n = e$ . Een groep  $G$  heet *cyclisch* als  $\exists a \in G$  met  $G = \langle a \rangle$ , en  $a$  heet dan een *voortbrenger* van  $G$ .

**Voorbeeld 1.11** De volgende ondergroepen van de algemene lineaire groep komen regelmatig voor.

$SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}); \det A = 1\}$  speciale lineaire groep

$O_n(\mathbb{R}) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}); A^t A = I_n\}$  orthogonale groep

$SO_n(\mathbb{R}) = SL_n(\mathbb{R}) \cap O_n(\mathbb{R})$  speciale orthogonale groep

$SL_n(\mathbb{C}) = \{A \in GL_n(\mathbb{C}); \det A = 1\}$  speciale lineaire groep

$U_n(\mathbb{C}) = \{A \in GL_n(\mathbb{C}); A^* A = I_n\}$  unitaire groep

$SU_n(\mathbb{C}) = SL_n(\mathbb{C}) \cap U_n(\mathbb{C})$  speciale unitaire groep.

Hierbij is  $A^* = \overline{A}^t$  de geadjungeerde matrix van  $A$ . Merk op dat  $O_n(\mathbb{R}) = GL_n(\mathbb{R}) \cap U_n(\mathbb{C})$  en evenzo  $SO_n(\mathbb{R}) = GL_n(\mathbb{R}) \cap SU_n(\mathbb{C})$ .

**Voorbeeld 1.12** Voor  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $n \geq 1$  een vast getal beschouwen we de orthogonale matrices

$$r = \begin{pmatrix} \cos 2\pi/n & -\sin 2\pi/n \\ \sin 2\pi/n & \cos 2\pi/n \end{pmatrix}, \quad t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Dan is  $r$  de matrix van een rotatie van  $\mathbb{R}^2$  over een hoek  $2\pi/n$ , en  $t$  de matrix van een spiegeling van  $\mathbb{R}^2$  met de  $x$ -as als spiegel. Men controleert eenvoudig dat

$$r^n = e, \quad t^2 = e, \quad tr^j = r^{n-j}t$$

waarmee men kan inzien dat

$$C_n = \{e, r, r^2, \dots, r^{n-1}\}$$

$$D_n = \{e, r, r^2, \dots, r^{n-1}, t, rt, r^2t, \dots, r^{n-1}t\}$$

ondergroepen van  $SO_2(\mathbb{R})$  en  $O_2(\mathbb{R})$  zijn respectievelijk. De groep  $C_n$  is de cyclische groep van orde  $n$  met voortbrenger  $r$ , en is de groep van alle rotaties van het vlak die de verzameling  $X_n = \{(\cos 2\pi j/n, \sin 2\pi j/n); j \in \mathbb{Z}, 0 \leq j \leq n-1\}$  van hoekpunten van een regelmatige  $n$ -hoek (mits  $n \geq 3$ ) permuteren. De groep  $D_n$  heet de *diëdergroep* van orde  $2n$ , en

$$D_n = \{a \in O_2(\mathbb{R}); aX_n = X_n\}$$

is de volle (dus bestaande uit rotaties en spiegelingen) symmetriegroep van de regelmatige  $n$ -hoek.

**Stelling 1.13** De eindige ondergroepen van  $SO_2(\mathbb{R})$  zijn de cyclische groepen  $C_n$  van orde  $n$ . De eindige ondergroepen van  $O_2(\mathbb{R})$  welke niet bevat zijn in  $SO_2(\mathbb{R})$  zijn (na een geschikte rotatie van  $\mathbb{R}^2$ ) de diëdergroepen  $D_n$  van orde  $2n$ .

**Bewijs.** Schrijf  $r(\theta)$  met  $0 \leq \theta < 2\pi$  voor de matrix van een rotatie van  $\mathbb{R}^2$  over een hoek  $\theta$ . Is  $G < SO_2(\mathbb{R})$  van orde  $n$  dan nummeren we de elementen  $r_1, \dots, r_n$  van  $G$  zodat  $r_j = r(\theta_j)$  met  $0 = \theta_1 < \theta_2 < \dots < \theta_n < 2\pi$ . Omdat  $G \ni r_{i+1}r_i^{-1}r_j = r(\theta_{i+1})r(-\theta_i)r(\theta_j) =$

$r(\theta_{i+1} - \theta_i + \theta_j)$  concluderen we  $\theta_{i+1} - \theta_i + \theta_j \geq \theta_{j+1} \forall i, j$  waarbij  $\theta_{n+1} = 2\pi$ . Maar  $\theta_{i+1} - \theta_i \geq \theta_{j+1} - \theta_j \forall i, j$  betekent  $\theta_{i+1} - \theta_i = 2\pi/n \forall i$ . Dit bewijst de eerste uitspraak dat  $G = C_n$ .

Veronderstel nu dat  $G < O_2(\mathbb{R})$  van eindige orde en niet bevat in  $SO_2(\mathbb{R})$ . Kies  $s \in G$  met  $\det(s) = -1$ . Met  $t$  als in Voorbeeld 1.12 is  $\det(st) = 1$ , en dus  $st = r(\theta)$  voor zekere  $0 \leq \theta < 2\pi$ . Hieruit volgt dat  $s = r(\theta)t = r(\theta/2)r(\theta/2)t = r(\theta/2)tr(-\theta/2)$  een spiegeling van  $\mathbb{R}^2$  is met als spiegel  $r(\theta/2)\mathbb{R}e_1 = \mathbb{R}(\cos(\theta/2)e_1 + \sin(\theta/2)e_2)$ . We weten al dat  $G \cap SO_2(\mathbb{R}) = C_n$  voor zekere  $n$ . Is  $a \in G - C_n$  dan is  $as \in C_n$  en dus  $G - C_n = C_n s := \{s, rs, \dots, r^{n-1}s\}$ . Er volgt dat

$$G = C_n \cup C_n s = C_n \cup C_n r(\theta/2)tr(-\theta/2) = r(\theta/2)D_n r(-\theta/2)$$

waarmee de tweede uitspraak is bewezen. □

### Opgaven

- 1.1. Zij  $Y_4 = \{(2, 0), (0, 1), (-2, 0), (0, -1)\}$  de verzameling hoekpunten van een ruit in het vlak  $\mathbb{R}^2$ , en zij  $G = \{a \in O_2(\mathbb{R}); aY_4 = Y_4\}$  de symmetriegroep van deze ruit. Ga na dat  $G = D_2$ , en bij geschikte benaming  $G = V_4$ . Dit bewijst dat de productregel op  $V_4$  inderdaad associatief is, en dus een groep  $V_4$  definieert.
- 1.2. Bepaal alle ondergroepen van  $C_2, C_4$  en  $V_4$ .
- 1.3. Laat  $G_1, G_2$  groepen met eenheden  $e_1, e_2$  respectievelijk. Definieer een natuurlijke productregel op het cartesisch product  $G_1 \times G_2 := \{(a_1, a_2); a_1 \in G_1, a_2 \in G_2\}$ . Wat is de eenheid in  $G_1 \times G_2$  en wat is de inverse van  $(a_1, a_2) \in G_1 \times G_2$ ? Deze groep  $G_1 \times G_2$  heet het direct product van  $G_1$  en  $G_2$ .
- 1.4. Beschrijf de elementen van  $D_4$  in meetkundige termen. Bepaal alle ondergroepen van  $D_4$  van orde 4.
- 1.5. Stel  $G$  een groep met  $a^2 = e \forall a \in G$ . Bewijs dat  $G$  abels is.
- 1.6. Bewijs de volgende uitspraken:
  1.  $C_m < C_n \iff m$  is een deler van  $n$ .
  2. Elke ondergroep van  $C_n$  is van de vorm  $C_m$  met  $m$  een deler van  $n$  (gebruik Stelling 1.13).
  3. Elke ondergroep van  $C_n$  is triviaal  $\iff n = 1$  of  $n = p$  priem.

## 2 Nevenklassen en conjugatieklassen

**Definitie 2.1** Een *relatie*  $R$  op een verzameling  $X$  is een deelverzameling  $R \subset X \times X$ . Voor  $(x, y) \in R$  schrijven we ook  $xRy$  en we zeggen dat  $x$  in relatie  $R$  tot  $y$  staat. Een relatie  $R$  op  $X$  heet een *equivalentierelatie* als

1.  $xRx \forall x \in X$  (reflexiviteit),
2. als  $xRy$  dan  $yRx$  (symmetrie),
3. als  $xRy$  en  $yRz$  dan  $xRz$  (transitiviteit).

Een equivalentierelatie wordt meestal aangegeven met  $\sim$ , en voor  $x \sim y$  zeggen we  $x$  is equivalent met  $y$ . De verzameling  $[x] = \{y \in X; y \sim x\}$  heet de equivalentieklasse van  $x$  en  $x$  heet een *representant* van  $[x]$ . De verzameling  $X$  is een disjuncte vereniging van de equivalentieklassen.

**Voorbeeld 2.2** Zij  $X$  de verzameling van alle mensen. Hetzelfde geslacht hebben is een equivalentierelatie met twee equivalentieklassen: mannen en vrouwen. In hetzelfde land wonen is ook een equivalentierelatie met als equivalentieklassen de nationaliteiten. Afstammen van is geen equivalentierelatie want deze relatie is niet symmetrisch.

**Definitie 2.3** Zij  $G$  een groep en  $H < G$ . Voor  $a, b \in G$  definiëren we

$$a \sim b \iff a^{-1}b \in H.$$

Men controleert eenvoudig dat dit een equivalentierelatie is. De equivalentieklassen heten de *linkernevenklassen* in  $G$  naar  $H$ . De linkernevenklasse met representant  $a$  noteren we  $aH$ . De verzameling van linkernevenklassen in  $G$  naar  $H$  heet de *factorruimte* van  $G$  naar  $H$ , en noteren we  $G/H$ . Het aantal elementen van  $G/H$  heet de *index* van  $H$  in  $G$ , en wordt genoteerd  $[G : H]$ .

**Stelling 2.4** Voor  $H < G$  eindige groepen geldt  $[G : H] = |G|/|H|$  zodat de orde van  $H$  steeds deler is van de orde van  $G$ .

**Bewijs.** Voor  $x \in G$  wordt de afbeelding  $L_x : G \rightarrow G$  (linksvermenigvuldiging met  $x$ ) gedefinieerd door  $L_x(a) = xa \forall a \in G$ . De afbeelding  $L_x$  heeft een inverse (namelijk  $L_{x^{-1}}$ ) en is dus bijectief. Voorts is  $xa \sim xb \iff (xa)^{-1}xb = a^{-1}x^{-1}xb = a^{-1}b \in H \iff a \sim b$  en dus voert  $L_x$  de linkernevenklasse  $aH$  over in de linkernevenklasse  $(xa)H$ . Ieder tweetal linkernevenklassen bevat dus evenveel elementen, en wel  $|H|$  veel (want  $H = eH$ ). Aangezien  $G$  een disjuncte vereniging is van de linkernevenklassen naar  $H$  krijgen we  $|G| = [G : H] \cdot |H|$ .  $\square$

**Gevolg 2.5** In een eindige groep  $G$  is de orde van ieder element deler van  $|G|$ .

**Toepassing 2.6** In elke groep  $G$  is het eenheidselement  $e$  het unieke element van orde 1. Als  $|G| = p$  priem dan heeft elke  $a \in G$   $a \neq e$  orde  $p$  en dus  $G = \langle a \rangle$ . Een groep van priemorde is dus altijd cyclisch.

**Opmerking 2.7** Voor  $H < G$  kan men op volstrekt analoge wijze *rechternevenklassen*  $Ha$  van  $a$  naar  $H$  invoeren. In het algemeen zal de opsplitsing van  $G$  in linkernevenklassen verschillen van die in rechternevenklassen. Maar soms kunnen beide opsplitsingen samenvallen bijvoorbeeld als  $G$  abels is, of als  $H$  index 2 in  $G$  heeft (zodat  $G = H \cup (G - H)$  de opsplitsing in linker- en rechternevenklassen is).

**Definitie 2.8** Zij  $G$  een groep. Twee elementen  $a, b \in G$  heten *geconjugerd* als  $b = xax^{-1}$  voor zekere  $x \in G$ . Geconjugerd zijn is een equivalentierelatie (controleer!) en de bijbehorende equivalentieklassen heten de *conjugatieklassen* van  $G$ . Voor  $a \in G$  noteren we met  $[a]$  de conjugatieklasse van  $a$  in  $G$ .

**Voorbeeld 2.9** Is  $G$  een abelse groep dan is  $[a] = \{a\}$  voor elk element  $a \in G$ .

**Voorbeeld 2.10** Beschouw de diëdergroep  $D_n = C_n \cup C_n t$  als in Voorbeeld 1.12. De groep  $C_n = \{r^j; j = 0, \dots, n-1\}$  is abels zodat  $r^i r^j r^{-i} = r^j$ , en  $r^i t r^j t r^{-i} = r^i r^{-j} r^{-i} = r^{-j}$ . Dus vinden we voor de conjugatieklassen van rotaties in  $D_n$

$$[r^j] = \{r^j, r^{-j}\}.$$

Voor de bepaling van  $[t]$  rekent men eenvoudig na dat  $r^i t r^{-i} = r^i t t t r^{-i} = r^{2i} t$ . Nu is

$$\langle r^2 \rangle = \begin{cases} \{e, r^2, \dots, r^{2m}, r^{2m+2} = r, \dots, r^{2m-1}\} = C_n & \text{als } n = 2m + 1 \text{ oneven} \\ \{e, r^2, \dots, r^{2m-2}\} = C_m & \text{als } n = 2m \text{ even} \end{cases}$$

zodat

$$[t] = \begin{cases} C_n t & \text{als } n = 2m + 1 \text{ oneven} \\ C_m t & \text{als } n = 2m \text{ even} \end{cases}$$

Voor de conjugatieklassen van spiegelingen in  $D_n$  vinden we dan

$$C_n t = \begin{cases} [t] & \text{als } n \text{ oneven} \\ [t] \cup [rt] & \text{als } n \text{ even} \end{cases}$$

Het onderscheid voor de conjugatieklassen van spiegelingen tussen  $n$  oneven en  $n$  even heeft ook een meetkundige reden. Voor  $n = 3$  is  $D_3$  de symmetriegroep van een gelijkzijdige driehoek, en de 3 spiegelingen om de zwaartelijnen zijn geconjugerd. Voor  $n = 4$  is  $D_4$  de symmetriegroep van een vierkant en de 4 spiegelingen komen in 2 soorten. Er zijn 2 spiegelingen in lijnen door overstaande hoekpunten, en ook 2 spiegelingen in lijnen door middens van overstaande zijden.

**Voorbeeld 2.11** Beschouw de symmetrische groep  $S_n$  van permutaties van  $\{1, 2, \dots, n\}$ . Voor  $k$  verschillende getallen  $i_1, i_2, \dots, i_k \in \{1, 2, \dots, n\}$  noteren we met  $(i_1 i_2 \dots i_k)$  de permutatie  $\sigma \in S_n$  waarvoor  $\sigma(i_j) = i_{j+1}$ ,  $\sigma(i_k) = i_1$  en  $\sigma(i) = i$  als  $i \notin \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ .

Zo'n  $\sigma$  heet een *kring* of *cykel* ter lengte  $k \leq n$ . Deze schrijfwijze voor een kring is niet uniek want  $(i_1 i_2 \dots i_k) = (i_2 i_3 \dots i_k i_1) = \dots = (i_k i_1 \dots i_{k-1})$ . Kringen van lengte 1 zijn alle gelijk aan het eenheidselement. Kringen van lengte 2 heten *verwisselingen* of *transposities*. Twee kringen  $(i_1 i_2 \dots i_k)$  en  $(j_1 j_2 \dots j_l)$  heten *disjunct* als  $\{i_1, i_2, \dots, i_k\} \cap \{j_1, j_2, \dots, j_l\} = \emptyset$ . Het is duidelijk dat disjuncte kringen commuteren. Neem bijvoorbeeld de permutatie

$$\sigma = \left( \begin{array}{cccccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 4 & 7 & 2 & 3 & 10 & 12 & 1 & 11 & 9 & 8 & 5 & 6 \end{array} \right) \in S_{12}.$$

Dan is duidelijk dat

$$\sigma = (1\ 4\ 3\ 2\ 7)(5\ 10\ 8\ 11)(6\ 12)$$

een product is van disjuncte kringen.

**Stelling 2.12** Elke permutatie in  $S_n$  is te schrijven als product van disjuncte kringen, en deze schrijfwijze is uniek op volgorde van de factoren en het al of niet weglaten van kringen ter lengte 1 na.

Twee kringen  $(i_1 \dots i_k)$  en  $(j_1 \dots j_k)$  van dezelfde lengte  $k$  zijn altijd geconjugueerd in  $S_n$ . Inderdaad  $(j_1 \dots j_k) = \sigma(i_1 \dots i_k)\sigma^{-1}$  voor iedere  $\sigma \in S_n$  met  $\sigma(i_1) = j_1, \sigma(i_2) = j_2, \dots, \sigma(i_k) = j_k$ . Hoe  $\sigma$  de verzameling  $\{1, \dots, n\} - \{i_1, \dots, i_k\}$  bijectief afbeeldt op  $\{1, \dots, n\} - \{j_1, \dots, j_k\}$  is verder irrelevant. Een dalend rijtje gehele getallen  $k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_r \geq 1$  met  $k_1 + k_2 + \dots + k_r = n$  heet een *partitie* van  $n$ .

**Definitie 2.13** Schrijf  $\sigma \in S_n$  als  $\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_r$  product van disjuncte kringen ter lengte  $k_1, \dots, k_r$ . Nemen we kringen ter lengte 1 ook mee, en ordenen we de factoren naar dalende lengte, dan is  $k_1 + \dots + k_r = n$  en  $k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_r \geq 1$ . De partitie  $(k_1, k_2, \dots, k_r)$  van  $n$  heet de *kringstructuur* of het *cykeltype* van  $\sigma \in S_n$ .

**Stelling 2.14** De conjugatieklassen in  $S_n$  zijn de permutaties met dezelfde kringstructuur.

Voor  $n = 3$  zijn er 3 partities  $(3)$ ,  $(2, 1)$  en  $(1, 1, 1)$  met bijbehorende conjugatieklassen  $\{(123), (132)\}$ ,  $\{(12), (13), (23)\}$  en  $\{e\}$  in  $S_3$ . Voor  $n = 4$  hebben we de volgende tabel.

$(k_1, \dots, k_r)$	representant van de klasse	cardinaliteit van de klasse
(4)	(1234)	$6 = 4!/4$
(3,1)	(123)	$8 = 4 \cdot 2$
(2,2)	(12)(34)	3
(2,1,1)	(12)	$6 = \binom{4}{2}$
(1,1,1,1)	e	1

## Opgaven

- 2.1. Bepaal voor  $G = D_3$  de linker- en rechternevenklassen naar de ondergroep  $H = \{e, t\}$ . Merk op dat  $aH \neq Ha$  tenzij  $a \in H$ .
- 2.2. Bewijs voor de symmetrische groep  $S_n$  dat
1. Een kring van lengte  $k$  heeft orde  $k$ .
  2. Als  $\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_r$  product van disjuncte kringen van lengte  $k_1, \dots, k_r$  respectievelijk, dan is de orde van  $\sigma$  gelijk aan  $\text{kgv}(k_1, \dots, k_r)$  met  $\text{kgv} =$  kleinste gemene veelvoud.
- Hoeveel conjugatieklassen met elementen van orde 5 heeft  $S_{24}$ ?
- 2.3. Tabeleer de partities van 5, en geef voor elke partitie van 5 een representant en de cardinaliteit van de bijbehorende conjugatieklasse in  $S_5$ .
- 2.4. Bepaal de conjugatieklassen van  $D_5$  en  $D_6$ .
- 2.5. Stel  $Q = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\} \subset SL_2(\mathbb{C})$  met

$$1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, i = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, j = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, k = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Controleer de rekenregels

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1$$

$$ij = -ji = k, jk = -kj = i, ki = -ik = j$$

en concludeer  $Q < SL_2(\mathbb{C})$ . De groep  $Q$  heet de *quaterniongroep*.

2. Bepaal de conjugatieklassen van  $Q$ .
- 2.6. Zij  $G$  een eindige groep.
1. Bewijs dat de verzameling  $\{a \in G; a \text{ heeft orde } \geq 3\}$  uiteenvalt in paren, en dus even cardinaliteit heeft.
  2. Concludeer dat een groep van even orde altijd een element van orde 2 heeft.
- 2.7. Bewijs dat een conjugatieklasse in het direct product  $G_1 \times G_2$  van de groepen  $G_1$  en  $G_2$  (zoals gedefinieerd in Opgave 1.3) steeds het cartesisch product is van een klasse in  $G_1$  en een klasse in  $G_2$ .

### 3 Normaaldelers en homomorfismen

In de vorige paragraaf hebben we voor  $H < G$  de linkernevenklasse  $aH$  en de rechternevenklasse  $Ha$  van  $a \in G$  naar  $H$  ingevoerd en gezien dat i.h.a.  $aH \neq Ha$  (Opgave 2.1).

**Definitie 3.1** Een ondergroep  $N < G$  heet *normaaldeler* van  $G$  als  $aN = Na \forall a \in G$ , en we noteren  $N \triangleleft G$ .

Voor een abelse groep  $G$  is iedere ondergroep  $N < G$  automatisch normaaldeler. Ondergroepen van index 2 in een willekeurige groep  $G$  zijn ook steeds normaaldeler (vgl. Opmerking 2.7). De conditie  $aN = Na \forall a \in G$  is equivalent met  $aN \subset Na \forall a \in G$ , en dus ook met

$$aba^{-1} \in N \quad \forall a \in G, \forall b \in N.$$

De volgende stelling is dus duidelijk.

**Stelling 3.2** De ondergroep  $N < G$  is normaaldeler precies dan als  $N$  een vereniging is van conjugatieklassen van  $G$ .

**Voorbeeld 3.3** Het *centrum*  $Z(G) = \{b \in G; ab = ba \forall a \in G\}$  van  $G$  is normaaldeler van  $G$ , want het centrum van  $G$  zijn precies die elementen in  $G$  waarvoor de conjugatieklasse slechts uit 1 element bestaat.

**Voorbeeld 3.4** We hebben  $C_n \triangleleft D_n$  als ondergroep van index 2 (vanwege Opmerking 2.7).

**Stelling 3.5** Als  $G$  een groep en  $N \triangleleft G$  dan is de factorruimte  $G/N$  op natuurlijke manier weer een groep met als productregel  $aN \cdot bN = abN$ . De groep  $G/N$  heet de *factorgroep*.

**Bewijs.** Voor  $A, B \subset G$  noteren we  $AB = \{ab; a \in A, b \in B\}$ . Dan is  $AB \subset G$  en het is duidelijk dat  $(AB)C = A(BC)$  voor  $A, B, C \subset G$ . Voor  $a, b \in G$  geldt

$$(aN)(bN) = a(Nb)N = a(bN)N = abN$$

waaruit volgt dat de productregel in  $G/N$  goed gedefinieerd is (onafhankelijk van de keuze van de representanten in de nevenklassen). De associativiteit van de productregel in  $G/N$  is ook duidelijk. Men gaat direct na dat  $eN = N$  eenheidselement in  $G/N$  is, en de inverse wordt gegeven door  $(aN)^{-1} = a^{-1}N$ .  $\square$

**Voorbeeld 3.6**  $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$  heeft als somregel optellen modulo 12 (= rekenen op de klok).

**Voorbeeld 3.7** Men controleert eenvoudig dat voor de groep  $D_4 = \{e, -e, r, -r, t, -t, s := rt, -s = tr\}$  het centrum  $Z(D_4)$  gelijk is  $\{\pm e\}$ . De factorgroep  $D_4/Z(D_4)$  is de viergroep  $V_4$ . Stel maar  $a = \{\pm r\}$ ,  $b = \{\pm t\}$ ,  $c = \{\pm s\}$  en controleer de productregel van  $V_4$ .

**Definitie 3.8** Zij  $G$  en  $H$  beide groepen. Een afbeelding  $\varphi : G \rightarrow H$  heet een *homomorfisme* als  $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \forall a, b \in G$ . Is  $\varphi$  bovendien bijectief dan heet  $\varphi$  een *isomorfisme*, en de groepen  $G$  en  $H$  heten *isomorf* hetgeen we noteren  $G \cong H$ .

**Voorbeeld 3.9** De afbeelding  $e \mapsto e, a \mapsto (12)(34), b \mapsto (13)(24), c \mapsto (14)(23)$  geeft een injectief homomorfisme  $V_4 \rightarrow S_4$ .

**Voorbeeld 3.10** De *permutatiematrix* van  $\sigma \in S_n$  is de  $n \times n$  orthogonale matrix met een 1 op de plaatsen  $(\sigma(j), j)$  voor  $j = 1, \dots, n$  en een 0 elders. Het is de matrix van de lineaire afbeelding  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, e_j \mapsto e_{\sigma(j)}$  voor alle  $j$ . De afbeelding  $S_n \rightarrow O_n(\mathbb{Z})$  die aan een permutatie zijn permutatiematrix toevoegt is een injectief homomorfisme.

**Stelling 3.11** Laat  $G$  en  $H$  beide groepen, en  $\varphi : G \rightarrow H$  een homomorfisme. Dan is

$$\begin{aligned} \text{Im}(\varphi) &:= \{\varphi(a); a \in G\} < H \\ \text{Ker}(\varphi) &:= \{a \in G; \varphi(a) = e\} \triangleleft G \end{aligned}$$

en  $G/\text{Ker}(\varphi) \cong \text{Im}(\varphi)$ .

**Bewijs.** We bewijzen eerst dat het beeld  $\text{Im}(\varphi) < H$ . Allereerst is  $\varphi(e) = \varphi(ee) = \varphi(e)\varphi(e)$  en dus  $\varphi(e) = e \in \text{Im}(\varphi)$ . Stel  $x, y \in \text{Im}(\varphi)$  dus  $x = \varphi(a), y = \varphi(b)$  voor zekere  $a, b \in G$ . Dan geldt  $xy = \varphi(a)\varphi(b) = \varphi(ab)$  dus  $xy \in \text{Im}(\varphi)$ . Stel  $x \in \text{Im}(\varphi)$  dus  $x = \varphi(a)$  voor zekere  $a \in G$ . Dan geldt  $\varphi(a^{-1})x = \varphi(a^{-1})\varphi(a) = \varphi(a^{-1}a) = \varphi(e) = e$ , en evenzo  $x\varphi(a^{-1}) = e$ . Dus  $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1} = x^{-1} \in \text{Im}(\varphi)$ , en  $\text{Im}(\varphi) < H$  volgt.

We bewijzen vervolgens dat  $\text{Ker}(\varphi) \triangleleft G$ . Allereerst is  $e \in \text{Ker}(\varphi)$  want  $\varphi(e) = e$ . Als  $a, b \in \text{Ker}(\varphi)$  dan is  $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = ee = e$ , en dus  $ab \in \text{Ker}(\varphi)$ . Als  $a \in \text{Ker}(\varphi)$  dan is  $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1} = e^{-1} = e$ , en dus  $a^{-1} \in \text{Ker}(\varphi)$ . Tenslotte geldt voor  $a \in G$  en  $b \in \text{Ker}(\varphi)$  dat  $\varphi(aba^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)e\varphi(a)^{-1} = \varphi(a)\varphi(a)^{-1} = e$ , en dus  $aba^{-1} \in \text{Ker}(\varphi)$ . Hiermee is bewezen dat  $\text{Ker}(\varphi) \triangleleft G$ .

We bewijzen tenslotte dat de factorgroep  $G/\text{Ker}(\varphi)$  isomorf is met  $\text{Im}(\varphi)$ . Daartoe definiëren we een afbeelding  $\bar{\varphi} : G/\text{Ker}(\varphi) \rightarrow \text{Im}(\varphi)$  door  $\bar{\varphi}(a \text{ Ker}(\varphi)) = \varphi(a)$ . Men controleert eenvoudig dat  $\bar{\varphi}$  een goed gedefinieerde afbeelding (onafhankelijk van de keuze van de representant  $a$  in de nevenklasse  $a \text{ Ker}(\varphi)$ ) is en het isomorfisme  $G/\text{Ker}(\varphi) \cong \text{Im}(\varphi)$  realiseert.  $\square$

**Voorbeeld 3.12** De afbeelding  $\det : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^\times$  is een surjectief homomorfisme met  $\text{Ker}(\det) = SL_n(\mathbb{R})$ . Dus  $SL_n(\mathbb{R}) \triangleleft GL_n(\mathbb{R})$  en  $GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^\times$ .

**Voorbeeld 3.13** De afbeelding  $\varepsilon : S_n \rightarrow C_2$  die aan een permutatie de determinant van de bijbehorende permutatiematrix toevoegt is een homomorfisme. Inderdaad de samenstelling van 2 homomorfismen is altijd weer een homomorfisme. De *alternerende groep*  $A_n$  is de

kern van dit *tekenhomomorfisme*  $\varepsilon : S_n \rightarrow C_2$ . Voor  $n \geq 2$  is  $A_n \triangleleft S_n$  van index 2, en voor  $\sigma \in S_n$  geldt  $\sigma \in A_n$  precies dan als de verzameling

$$\{(i, j); i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}$$

even cardinaliteit heeft.

**Definitie 3.14** Als  $G$  een groep met  $N \triangleleft G$  en  $K < G$  zodat  $G = NK$  en  $N \cap K = \{e\}$  dan heet  $G$  het *semidirect product* van de normaaldeeler  $N$  met de ondergroep  $K$ . We noteren  $G = N \rtimes K$ .

**Opmerking 3.15** De conditie  $G = NK$  betekent dat elk element  $a \in G$  te schrijven is als  $a = nk$  voor zekere  $n \in N$ ,  $k \in K$ . De conditie  $N \cap K = \{e\}$  betekent dat deze productschrijfwijze uniek is. Inderdaad als  $n_1k_1 = n_2k_2$  met  $n_1, n_2 \in N$  en  $k_1, k_2 \in K$  dan  $n_2^{-1}n_1 = k_2k_1^{-1}$  en dus volgt uit  $N \cap K = \{e\}$  dat  $n_1 = n_2$  en  $k_1 = k_2$ . Voor de productafbeelding

$$p : N \times K \rightarrow G, p(n, k) = nk \text{ voor } n \in N, k \in K$$

geldt dus

$$\begin{aligned} G = NK &\iff p \text{ is surjectief} \\ N \cap K = \{e\} &\iff p \text{ is injectief.} \end{aligned}$$

Heeft  $G$  eindige orde en geldt  $N \cap K = \{e\}$  dan is de conditie  $G = NK$  equivalent met  $|G| = |N| \cdot |K|$ .

**Voorbeeld 3.16** De volgende voorbeelden

1.  $G = D_n, N = C_n, K = \{e, t\}$
2.  $G = S_n, N = A_n, K = \{e, (12)\}$
3.  $G = S_4, N = V_4$  als in Voorbeeld 3.9,  $K = S_3$
4.  $G = A_4, N = V_4, K = A_3$

geven alle een semidirect product  $G = N \rtimes K$ . De condities  $N \cap K = \{e\}$  en  $|G| = |N| \cdot |K|$  zijn steeds eenvoudig te controleren.

**Stelling 3.17** Als  $G = N \rtimes K$  een semidirect product is met  $N \triangleleft G$ ,  $K < G$  dan is  $G/N \cong K$ .

**Bewijs:** Iedere (linker = rechter) nevenklasse in  $G$  naar  $N$  heeft een unieke representant in  $K$ , zodat de afbeelding  $G/N \rightarrow K, kN \mapsto k$  bijectief is. Vanwege de definitie van de productregel op  $G/N$  (als in Stelling 3.5) is deze afbeelding ook een homomorfisme, en dus  $G/N \cong K$ .  $\square$

**Opmerking 3.18** Als  $G = NK$  en  $N \cap K = \{e\}$  met zowel  $N \triangleleft G$  als ook  $K \triangleleft G$  dan heet  $G$  het *direct product* van  $N$  en  $K$ , en we schrijven  $G = N \times K$ .

**Voorbeeld 3.19** De figuur in  $\mathbb{R}^3$  met als hoekpunten  $\{A = (1, 1, 1), B = (1, -1, -1), C = (-1, 1, -1), D = (-1, -1, 1)\}$  heet een *tetraëder*. De symmetriegroep  $T_d$  van de tetraëder wordt gedefinieerd als

$$T_d = \{a \in O_3(\mathbb{R}); \{aA, aB, aC, aD\} = \{A, B, C, D\}\}.$$

De natuurlijke afbeelding

$$T_d \rightarrow S_4, a \mapsto \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ aA & aB & aC & aD \end{pmatrix}$$

die aan een tetraëdersymmetrie de bijbehorende permutatie van de hoekpunten toevoegt is een homomorfisme. Dit homomorfisme is injectief want een lineaire afbeelding van  $\mathbb{R}^3$  ligt vast door wat het op de basis  $\{A, B, C\}$  doet. Omdat alle hoekpunten lengte  $\sqrt{3}$  hebben en elk tweetal hoekpunten inproduct  $-1$  heeft, is voor elk voorgeschreven drietal  $\{A', B', C'\} \subset \{A, B, C, D\}$  de lineaire afbeelding  $A \mapsto A', B \mapsto B', C \mapsto C'$  orthogonaal. Voor het vierde hoekpunt geldt dan  $D = -(A + B + C) \mapsto -(A' + B' + C') = -D'$  met  $D' \in \{A, B, C, D\}$  en  $D' \neq A', B', C'$ . Het homomorfisme  $T_d \rightarrow S_4$  is dus ook surjectief en de conclusie is  $T_d \cong S_4$ . De *tetraëdergroep*  $T$  is per definitie de rotatiesymmetriegroep van de tetraëder, dus  $T = T_d \cap SO_3(\mathbb{R})$ . Men gaat eenvoudig na dat  $T \cong A_4$ .

## Opgaven

- 3.1. Bewijs dat  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong C_n$ .
- 3.2. Zij  $Q$  de quaterniongroep als in Opgave 2.5. Bepaal het centrum  $Z$  van  $Q$ , en bewijs dat  $Q/Z \cong V_4$ . Zijn  $D_4$  en  $Q$  isomorf?
- 3.3. Zij  $G$  de collectie van afbeeldingen  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  van de vorm  $x \mapsto ax + b$  met  $a \in \mathbb{R}^\times$ ,  $b \in \mathbb{R}$ .
1. Controleer dat  $G$  met productregel samenstellen van afbeeldingen een groep is, de zogenaamde  $(ax + b)$ -groep.
  2. Stel  $t(b) : x \mapsto x + b$ ,  $h(a) : x \mapsto ax$  voor  $x \in \mathbb{R}$ ,  $a \in \mathbb{R}^\times$ ,  $b \in \mathbb{R}$ . Bewijs dat  $T = \{t(b); b \in \mathbb{R}\}$  normaaldeeler en  $H = \{h(a); a \in \mathbb{R}^\times\}$  ondergroep van  $G$  zijn.
  3. Bewijs dat  $G = T \rtimes H$ .
- 3.4. Bewijs dat de  $(ax + b)$ -groep isomorf is met de ondergroep van  $SL_2(\mathbb{R})$  bestaande uit bovendriehoek matrices.
- 3.5. Zij  $w \in \mathbb{R}^3$  met  $|w| = 1$ . De *spiegeling* van  $\mathbb{R}^3$  met als *spiegel*  $w^\perp = \{v \in \mathbb{R}^3; v \cdot w = 0\}$  is de lineaire afbeelding  $S_w : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  met  $S_w(v) = -v$  als  $v \in \mathbb{R}w$ ,  $S_w(v) = v$  als  $v \in w^\perp$ .
1. Bewijs dat  $S_w(v) = v - 2(v \cdot w)w$  voor  $v \in \mathbb{R}^3$ .
  2. Bewijs dat  $S_w(u) \cdot S_w(v) = u \cdot v$  voor  $u, v \in \mathbb{R}^3$  zodat  $S_w \in O_3(\mathbb{R})$ .
  3. Wat zijn de spiegelingen in de symmetriegroep  $T_d$  van de tetraëder?
- 3.6. Zij  $w \in \mathbb{R}^3$  met  $|w| = 1$ , en  $\varphi \in \mathbb{R}$ . De *draaiing* van  $\mathbb{R}^3$  met as  $w$  en hoek  $\varphi$  is de lineaire afbeelding  $D_{w,\varphi} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  met  $D_{w,\varphi}(v) = v$  als  $v \in \mathbb{R}w$ ,  $D_{w,\varphi}(v) = (\cos \varphi)v + (\sin \varphi)w \times v$  als  $v \in w^\perp$ .
1. Bewijs dat  $D_{w,\varphi}(v) = (\cos \varphi)v + (\sin \varphi)w \times v + (1 - \cos \varphi)(v \cdot w)w$  voor  $v \in \mathbb{R}^3$ .
  2. Bepaal de matrix van  $D_{w,\varphi}$  ten opzichte van een orthonormale basis  $\{u, v, w\}$  met  $w = u \times v$ .
  3. Wat zijn de draaiingen in de symmetriegroep  $T_d$  van de tetraëder? Bepaal hun as en hoek.
- 3.7. Bewijs dat op isomorfie na er 2 verschillende groepen van orde 4 zijn, namelijk de cyclische groep  $C_4$  van orde 4 en de viergroep  $V_4$ .
- 3.8. Bepaal de conjugatieklassen van de alternerende groep  $A_4$ .

## 4 Representaties

Voor het vervolg van dit college zullen we steeds stilzwijgend veronderstellen dat  $G$  een EINDIGE groep en  $V$  een vectorruimte over de complexe getallen van EINDIGE dimensie is.

**Definitie 4.1** Een *representatie*  $(\rho, V)$  van een groep  $G$  op een vectorruimte  $V$  is een homomorfisme  $\rho : G \rightarrow GL(V)$ . Zijn  $(\rho, V)$  en  $(\sigma, W)$  beide representaties van  $G$  dan heet een lineaire afbeelding  $A : V \rightarrow W$  *intertwiner* als  $\sigma(a)A = A\rho(a) \forall a \in G$ . Is  $A$  bovendien bijtief zodat  $\sigma(a) = A\rho(a)A^{-1} \forall a \in G$  dan heten  $(\rho, V)$  en  $(\sigma, W)$  *equivalente representaties* van  $G$ . We noteren dit  $\rho \simeq \sigma$ .

**Voorbeeld 4.2** Definieer  $\rho : G \rightarrow GL_1(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^\times$  door  $\rho(a) = 1 \forall a \in G$ . Dit is de zogenaamde *triviale representatie* van  $G$ .

**Voorbeeld 4.3** Zij  $G = \langle a \rangle$  een cyclische groep van orde  $n$ . Definieer  $\rho_k : G \rightarrow GL_1(\mathbb{C})$  door  $\rho_k(a^j) = \exp(2\pi ijk/n)$  voor  $j, k = 1, \dots, n$ . Dan is  $\rho_k$  representatie van  $G$  op  $\mathbb{C}$ .

**Voorbeeld 4.4** Zij  $G < O_n(\mathbb{R})$  een eindige ondergroep dan krijgen we vanwege  $O_n(\mathbb{R}) < GL_n(\mathbb{C})$  een natuurlijke representatie  $\rho : G \rightarrow GL_n(\mathbb{C})$  van  $G$  op  $\mathbb{C}^n$ . Dit is de zogenaamde *standaardrepresentatie* van  $G$  op  $\mathbb{C}^n$ . De cyclische groep  $C_n$  en de diëdergroep  $D_n$  hebben een standaardrepresentatie op  $\mathbb{C}^2$ , en de symmetriegroep  $T_d$  van het tetraëder heeft een standaardrepresentatie op  $\mathbb{C}^3$ .

**Voorbeeld 4.5** Voor  $\sigma \in S_n$  zij  $\rho(\sigma) \in O_n(\mathbb{Z}) < GL_n(\mathbb{C})$  de bijbehorende permutatiematrix. Dan is  $\rho : S_n \rightarrow GL_n(\mathbb{C})$  een representatie van  $S_n$  op  $\mathbb{C}^n$ .

**Definitie 4.6** Zij  $(\rho, V)$  een representatie van  $G$  op  $V$ . Een lineaire deelruimte  $U$  van  $V$  heet een *invariante lineaire deelruimte* als  $\rho(a)u \in U \forall a \in G, \forall u \in U$ . Via beperking tot  $U$  krijgen we een natuurlijke representatie  $\rho_U : G \rightarrow GL(U)$ . De representatie  $\rho_U$  heet een *deelrepresentatie* van  $\rho$ . Heeft  $\rho$  een deelrepresentatie  $\rho_U$  met  $0 \subsetneq U \subsetneq V$  dan heet  $\rho$  *reducibel*. De representatie  $\rho$  heet *irreducibel* als  $V \neq 0$  en  $V$  heeft geen andere invariante deelruimte dan de triviale invariante deelruimten  $0$  en  $V$ . Dus irreducibel is hetzelfde als niet reducibel plus  $\dim V \geq 1$ .

**Stelling 4.7** Zij  $(\rho, V)$  een representatie van  $G$  op  $V$ . Dan kunnen we  $V$  opsplitsen als een directe som  $V = U_1 \oplus U_2 \oplus \dots \oplus U_k$  (d.w.z.  $V = U_1 + U_2 + \dots + U_k$  en  $U_i \cap U_j = \{0\}$  als  $i \neq j$ ) van irreducibele invariante deelruimten  $U_1, \dots, U_k$ . We noteren  $\rho = \rho_1 \oplus \rho_2 \oplus \dots \oplus \rho_k$  als directe som van de irreducibele deelrepresentaties  $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_k$  (met  $\rho_j = \rho_{U_j}$ ).

**Bewijs.** Kies een willekeurig hermitisch inproduct  $(\cdot | \cdot)'$  op  $V$ , en definieer een nieuw hermitisch inproduct  $(\cdot | \cdot)$  op  $V$  door uitmiddelen over  $G$ , d.w.z.

$$(v|w) = |G|^{-1} \sum_{a \in G} (\rho(a)v | \rho(a)w)' \quad \text{voor } v, w \in V.$$

Men controleert direct dat  $(\cdot | \cdot)$  weer een hermitisch inproduct op  $V$  is. Bovendien geldt

$$(\rho(a)v | \rho(a)w) = (v|w) \quad \forall a \in G, \forall v, w \in V.$$

Is  $U$  een invariante deelruimte van  $V$  dan kan aangetoond worden dat het orthoplement

$$U^\perp = \{v \in V; (u|v) = 0 \forall u \in U\}$$

van  $U$  m.b.t.  $(\cdot | \cdot)$  weer een invariante deelruimte van  $V$  is. Stel maar  $v \in U^\perp$  dus  $(u|v) = 0 \forall u \in U$ . Dan is  $(u | \rho(a)v) = (\rho(a^{-1})u | v) = 0 \forall u \in U, \forall a \in G$  zodat  $\rho(a)v \in U^\perp \forall a \in G$ . We krijgen dus

$$V = U \oplus U^\perp, \quad \rho = \rho_U \oplus \rho_{U^\perp}$$

een directe som van twee invariante deelruimten en deelrepresentaties respectievelijk. Is  $U$  een echte (d.w.z. niet triviale) invariante deelruimte van  $V$  dan is  $U^\perp$  dat ook, en  $\rho$  is directe som van twee echte deelrepresentaties. Zijn  $U$  en  $U^\perp$  niet beide irreducibel dan herhalen we bovenstaande constructie van een invariant complement voor de reducibele factoren. We kunnen zo doorgaan totdat  $V = U_1 \oplus \dots \oplus U_k$  met louter irreducibele factoren.  $\square$

**Voorbeeld 4.8** De representaties van  $C_n$

$$\rho_k : C_n \rightarrow GL_1(\mathbb{C}), \quad \rho_k(r^j) = \exp(2\pi i j k / n)$$

zijn alle irreducibel. Inderdaad elke representatie  $\rho : G \rightarrow GL(V)$  met  $\dim V = 1$  is irreducibel. De standaardrepresentatie

$$\rho : C_n \rightarrow GL_2(\mathbb{C}), \quad \rho(r^j) = \begin{pmatrix} \cos 2\pi j / n & -\sin 2\pi j / n \\ \sin 2\pi j / n & \cos 2\pi j / n \end{pmatrix}$$

is reducibel. Inderdaad

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

zodat  $\mathbb{C}(e_1 - ie_2)$  en  $\mathbb{C}(e_1 + ie_2)$  beide invariante deelruimten zijn. Er geldt  $\rho = \rho_1 \oplus \rho_{n-1}$ . Deze opsplitsing van  $\mathbb{C}^2$  in invariante deelruimten is uniek voor  $n \geq 3$ , want  $\rho(r)$  heeft dan 2 verschillende eigenwaarden. De spiegeling  $t \in D_n$  laat geen van beide lijnen

$\mathbb{C}(e_1 - ie_2)$  en  $\mathbb{C}(e_1 + ie_2)$  invariant, maar in feite verwisselt ze. We concluderen dat de standaardrepresentatie

$$\rho : D_n \rightarrow GL_2(\mathbb{C}), \rho(r) = \begin{pmatrix} \cos 2\pi/n & -\sin 2\pi/n \\ \sin 2\pi/n & \cos 2\pi/n \end{pmatrix}, \rho(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

irreducibel is voor  $n \geq 3$ . Men gaat eenvoudig na dat voor  $n = 1$  of  $2$  de standaardrepresentatie van  $D_n$  op  $\mathbb{C}^2$  reducibel is.

**Definitie 4.9** Zij  $\rho : G \rightarrow GL_n(\mathbb{C})$  een representatie van  $G$  op  $\mathbb{C}^n$ . De *duale representatie*  $\rho^* : G \rightarrow GL_n(\mathbb{C})$  van  $G$  op  $\mathbb{C}^n$  wordt gedefinieerd door

$$\rho^*(a) = (\rho(a)^{-1})^t \quad \text{voor } a \in G.$$

Men gaat direct na dat  $\rho^*(ab) = \rho^*(a)\rho^*(b) \forall a, b \in G$  zodat  $\rho^*$  inderdaad weer een representatie is van  $G$  op  $\mathbb{C}^n$ . Als  $\rho^* \simeq \rho$  dan heet  $\rho$  een *zelfduale representatie*.

**Voorbeeld 4.10** Als  $\rho : G \rightarrow U_n(\mathbb{C}) = \{A \in GL_n(\mathbb{C}); A^*A = 1\}$  een *unitaire representatie* van  $G$  op  $\mathbb{C}^n$  dan geldt  $\rho^*(a) = (\rho(a)^{-1})^t = (\rho(a)^*)^t = (\overline{\rho(a)^t})^t = \overline{\rho(a)}$  voor  $a \in G$ . Een *orthogonale representatie*  $\rho : G \rightarrow O_n(\mathbb{R})$  van  $G$  op  $\mathbb{R}^n$  is dus steeds gelijk aan zijn dual. Zo is dan ook de standaardrepresentatie van de symmetriegroep van een meetkundig object in  $\mathbb{R}^2$  of  $\mathbb{R}^3$  (bv  $C_n, D_n, T$  of  $T_d$ ) altijd zelfdual.

**Definitie 4.11** Beschouw  $\mathbb{C}^n$  met standaardbasis  $e_1, \dots, e_n$  en  $\mathbb{C}^m$  met standaardbasis  $f_1, \dots, f_m$ . Dan is  $\mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^m$  de vectorruimte over  $\mathbb{C}$  met standaardbasis  $e_i \otimes f_k$  voor  $1 \leq i \leq n, 1 \leq k \leq m$ . Als  $v = \sum x_i e_i \in \mathbb{C}^n$  en  $w = \sum y_k f_k \in \mathbb{C}^m$  dan definiëren we het *tensorproduct*  $v \otimes w \in \mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^m$  van  $v$  en  $w$  door  $v \otimes w = \sum x_i y_k e_i \otimes f_k$ .

Als  $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$  en  $B = (b_{kl}) \in \text{Mat}_m(\mathbb{C})$  definiëren we het *tensorproduct*  $A \otimes B \in \text{Mat}_{nm}(\mathbb{C})$  van  $A$  en  $B$  als de matrix

$$A \otimes B = a_{ij} b_{kl} \quad \text{op plaats } (i, k), (j, l).$$

Hierbij zijn  $(i, k)$  de rij- en  $(j, l)$  de kolomindex van  $A \otimes B$  met  $1 \leq i, j \leq n$  en  $1 \leq k, l \leq m$ . De volgende regels zijn eenvoudig te controleren

1.  $(A \otimes B)(v \otimes w) = Av \otimes Bw$
2.  $(A \otimes B)(C \otimes D) = AC \otimes BD$
3. Als  $A^{-1}, B^{-1}$  bestaan dan  $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$
4.  $\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A)\text{tr}(B)$ .

**Definitie 4.12** Zijn  $\rho : G \rightarrow GL_n(\mathbb{C})$  en  $\sigma : G \rightarrow GL_m(\mathbb{C})$  representaties van  $G$  op  $\mathbb{C}^n$  en  $\mathbb{C}^m$  respectievelijk dan is het *tensorproduct*  $\rho \otimes \sigma$  van  $\rho$  en  $\sigma$  de representatie op  $\mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^m$  gedefinieerd door

$$\rho \otimes \sigma(a) = \rho(a) \otimes \sigma(a) \quad \text{voor } a \in G.$$

Men gaat eenvoudig na  $\rho \otimes \sigma : G \rightarrow GL_{nm}(\mathbb{C})$  weer een representatie is.

**Stelling 4.13 (Lemma van Schur)** Als  $\rho : G \rightarrow GL(V)$  een irreducibele representatie van  $G$  op  $V$  is dan is iedere intertwiner  $A : V \rightarrow V$  een scalair d.w.z.  $A = \lambda I$  voor zekere  $\lambda \in \mathbb{C}$ .

**Bewijs.** Zij  $\lambda \in \mathbb{C}$  een eigenwaarde van  $A$  met eigenruimte  $U := \text{Ker}(A - \lambda I)$ . Omdat  $\rho(a)A = A\rho(a) \forall a \in G$  volgt eenvoudig dat  $U$  een invariante lineaire deelruimte is. Aangezien  $U \neq 0$  (want  $\lambda$  is eigenwaarde van  $A$ ) en  $(\rho, V)$  irreducibel is concluderen we dat  $U = V$ .  $\square$

**Gevolg 4.14** Als  $\rho : G \rightarrow GL(V)$  een irreducibele representatie van een abelse groep  $G$  op  $V$  is dan geldt  $\dim V = 1$ .

**Bewijs.** Uit het abels zijn van  $G$  volgt dat  $\rho(a) : V \rightarrow V$  intertwiner voor  $a \in G$ , en dus  $\rho(a) = \lambda(a)I$  vanwege het Lemma van Schur met  $\lambda : G \rightarrow \mathbb{C}^\times$  een homomorfisme. Elke lineaire deelruimte van  $V$  is dus invariant, en uit de irreducibiliteit van  $\rho$  volgt dan dat  $\dim V = 1$ .  $\square$

**Voorbeeld 4.15** De irreducibele representaties van  $C_n$  zijn van de vorm

$$\rho_k : C_n \rightarrow GL_1(\mathbb{C}), \rho_k(r^j) = \exp(2\pi ijk/n)$$

voor  $k = 1, \dots, n$ . Inderdaad iedere irreducibele representatie  $\rho$  heeft dimensie 1, en ligt volledig vast door het beeld  $\rho(r) \in \mathbb{C}^\times = GL_1(\mathbb{C})$  voor te schrijven. Vanwege  $r^n = e$  volgt  $\rho(r)^n = 1$  en dus  $\rho = \rho_k$  voor zekere  $k = 1, \dots, n$ .

## Opgaven

- 4.1. Ga na dat de standaardrepresentatie van de quaterniongroep  $Q$  (zie Opgave 2.5) op  $\mathbb{C}^2$  irreducibel is.
- 4.2. Zij  $D_2 = \{e, r, s, t\}$  met  $r = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $s = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$  de diëdergroep van orde 4. Bepaal alle irreducibele representaties van  $D_2$ . Ontbind de standaardrepresentatie van  $D_2$  op  $\mathbb{C}^2$  in irreducibele representaties.
- 4.3. Zij  $\rho : S_n \rightarrow GL_n(\mathbb{C})$  de representatie van  $S_n$  met  $\rho(\sigma)$  de permutatiematrix van  $\sigma$ . Ga na dat

$$U_1 = \{(x, x, \dots, x) \in \mathbb{C}^n; x \in \mathbb{C}\}$$

$$U_2 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n; x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0\}$$

beide invariante deelruimten zijn. Concludeer dat  $\rho = \rho_1 \oplus \rho_2$  met  $\rho_j$  de beperking van  $\rho$  tot  $U_j$ . Herken je de representatie  $\rho_1$ ? De representatie  $\rho_2$  heeft dimensie  $(n-1)$  en heet de *spiegelingsrepresentatie* van  $S_n$ .

- 4.4. Ga na dat voor  $S_2$  de spiegelingenrepresentatie samenvalt met de tekenrepresentatie.
- 4.5. Zij  $V = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{C}^4; x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$  en  $\rho : S_4 \rightarrow GL(V)$  de spiegelingenrepresentatie van  $S_4$  op  $V$ . Stel  $A = (3, -1, -1, -1)/2$ ,  $B = (-1, 3, -1, -1)/2$ ,  $C = (-1, -1, 3, -1)/2$  en  $D = (-1, -1, -1, 3)/2$ .
1. Ga na dat  $\{A, B, C, D\}$  de hoekpunten van een tetraëder in  $V \cap \mathbb{R}^4$  zijn.
  2. Ga na dat  $\rho(\sigma)$  voor  $\sigma \in S_4$  de verzameling  $\{A, B, C, D\}$  in zichzelf overvoert.
  3. Concludeer dat de spiegelingenrepresentatie van  $S_4$  equivalent is met de standaardrepresentatie van  $S_4 = T_d$ .
- 4.6. Beschouw  $V_4$  als ondergroep van  $T_d = S_4$  op de gebruikelijke wijze (als in Voorbeeld 3.9), en zij  $\rho$  de bijbehorende standaardrepresentatie van  $V_4$  op  $\mathbb{C}^3$ . Ontbind  $\mathbb{C}^3$  in irreducibele invariante deelruimten.

## 5 Karakters

Voor  $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$  rekent men direct na dat

$$\text{tr}(BA) = \text{tr}(AB),$$

en voor  $\det(B) \neq 0$  volgt dus ook

$$\text{tr}(BAB^{-1}) = \text{tr}(A).$$

Hieruit volgt voor een lineaire afbeelding  $A : V \rightarrow V$  het spoor van de matrix van  $A$  ten opzichte van een basis van  $V$  niet afhangt van de basiskeuze, en dus is  $\text{tr}(A) \in \mathbb{C}$  goed gedefinieerd.

**Definitie 5.1** Zij  $\rho : G \rightarrow GL(V)$  een representatie van  $G$  op  $V$ . Het *karakter* van  $\rho$  is de complexwaardige functie  $\chi_\rho$  op  $G$  gedefinieerd door

$$\chi_\rho(a) = \text{tr}(\rho(a)) \quad \text{voor } a \in G.$$

**Opmerking 5.2** Voor  $\rho : G \rightarrow GL(V)$  en  $\sigma : G \rightarrow GL(W)$  beide representaties van  $G$  gaat men eenvoudig na dat

1. Als  $\rho \simeq \sigma$  dan  $\chi_\rho = \chi_\sigma$ .
2.  $\chi_\rho(bab^{-1}) = \chi_\rho(a) \forall a, b \in G$  dus het karakter is constant op conjugatieklassen.
3.  $\chi_\rho(e) = \dim V$ .
4.  $\chi_{\rho^*}(a) = \chi_\rho(a^{-1}) = \overline{\chi_\rho(a)} \forall a \in G$ .
5.  $\chi_{\rho \oplus \sigma}(a) = \chi_\rho(a) + \chi_\sigma(a) \forall a \in G$ .
6.  $\chi_{\rho \otimes \sigma}(a) = \chi_\rho(a)\chi_\sigma(a) \forall a \in G$ .

In de loop van deze paragraaf zullen we inzien dat de omkering van 1. ook geldt, dus  $\rho \simeq \sigma$  dan en slechts dan als  $\chi_\rho = \chi_\sigma$ . Het karakter karakteriseert dus de representatie op equivalentie na, vandaar de naam.

Zij  $L(G)$  de lineaire ruimte van complexwaardige functies op  $G$ . Voor  $\varphi, \psi \in L(G)$  stellen we

$$(\varphi|\psi) = |G|^{-1} \sum_{x \in G} \varphi(x) \overline{\psi(x)}.$$

Dit is een inproduct op  $L(G)$ : lineair in  $\varphi$ , antilineair in  $\psi$  en  $(\varphi|\varphi) > 0$  als  $\varphi \neq 0$ .

**Stelling 5.3 (Schur orthogonaliteitsrelaties)** Zijn  $\rho : G \rightarrow GL(V)$  en  $\sigma : G \rightarrow GL(W)$  beide irreducibele representaties van  $G$  dan geldt

$$(\chi_\rho|\chi_\sigma) = \begin{cases} 1 & \text{als } \rho \simeq \sigma \\ 0 & \text{als } \rho \not\simeq \sigma \end{cases}$$

**Bewijs.** Zij  $\tau : G \rightarrow GL(U)$  een willekeurige representatie van  $G$ . Stellen we

$$U^G = \{u \in U; \tau(a)u = u \forall a \in G\}$$

dan is  $U^G$  een invariante lineaire deelruimte. Definieer een lineaire afbeelding  $P : U \rightarrow U$  door

$$Pu = |G|^{-1} \sum_{x \in G} \tau(x)u \quad \text{voor } u \in U.$$

Dan is  $\tau(a)P = P \forall a \in G$  en dus ook  $P^2 = P$ . De operator  $P$  is dus een projectieoperator, met als beeld  $\text{Im}(P) = U^G$ . We vinden dus

$$(\chi_\tau | 1) = |G|^{-1} \sum_{x \in G} \text{tr}(\tau(x)) = \text{tr}(P) = \dim U^G.$$

We zullen deze formule toepassen voor een speciale representatie  $\tau$  van  $G$ .

Zij  $\text{Hom}(V, W)$  de vectorruimte van lineaire afbeeldingen  $A : V \rightarrow W$ . Definieer een representatie  $\text{Hom}(\rho, \sigma)$  van  $G$  op  $\text{Hom}(V, W)$  door

$$\text{Hom}(\rho, \sigma)(a)A = \sigma(a)A\rho(a)^{-1}$$

voor  $a \in G$ ,  $A \in \text{Hom}(V, W)$ . Men controleert eenvoudig dat  $\text{Hom}(\rho, \sigma)$  een representatie is, en dat

$$\text{Hom}(V, W)^G = \{\text{intertwiners } A : V \rightarrow W\}.$$

Met behulp van het Lemma van Schur volgt nu

$$\dim \text{Hom}(V, W)^G = \begin{cases} 1 & \text{als } \rho \simeq \sigma \\ 0 & \text{als } \rho \not\simeq \sigma \end{cases}$$

We passen nu de formule  $(\chi_\tau | 1) = \dim U^G$  toe op de representatie  $\tau = \text{Hom}(\rho, \sigma)$ . Men gaat eenvoudig na dat  $\text{Hom}(\rho, \sigma) \simeq \rho^* \otimes \sigma$  zodat

$$(\chi_{\text{Hom}(\rho, \sigma)} | 1) = (\overline{\chi}_\rho \chi_\sigma | 1) = (\chi_\sigma | \chi_\rho) = (\chi_\rho | \chi_\sigma).$$

Dit bewijst de stelling. □

**Gevolg 5.4** Zij  $\rho : G \rightarrow GL(V)$  een representatie van  $G$  op  $V$ . Zij  $V = U_1 \oplus \dots \oplus U_k$  en  $\rho = \rho_1 \oplus \dots \oplus \rho_k$  een opsplitsing van  $(\rho, V)$  in irreducibele factoren (volgens Stelling 4.7). Zij  $(\sigma, W)$  een irreducibele representatie van  $G$ . Dan is het aantal irreducibele factoren in  $(\rho, V)$  dat equivalent is met  $(\sigma, W)$  gelijk aan  $(\chi_\rho | \chi_\sigma)$ , en dus onafhankelijk van de gekozen opsplitsing. Het getal  $(\chi_\rho | \chi_\sigma) \in \mathbb{N}$  heet de *multipliciteit* waarmee  $\sigma$  in  $\rho$  voorkomt.

**Bewijs.** Aangezien  $\chi_\rho = \chi_{\rho_1} + \dots + \chi_{\rho_k}$  volgt de bewering uit de orthogonaliteitsrelaties van Schur. □

**Gevolg 5.5** Twee representaties van  $G$  met hetzelfde karakter zijn equivalent.

**Bewijs.** Dit is duidelijk uit het vorige gevolg.  $\square$

**Notatie 5.6** Laat  $\chi_1, \dots, \chi_s$  de verschillende irreducibele karakters van  $G$  zijn behorend bij de irreducibele representaties  $\rho_1, \dots, \rho_s$  van  $G$  op vectorruimten  $V_1, \dots, V_s$  van dimensie  $n_1, \dots, n_s$  respectievelijk. Omdat karakters constant zijn op conjugatieklassen volgt uit de orthogonaliteitsrelaties dat  $s \leq$  aantal conjugatieklassen in  $G < \infty$ .

**Stelling 5.7** Een representatie  $\rho : G \rightarrow GL(V)$  is irreducibel dan en slechts dan als  $(\chi_\rho | \chi_\rho) = 1$ .

**Bewijs.** Schrijf  $\rho \simeq m_1\rho_1 \oplus \dots \oplus m_s\rho_s$  als directe som van de irreducibele representaties van  $G$  met multipliciteiten  $m_1, \dots, m_s \in \mathbb{N}$ . Dan is  $(\chi_\rho | \chi_\rho) = \sum_1^s m_j^2 = 1$  als  $m_i = 1$  voor zekere  $i$  en  $m_j = 0$  als  $j \neq i$ .  $\square$

**Voorbeeld 5.8** Zij  $\rho$  de representatie van  $S_4$  op  $\mathbb{C}^4$  met  $\rho(\sigma)e_i = e_{\sigma(i)}$  voor  $\sigma \in S_4$  en  $i = 1, \dots, 4$ . Het karakter  $\chi$  van  $\rho$  laat zich eenvoudig berekenen als

$$\chi(e) = 4, \chi((12)) = 2, \chi((123)) = 1, \chi((12)(34)) = \chi((1234)) = 0.$$

Met behulp van de tabel aan het einde van §2 vinden we  $(\chi|\chi) = (4^2 + 6 \cdot 2^2 + 8 \cdot 1^2)/24 = 2$  en  $(\chi|1) = (4 + 6 \cdot 2 + 8 \cdot 1)/24 = 1$ . De conclusie is dat  $\rho$  de directe som is van de triviale representatie en een irreducibele representatie van dimensie 3.

**Definitie 5.9** Zij  $\delta_x$  voor  $x \in G$  de functie op  $G$  waarvoor  $\delta_x(y) = \delta_{x,y}$  voor  $y \in G$ . Als  $\varphi \in L(G)$  dan is  $\varphi = \sum_x \varphi(x)\delta_x$  zodat  $\{\delta_x; x \in G\}$  een basis is van  $L(G)$ . De *reguliere representatie*  $\lambda : G \rightarrow GL(L(G))$  van  $G$  op  $L(G)$  wordt gedefinieerd door

$$\lambda(a)\delta_x = \delta_{ax} \quad \text{voor } a, x \in G.$$

Men controleert eenvoudig dat  $\lambda$  een representatie is.

**Stelling 5.10** Het karakter  $\chi_\lambda$  van de reguliere representatie  $\lambda$  van  $G$  op  $L(G)$  wordt gegeven door

$$\chi_\lambda = |G|\delta_e = \sum_1^s n_j\chi_j.$$

**Bewijs.** Ten opzichte van de basis  $\{\delta_x; x \in G\}$  van  $L(G)$  is de matrix van  $\lambda(a)$  een permutatiematrix met op de hoofddiagonaal louter nullen als  $a \in G$ ,  $a \neq e$  en louter enen als  $a = e$ . Dus  $\chi_\lambda = |G|\delta_e$  is duidelijk. Schrijf  $\lambda \simeq m_1\rho_1 \oplus \dots \oplus m_s\rho_s$  als directe som van de irreducibele representaties  $\rho_1, \dots, \rho_s$  van  $G$  met multipliciteiten  $m_1, \dots, m_s$ . Dan is  $\chi_\lambda = \sum m_j\chi_j$  met  $m_j = (\chi_\lambda|\chi_j) = |G|^{-1} \cdot |G| \cdot \chi_j(e) = n_j$ . Iedere irreducibele representatie komt dus net zo vaak in  $\lambda$  voor als zijn dimensie.  $\square$

**Gevolg 5.11**  $|G| = n_1^2 + \dots + n_s^2$ .

**Bewijs.** Evalueer de identiteit  $|G|\delta_e = \sum_1^s n_j \chi_j$  te  $e$ . □

**Definitie 5.12** Een functie  $\varphi \in L(G)$  heet *klassefunctie* als  $\varphi(ba) = \varphi(ab)$  voor alle  $a, b \in G$ . Noteer  $C(G)$  voor de lineaire deelruimte van  $L(G)$  van klassefuncties. Dan is  $\dim C(G)$  gelijk aan het aantal conjugatieklassen. Karakters zijn klassefuncties, en de volgende stelling zegt dat  $C(G)$  als lineaire ruimte wordt opgespannen door de karakters.

**Stelling 5.13 (volledigheid van irreducibele karakters)** De irreducibele karakters  $\chi_1, \dots, \chi_s$  van  $G$  zijn een orthonormale basis van  $C(G)$  of anders gezegd  $s = \#$  irreducibele karakters =  $\#$  conjugatieklassen.

**Bewijsschets.** We schetsen het bewijs in stappen.

**Stap 1:** Als  $\rho : G \rightarrow GL(V)$  een representatie en  $\varphi \in L(G)$  dan definiëren we de operator  $\rho(\varphi) : V \rightarrow V$  door

$$\rho(\varphi) = \sum_x \varphi(x)\rho(x) \in \text{Hom}(V, V).$$

**Stap 2:** Als  $\varphi \in C(G)$  dan is  $\rho(\varphi) \in \text{Hom}(V, V)^G$  intertwiner.

**Stap 3:** Voor de reguliere representatie  $\lambda$  van  $G$  op  $L(G)$  geldt dat  $\lambda(\varphi)\delta_e = \varphi$  voor elke  $\varphi \in L(G)$ .

**Stap 4:** Als  $\rho : G \rightarrow GL(V)$  een irreducibele representatie en  $\varphi \in C(G)$  dan is  $\rho(\varphi) = \lambda I$  vanwege Stap 2 en het Lemma van Schur. De scalar  $\lambda$  berekent men door aan beide zijden het spoor te nemen

$$\lambda = (\dim V)^{-1} \cdot \text{tr}(\rho(\varphi)) = (\dim V)^{-1} \cdot \sum_x \varphi(x)\text{tr}(\rho(x)) = \frac{|G|(\varphi|\chi_{\rho^*})}{\dim(V)}.$$

**Stap 5:** Zij  $\psi \in C(G)$  en  $(\psi|\chi_1) = \dots = (\psi|\chi_s) = 0$ . Dan is  $\rho(\psi) = 0$  voor elke irreducibele representatie  $\rho$  van  $G$  vanwege Stap 4. Maar dan ook  $\rho(\psi) = 0$  voor een willekeurige representatie  $\rho$  van  $G$  via ontbinding van  $\rho$  in irreducibele factoren.

**Stap 6:** Zij  $\psi \in C(G)$  en  $(\psi|\chi_1) = \dots = (\psi|\chi_s) = 0$ . Dan geldt met  $\lambda$  de reguliere representatie van  $G$  dat  $\psi = \lambda(\psi)\delta_e$  (pas Stap 3 toe) = 0 (pas Stap 5 toe met  $\rho = \lambda$ ).

Hiermee is de volledigheid van irreducibele karakters bewezen. □

## Opgaven

5.1. Zij  $\rho$  de standaardrepresentatie van de diëdergroep  $D_n = C_n \cup C_n t$  op  $\mathbb{C}^2$  en  $\chi$  het karakter van  $\rho$ .

1. Bereken  $\chi(r^j)$  en  $\chi(r^j t)$  voor  $j = 0, \dots, n-1$ .

2. Ga na dat  $(\chi|\chi) = 1$  als  $n \geq 3$ . Hiermee is een ander bewijs gegeven van de irreducibiliteit van  $\rho$  voor  $n \geq 3$  dan de expliciete berekening in Voorbeeld 4.8.

- 5.2. Zij  $\rho$  de standaardrepresentatie van de tetraëdergroep  $T = A_4$  op  $\mathbb{C}^3$  en  $\chi$  het karakter van  $\rho$ .
1. Ga na dat  $(\chi|\chi) = 1$  en concludeer dat  $\rho$  irreducibel is.
  2. Bewijs (door Gevolg 5.11 te gebruiken) dat  $s = 4$  en (bij geschikte nummering)  $n_1 = n_2 = n_3 = 1, n_4 = 3$ .
  3. Bepaal de multipliciteit waarmee  $\rho$  voorkomt in  $\rho \otimes \rho$ .
- 5.3. Bewijs de irreducibiliteit van de standaardrepresentatie van de quaterniongroep  $A$  (vergelijk Opgave 4.1) met karaktertheorie.
- 5.4. Zij  $G_1 \times G_2$  het direct product van de groepen  $G_1$  en  $G_2$  (zoals gedefinieerd in Opgave 1.3). Voor  $\rho_1 : G_1 \rightarrow GL(V_1)$  en  $\rho_2 : G_2 \rightarrow GL(V_2)$  beide representaties definiëren we

$$\rho_1 \times \rho_2 : G_1 \times G_2 \rightarrow GL(V_1 \otimes V_2)$$

door  $\rho_1 \times \rho_2(a_1, a_2) = \rho_1(a_1) \otimes \rho_2(a_2)$  voor  $a_1 \in G_1, a_2 \in G_2$ .

1. Bewijs dat  $\rho_1 \times \rho_2$  een representatie van  $G_1 \times G_2$  op de vectorruimte  $V_1 \otimes V_2$  is. Deze representatie  $\rho_1 \times \rho_2$  heet het *witwendig product* van de representaties  $\rho_1$  en  $\rho_2$ .
  2. Bewijs dat  $\chi_{\rho_1 \times \rho_2}(a_1, a_2) = \chi_{\rho_1}(a_1)\chi_{\rho_2}(a_2)$  voor  $a_1 \in G_1, a_2 \in G_2$ .
  3. Laat  $\rho_{11}, \dots, \rho_{1s_1}$  de inequivalente irreducibele representaties van  $G_1$  en  $\rho_{21}, \dots, \rho_{2s_2}$  die van  $G_2$ . Bewijs dat  $\rho_{1i} \times \rho_{2j}$  voor  $i = 1, \dots, s_1$  en  $j = 1, \dots, s_2$  onderling inequivalente irreducibele representaties van  $G_1 \times G_2$  zijn. Hint: Bereken  $(\chi_{\rho_{1i} \times \rho_{2j}} | \chi_{\rho_{1k} \times \rho_{2l}})$  voor  $i, k = 1, \dots, s_1$  en  $j, l = 1, \dots, s_2$ .
  4. Bewijs door gebruikmaking van Opgave 2.7 dat iedere irreducibele representatie van  $G_1 \times G_2$  equivalent is met  $\rho_1 \times \rho_2$  voor zekere irreducibele representaties  $\rho_1$  van  $G_1$  en  $\rho_2$  van  $G_2$ .
- 5.5. Bewijs dat een representatie  $\rho : G \rightarrow GL_n(\mathbb{C})$  irreducibel is dan en slechts dan als de duale representatie  $\rho^*$  irreducibel is.

## 6 Karaktertabellen van enkele groepen

Zij  $G$  een eindige groep met conjugatieklassen  $C_1 = \{e\}$ ,  $C_2, \dots, C_s$  en representanten  $a_1 = e, a_2 \in C_2, \dots, a_s \in C_s$ . Laat  $\chi_1, \dots, \chi_s$  de irreducibele karakters van  $G$  zijn met  $\chi_1(a) = 1 \forall a \in G$  het triviale karakter. De karaktertabel van  $G$  is het schema

$G$	$e$	$a_2$	$\dots$	$a_s$
$\chi_1$	1	1	$\dots$	1
$\chi_2$	$n_2$	$\chi_2(a_2)$	$\dots$	$\chi_2(a_s)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
$\chi_s$	$n_s$	$\chi_s(a_2)$	$\dots$	$\chi_s(a_s)$

dus op de rij met index  $\chi_i$  schrijven we de waarden  $n_i = \chi_i(e), \chi_i(a_2), \dots, \chi_i(a_s)$  van het irreducibel karakter  $\chi_i$  op de diverse conjugatieklassen.

**Voorbeeld 6.1** Voor de cyclische groep  $C_n$  (met  $n = 1, \dots, 5$ ) krijgen we de karaktertabellen

$C_1$	$e$			
$\chi_1$	1			

$C_2$	$e$	$r$		
$\chi_1$	1	1		
$\chi_2$	1	-1		

$C_3$	$e$	$r$	$r^2$	
$\chi_1$	1	1	1	
$\chi_2$	1	$\omega$	$\omega^2$	
$\chi_3$	1	$\omega^2$	$\omega$	

$C_4$	$e$	$r$	$r^2$	$r^3$
$\chi_1$	1	1	1	1
$\chi_2$	1	$i$	-1	- $i$
$\chi_3$	1	-1	1	-1
$\chi_4$	1	- $i$	-1	$i$

$C_5$	$e$	$r$	$r^2$	$r^3$	$r^4$
$\chi_1$	1	1	1	1	1
$\chi_2$	1	$\zeta$	$\zeta^2$	$\zeta^3$	$\zeta^4$
$\chi_3$	1	$\zeta^2$	$\zeta^4$	$\zeta$	$\zeta^3$
$\chi_4$	1	$\zeta^3$	$\zeta$	$\zeta^4$	$\zeta^2$
$\chi_5$	1	$\zeta^4$	$\zeta^3$	$\zeta^2$	$\zeta$

met  $\omega = \exp(2\pi i/3)$  en  $\zeta = \exp(2\pi i/5)$ . Merk op dat  $\chi_3 = \chi_2^2$ ,  $\chi_4 = \chi_2^3$  en  $\chi_5 = \chi_2^4$ .

**Voorbeeld 6.2** De karaktertabel van de viergroep  $V_4$  wordt eenvoudig gevonden als

$V_4$	$e$	$a$	$b$	$c$
$\chi_1$	1	1	1	1
$\chi_2$	1	-1	1	-1
$\chi_3$	1	1	-1	-1
$\chi_4$	1	-1	-1	1

**Voorbeeld 6.3** Voor de diëdergroep  $D_n$  (met  $n = 3, 4, 5, 6$ ) vinden we de karaktertabellen

$D_3$	$e$	$r$	$t$
$\chi_1$	1	1	1
$\chi_2$	1	1	-1
$\chi_3$	2	-1	0

$D_4$	$e$	$r$	$r^2$	$t$	$s = rt$
$\chi_1$	1	1	1	1	1
$\chi_2$	1	1	1	-1	-1
$\chi_3$	1	-1	1	1	-1
$\chi_4$	1	-1	1	-1	1
$\chi_5$	2	0	-2	0	0

$D_5$	$e$	$r$	$r^2$	$t$
$\chi_1$	1	1	1	1
$\chi_2$	1	1	1	-1
$\chi_3$	2	$-\tau'$	$-\tau$	0
$\chi_4$	2	$-\tau$	$-\tau'$	0

$D_6$	$e$	$r$	$r^2$	$r^3$	$t$	$s = rt$
$\chi_1$	1	1	1	1	1	1
$\chi_2$	1	1	1	1	-1	-1
$\chi_3$	1	-1	1	-1	1	-1
$\chi_4$	1	-1	1	-1	-1	1
$\chi_5$	2	1	-1	-2	0	0
$\chi_6$	2	-1	-1	2	0	0

met  $\tau = -(\zeta^2 + \zeta^{-2}) = (1 + \sqrt{5})/2$  als oplossing van  $\tau^2 = \tau + 1$  en evenzo  $\tau' = -(\zeta + \zeta^{-1}) = (1 - \sqrt{5})/2$ . Het karakter  $\chi_2$  heet de *tekenrepresentatie* van  $D_n$ . Voor  $n = 3, 5$  is  $\chi_3$  het karakter van de standaardrepresentatie. Voor  $n = 5$  ontbinden we  $\chi_3^2$  als som van irreducibele karakters:  $(\chi_3^2|\chi_1) = (\chi_3^2|\chi_2) = 1$  en  $(\chi_3^2|\chi_3) = 0$ . We vinden dus  $\chi_3^2 = \chi_1 + \chi_2 + \chi_4$  met  $\chi_4$  een nieuw karakter. Berekening geeft  $(\chi_4|\chi_4) = 1$ , zodat  $\chi_4$  het resterend irreducibel karakter van  $D_5$  is.

Veronderstel nu dat  $n = 2m$  even. De ondergroep  $C_m = \langle r^2 \rangle$  is normaaldeeler van  $D_n$  en  $D_n/C_m = V_4$  als we stellen  $a = rC_m$ ,  $b = tC_m$ ,  $c = rtC_m$ . We krijgen dus 4 irreducibele karakters  $\chi_1, \chi_2, \chi_3, \chi_4$  van  $D_n$  van dimensie 1 die afkomen van  $V_4$  (zie Voorbeeld 6.2). Voor  $n = 4, 6$  is  $\chi_5$  het karakter van de standaardrepresentatie. Voor  $n = 6$  vinden we het resterende irreducibel karakter  $\chi_6$  door  $\chi_6 = \chi_3\chi_5$  als karakter van  $\rho_3 \otimes \rho_5$ .

**Voorbeeld 6.4** Voor de alternerende groep  $A_4$  vinden we de karaktertabel (met  $\omega = \exp(2\pi i/3)$ )

$A_4$	$e$	(12)(34)	(123)	(132)
$\chi_1$	1	1	1	1
$\chi_2$	1	1	$\omega$	$\omega^2$
$\chi_3$	1	1	$\omega^2$	$\omega$
$\chi_4$	3	-1	0	0

Het irreducibel karakter  $\chi_4$  is het karakter van de standaardrepresentatie van de tetraëdergroep  $T = A_4$  op  $\mathbb{C}^3$ . De relatie  $|G| = n_1^2 + \dots + n_s^2$  geeft  $3 = n_1^2 + \dots + n_{s-1}^2$  zodat  $s = 4$  en  $n_1 = n_2 = n_3 = 1$ . Omdat  $A_4 = V_4 \rtimes A_3$  zodat  $A_4/V_4 \cong A_3 \cong C_3$  vinden we de karakters  $\chi_1, \chi_2, \chi_3$  uit de karaktertabel van  $C_3$ .

**Voorbeeld 6.5** Voor de symmetrische groep  $S_4$  vinden we de karaktertabel

$S_4$	$e$	$(12)$	$(12)(34)$	$(123)$	$(1234)$
$\chi_1$	1	1	1	1	1
$\chi_2$	1	-1	1	1	-1
$\chi_3$	2	0	2	-1	0
$\chi_4$	3	1	-1	0	-1
$\chi_5$	3	-1	-1	0	1

De conjugatieklassen van  $S_4$  zijn bepaald aan het slot van §2, en hebben 1, 6, 3, 8, 6 elementen respectievelijk. Het karakter  $\chi_2$  is de tekenrepresentatie van  $S_4$ . Omdat  $S_4 = V_4 \rtimes S_3$  zodat  $S_4/V_4 \cong S_3 \cong D_3$  vinden we het karakter  $\chi_3$  uit de karaktertabel van  $D_3$ . Het irreducibel karakter  $\chi_4$  is het karakter van de standaardrepresentatie van  $T_d \cong S_4$  op  $\mathbb{C}^3$ . Het resterend irreducibel karakter  $\chi_5 = \chi_2\chi_4$  is het karakter van het  $\rho_5 = \rho_2 \otimes \rho_4$ .

**Voorbeeld 6.6** Zij  $s : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  met  $s(x) = -x$  de *centrale inversie* van  $\mathbb{R}^3$ . De verzameling

$$O_h = T_d \cup T_d s = T_d \cup sT_d$$

is dan ondergroep van  $O_3(\mathbb{R})$  en is de symmetriegroep van een kubus met hoekpunten  $\{\pm A, \pm B, \pm C, \pm D\}$  als in Voorbeeld 3.9. Ook is  $O_h$  de symmetriegroep van een octaëder met hoekpunten  $(\pm 1, 0, 0), (0, \pm 1, 0), (0, 0, \pm 1)$ . De *octaëdergroep*  $O$  is per definitie de rotatiesymmetriegroep van de octaëder, dus  $O = O_h \cap SO_3(\mathbb{R})$ . Het is duidelijk dat  $O_h = O \times \{e, s\}$  een direct product is. Men kan inzien dat  $O \cong S_4$  als permutatiegroep van de 4 diagonalen in de kubus.

Als  $\rho : O \rightarrow GL(V)$  een irreducibele representatie is dan krijgen we 2 irreducibele representaties  $\rho_+$  en  $\rho_-$  van  $O_h$  op  $V$  gedefinieerd door

$$\rho_+(a) = \rho_-(a) = \rho(a), \quad \rho_+(as) = \rho(a), \quad \rho_-(as) = -\rho(a)$$

voor  $a \in O$ . De bijbehorende karakters  $\chi_+$  en  $\chi_-$  worden gegeven door

$$\chi_+(a) = \chi_-(a) = \chi(a), \quad \chi_+(as) = \chi(a), \quad \chi_-(as) = -\chi(a)$$

voor  $a \in O$ . Alle irreducibele karakters van  $O_h$  worden op deze wijze verkregen. De hier beschreven method is een speciaal geval van een algemene constructie zoals uiteengezet in Opgave 5.4. De karaktertabel van de groep  $O_h$  wordt dus

$O_h$	$a_j$	$a_j s$
$\chi_{i,+}$	$X$	$X$
$\chi_{i,-}$	$X$	$-X$

met  $X$  de karaktertabel van  $O \cong S_4$  (zoals bepaald in Voorbeeld 6.5).

**Voorbeeld 6.7** Beschouw de icoesaëder met hoekpunten de 12 punten  $(\pm\tau, \pm 1, 0)$ ,  $(0, \pm\tau, \pm 1)$ ,  $(\pm 1, 0, \pm\tau)$  met  $\tau = 2 \cos(\pi/5) = (1 + \sqrt{5})/2$  en  $\tau^2 = \tau + 1$  als in Voorbeeld 6.3. Er zijn 30 ribben van gelijke lengte 2 en 20 gelijkzijdige driehoeken als zijvlakken, In elk hoekpunt komen 5 ribben samen. De icoesaëder heeft dus tweevoudige, drievoudige en vijfvoudige rotatiesymmetrie.

**Stelling 6.8** De 15 lijnen door middens van overstaande ribben vallen uiteen in 5 orthogonale drietallen, en de icoesaëder heeft als rotatiesymmetriegroep  $I \cong A_5$  de groep van even permutaties van deze 5 drietallen. De groep  $I$  heet de *icoesaëdergroep*.

We bepalen de karaktertabel van  $A_5$ . Er zijn 5 conjugatieklassen met representanten  $e$ ,  $a = (12)(34)$ ,  $b = (123)$ ,  $c = (12345)$ ,  $d = c^2 = (13524)$  met elk 1, 15, 20, 12, 12 elementen respectievelijk. Merk op dat conjugatie met een oneven permutatie uit  $S_5$  de klassen van  $c$  en  $d$  verwisselt. De karaktertabel van  $A_5$  wordt nu

$A_5$	$e$	$a$	$b$	$c$	$d$
$\chi_1$	1	1	1	1	1
$\chi_2$	3	-1	0	$\tau$	$\tau'$
$\chi_3$	3	-1	0	$\tau'$	$\tau$
$\chi_4$	4	0	1	-1	-1
$\chi_5$	5	1	-1	0	0

Het spoor van een rotatie van  $\mathbb{R}^3$  van orde 2 en 3 is gelijk aan  $-2 + 1 = -1$  en  $-1 + 1 = 0$  respectievelijk. Voor een rotatie van orde 5 is het spoor gelijk aan  $\zeta + \zeta^{-1} + 1 = -(\zeta^2 + \zeta^{-2}) = \tau = (1 + \sqrt{5})/2$  of  $\zeta^2 + \zeta^{-2} + 1 = (\zeta + \zeta^{-1}) = \tau' = (1 - \sqrt{5})/2$ . Voor de karakters  $\chi_2$  en  $\chi_3$  vinden we de waarden als in de tabel. Eenvoudige berekening geeft  $(\chi_2|\chi_2) = (\chi_3|\chi_3) = 1$  zodat  $\chi_2$  en  $\chi_3$  inderdaad irreducibele karakters zijn. De representatie  $\rho_4$  is de beperking van de spiegelingenrepresentatie (zie Opgave 4.3) van  $S_5$  op  $\mathbb{C}^4$  tot de ondergroep  $A_5$ . Men rekent direct na dat  $(\chi_4|\chi_4) = 1$  en dus is  $\chi_4$  een irreducibel karakter. Bereken nu  $(\chi_2\chi_3|\chi_4) = (36 + 12 + 12)/60 = 1$ , en dus is  $\chi_5 := \chi_2\chi_3 - \chi_4$  het karakter van een representatie  $\rho_5$ . Controleer tenslotte dat  $(\chi_5|\chi_5) = (25 + 15 + 20)/60 = 1$  en dus is  $\chi_5$  het resterend irreducibel karakter.

De volledige symmetriegroep

$$I_h = I \cup Is \cong A_5 \times C_2$$

van het icoesaëder heeft 10 irreducibele karakters  $\chi_{1,\pm}, \dots, \chi_{5,\pm}$  en de karaktertabel van  $I_h$  wordt verkregen uit die van  $I$  op dezelfde wijze als de karaktertabel van  $O_h$  wordt verkregen uit die van  $O$  (zie Voorbeeld 6.6).

## Opgaven

- 6.1. Bepaal de karaktertabel van de quaterniongroep  $Q$  (zie Opgave 2.5, 3.2 en 4.1). Merk op dat bij een geschikte nummering en benaming de karaktertabellen van  $D_4$  en  $Q$  gelijk zijn (terwijl  $D_4 \not\cong Q$ ).
- 6.2 Controleer voor  $D_5$  de berekeningen dat  $(\chi_3^2|\chi_1) = (\chi_3^2|\chi_2) = 1$  en  $(\chi_3^2|\chi_3) = 0$ .
- 6.3 Kies een spiegeling  $t \in T_d$  en zij  $K = \{e, t, s, ts\} \subset O_h$ .
1. Bewijs dat  $O_h = T \rtimes K$ .
  2. Bewijs dat  $T_d = T \cup tT$  isomorf is met  $O = T \cup stT$ , en dus beide isomorf met  $S_4$ .
  3. Bewijs dat  $T_h = T \cup sT$  isomorf is met  $A_4 \times C_2$  (en dus niet isomorf met  $S_4$ ).
  4. Bewijs dat  $O_h = O \cup sO$ .
- De conclusie is dus dat  $G_h = G \cup sG \cong G \times C_2$  voor  $G = T, O, I$ .
- 6.4 Bepaal voor de groep  $A_5$  de ontbinding van het karakter  $\chi_2^2$  als som van irreducibele karakters.

## 7 Moleculaire trillingen

Beschouw een molecuul  $M$  in  $\mathbb{R}^3$  bestaande uit  $n$  atomen genummerd  $1, \dots, n$ . Veronderstel dat  $q = (q_1, \dots, q_n) \in \mathbb{R}^{3n}$  een evenwichtspositie voor  $M$  is, waarbij  $q_j \in \mathbb{R}^3$  de positie van het  $j^{\text{de}}$  atoom is. We onderzoeken kleine uitwijkingen  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{3n}$  vanuit deze evenwichtspositie  $q$ , dus  $M$  bevindt zich dan in positie  $q + x$ . De kinetische energie  $K$  bij uitwijking  $x = x(t)$  op tijd  $t$  wordt

$$K = \frac{1}{2} \langle \dot{x}, \dot{x} \rangle$$

waarbij we  $\mathbb{R}^{3n}$  voorzien van het inproduct  $\langle x, y \rangle = \langle (x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \rangle = m_1 \langle x_1, y_1 \rangle + \dots + m_n \langle x_n, y_n \rangle$  met  $m_j$  de massa van het  $j^{\text{de}}$  atoom en  $(\cdot, \cdot)$  het inproduct op  $\mathbb{R}^3$ . De potentiële energie  $V$  is in eerste benadering een kwadratisch polynoom

$$V = \frac{1}{2} \langle x, Hx \rangle$$

met  $H : \mathbb{R}^{3n} \rightarrow \mathbb{R}^{3n}$  een symmetrische operator dus  $\langle Hx, y \rangle = \langle x, Hy \rangle$  voor alle  $x, y \in \mathbb{R}^{3n}$ . Inderdaad het lineaire deel van  $V$  is 0 omdat  $x = 0$  evenwichtspositie van  $M$  is, en kubische en hogere orde termen van  $V$  worden verwaarloosd omdat  $x$  een kleine uitwijking. De operator  $H$  heet de Hessiaan van  $V$ . De bewegingsvergelijking wordt dan volgens Newton

$$\ddot{x} + Hx = 0.$$

Is  $f_1, \dots, f_{3n}$  een orthonormale basis van  $\mathbb{R}^{3n}$  ten opzichte waarvan  $H$  diagonaliseert met eigenwaarden  $k_1, \dots, k_{3n}$  en schrijven we  $x = z_1 f_1 + \dots + z_{3n} f_{3n}$  dan wordt de bewegingsvergelijking

$$\ddot{z}_j + k_j z_j = 0 \quad \text{voor } j = 1, \dots, 3n.$$

Definieer de *translatiedeelruimte*  $T$  en de *rotatiedeelruimte*  $R$  van  $\mathbb{R}^{3n}$  door

$$\begin{aligned} T &= \{(v, \dots, v) \in \mathbb{R}^{3n}; v \in \mathbb{R}^3\} \\ R &= \{([u, q_1], \dots, [u, q_n]) \in \mathbb{R}^{3n}; u \in \mathbb{R}^3\} \end{aligned}$$

met  $[u, v] = u \times v$  het uitproduct op  $\mathbb{R}^3$ . Veronderstellen we dat de potentiële energie  $V$  invariant is onder translaties en rotaties van  $M$  als geheel dan volgt  $V(x) = 0$  voor  $x \in T + R$ . Veronderstellen we dat  $q_1, \dots, q_n$  niet op een rechte lijn in  $\mathbb{R}^3$  liggen, dan kan men laten zien dat  $\dim R = 3$  en  $T \cap R = 0$  zodat  $\dim(T + R) = 6$ . We kunnen de orthonormale basis  $f_1, \dots, f_{3n}$  van  $\mathbb{R}^{3n}$  wel zodanig kiezen dat  $f_{3n-5}, \dots, f_{3n}$  een basis is van  $T + R$ , en dus  $k_j = 0$  voor  $j = 3n - 5, \dots, 3n$ . Tenslotte veronderstellen we dat  $q$  een stabiele evenwichtspositie van  $M$  is, hetgeen betekent dat  $k_j > 0$  voor  $j = 1, \dots, 3n - 6$ . De bewegingen waarbij  $M$  als geheel niet verschuift of draait zijn dus superposities van  $(3n - 6)$  harmonische eigentrillingen met frequenties  $\nu_j = \sqrt{k_j}$  voor  $j = 1, \dots, 3n - 6$ . Voor een kwantitatieve bepaling van deze frequenties moet men de symmetrische operator  $H : \mathbb{R}^{3n} \rightarrow \mathbb{R}^{3n}$  expliciet kennen. Heeft  $M$  in positie  $q$  een voldoende rijke symmetrie,

dan stelt kennis van deze symmetriegroep ons in staat een aantal opmerkelijke kwalitatieve conclusies te trekken.

Veronderstel dat het  $i^{\text{de}}$  atoom en het  $j^{\text{de}}$  atoom alleen dan gelijke massa hebben als ze identiek zijn. Nemen we het zwaartepunt  $\sum_1^n m_j q_j / \sum_1^n m_j$  van  $M$  als oorsprong van  $\mathbb{R}^3$  dan wordt de symmetriegroep  $G$  van  $M$  in evenwichtspositie  $q$  gegeven door

$$G = \{a \in O(\mathbb{R}^3); \forall i \exists j \text{ met } m_i = m_j \text{ en } aq_i = q_j\}.$$

Als ondergroep van  $O(\mathbb{R}^3)$  heeft  $G$  een standaardrepresentatie  $\pi : G \rightarrow GL(\mathbb{C}^3)$  met karakter  $\chi$ . Elk element  $a \in G$  geeft een permutatie  $\sigma_a \in S_n$  door  $\sigma_a(i) = j$  als  $aq_i = q_j$ . We definiëren de natuurlijke representatie  $\Pi$  van  $G$  op  $\mathbb{R}^{3n}$  door

$$\Pi(a)(x_1, \dots, x_n) = (ax_{\sigma_a^{-1}(1)}, \dots, ax_{\sigma_a^{-1}(n)})$$

voor  $a \in G$  en  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{3n}$ .

**Stelling 7.1 (Regel van Wigner).** Het karakter  $X$  van de natuurlijke representatie  $\Pi$  van  $G$  op  $\mathbb{R}^{3n}$  wordt gegeven door

$$X(a) = \#\{i; \sigma_a(i) = i\} \cdot \chi(a).$$

**Bewijs.** We vatten  $\Pi(a)$  op als een  $n \times n$  matrix met als matrixelementen  $3 \times 3$  matrices. Op de hoofddiagonaal staat op plaats  $(i, i)$  de matrix  $\pi(a)$  als  $\sigma_a(i) = i$  en 0 als  $\sigma_a(i) \neq i$ . De regel is dus duidelijk.  $\square$

De translatiedeelruimte  $T$  van  $\mathbb{R}^{3n}$  is een invariante deelruimte want

$$\Pi(a)(v, \dots, v) = (av, \dots, av) \in T$$

voor  $a \in G$  en  $v \in \mathbb{R}^3$ . De deelrepresentatie  $\Pi_T$  is dus equivalent met  $\pi$  en heeft karakter  $X_T = \chi$ . De rotatiedeelruimte  $R$  van  $\mathbb{R}^{3n}$  is ook invariant want

$$\begin{aligned} \Pi(a)([u, q_1], \dots, [u, q_n]) &= \\ \left( a \begin{bmatrix} u \\ q_{\sigma_a^{-1}(1)} \end{bmatrix}, \dots, a \begin{bmatrix} u \\ q_{\sigma_a^{-1}(n)} \end{bmatrix} \right) &= \\ \det(a)([au, q_1], \dots, [au, q_n]) & \end{aligned}$$

omdat  $a[u, v] = \det(a)[au, av]$  voor  $a \in G$  en  $u, v \in \mathbb{R}^3$ . De deelrepresentatie  $\Pi_R$  is dus equivalent met  $\det \otimes \pi$  en heeft karakter  $X_R = \det \cdot \chi$ . We krijgen dus een orthogonale opsplitsing in invariante deelruimten

$$\mathbb{R}^{3n} = V \oplus T \oplus R$$

met  $V$  het opspannel van  $f_1, \dots, f_{3n-t}$ . Het karakter  $X_V$  van de deelrepresentatie  $\Pi_V$  is dus

$$X_V = X - \chi - \det \cdot \chi$$

en kan berekend worden met behulp van de regel van Wigner. Aangezien de symmetriegroep  $G$  de bewegingsvergelijking behoudt krijgen we

$$\Pi(a)H = H\Pi(a) \quad \text{voor alle } a \in G.$$

De eigenruimte  $V_\nu = \{v \in H; Hv = \nu^2 v\}$  is dus invariant, en de eigenruimteopsplitsing van  $H$  op de *vibratiedeelruimte*  $V$

$$V = \bigoplus_{\nu > 0} V_\nu$$

is een opsplitsing van  $V$  in invariante deelruimten.

**Definitie 7.2** Als de deelrepresentatie  $\Pi_\nu$  van  $G$  op  $V_\nu$  irreducibel is voor alle  $\nu > 0$  met  $V_\nu \neq 0$  dan zegt men dat de operator  $H$  op  $V$  *natuurlijke ontaarding* heeft voor  $G$ . Zo niet dan spreekt men van *toevallige ontaarding*.

In de regel hebben we natuurlijke ontaarding. Een toevallige ontaarding kan worden opgeheven door een kleine nog steeds met  $G$  commuterende verstoring  $H'$  van  $H$ . Toevallige ontaarding kan er ook op wijzen dat  $G$  nog niet de volledige symmetriegroep voor het gestelde probleem is. We nemen in de rest van deze paragraaf aan dat  $H$  op  $V$  natuurlijke ontaarding voor  $G$  heeft.

**Conclusie 7.3** Het *vibratiespectrum* van  $M$  is  $\{\nu > 0; V_\nu \neq 0\}$  en dus de wortel uit het eigenwaardespectrum van  $H$  op  $V$ . Het aantal frequenties in het vibratiespectrum van  $M$  is dus (hoogstens) gelijk aan het aantal irreducibele factoren van de representatie  $\Pi_V : G \rightarrow GL(V)$ . Dit kan significant kleiner zijn dan  $3n - 6$ .

De frequenties in het vibratiespectrum van  $M$  kan men experimenteel vaststellen op een aantal manieren. Bij elke vorm van experiment meet men slechts bepaalde frequenties in het vibratiespectrum gegeven door een zogenaamde *selectieregel*. Het meest gebruikelijke experiment is door licht te schijnen op  $M$  en aan het verstrooide licht het infraroodspectrum te meten. De selectieregel voor infraroodspectroscopie zegt:

De frequentie  $\nu > 0$  komt voor in het *infraroodspectrum* van  $M \iff$  de irreducibele representatie  $\Pi_\nu$  van  $G$  op  $V_\nu$  komt voor in de standaardrepresentatie  $\pi : G \rightarrow O(\mathbb{R}^3)$ .

Met karaktertheorie vertaalt deze selectieregel zich in  $(\chi|X_\nu) \geq 1$ . Hierbij is  $X_\nu$  het karakter van de representatie  $\Pi_\nu$  van  $V_\nu$ .

Een alternatieve vorm van spectroscopie werd ontdekt door Raman in 1928. De selectieregel voor Ramanspectroscopie luidt:

De frequentie  $\nu > 0$  komt voor in het *Ramanspectrum* van  $M \iff$  de irreducibele representatie  $\Pi_\nu$  van  $G$  komt voor in de tweede symmetrische macht  $S^2(\pi)$  van de standaardrepresentatie  $\pi : G \rightarrow O(\mathbb{R}^3)$ .

Het tensorproduct  $\pi \otimes \pi$  ontbindt altijd in symmetrische en antisymmetrische tensoren:  $\pi \otimes \pi = S^2(\pi) \oplus A^2(\pi)$ . De representatie  $\pi$  is zelfduaal omdat  $\bar{\chi} = \chi$ . Dit impliceert  $A^2(\pi) = \Pi_R$  want  $\Pi_R$  is de representatie van  $G$  op antisymmetrische  $3 \times 3$  matrices door middel van conjugatie. Het karakter van  $S^2(\pi)$  is dus gelijk aan  $\chi^2 - \det \cdot \chi$ . De selectieregel voor de frequentie  $\nu > 0$  in het Ramanspectrum wordt dus  $(\chi^2 - \det \cdot \chi | X_\nu) \geq 1$ . Het volledige vibratiespectrum van  $M$  kan worden bepaald met behulp van neutronenverstrooiing.

**Conclusie 7.4** Zij  $\nu > 0$  een frequentie in het vibratiespectrum van  $M$ .

Selectieregel voor  $\nu$  in infraroodspectrum:  $(\chi | X_\nu) \geq 1$ .

Selectieregel voor  $\nu$  in Ramanspectrum:  $(\chi^2 - \det \cdot \chi | X_\nu) \geq 1$ .

**Voorbeeld 7.5** Een molecuul  $XY_3$  met het  $X$ -aatom in de oorsprong van  $\mathbb{R}^3$  en de drie  $Y$ -atomen op de plaatsen  $(2, 0, 0)$ ,  $(-1, \sqrt{3}, 0)$ ,  $(-1, -\sqrt{3}, 0)$ . De symmetriegroep  $G$  is de groep  $D_{3h} = D_3 \times C_2$  met  $D_3 = \{e, r, r^2, t, rt, r^2t\}$  en  $C_2 = \{e, s\}$  waarbij

$$r = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\sqrt{3} & 0 \\ +\frac{1}{2}\sqrt{3} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, s = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Met de karakertabel van  $D_3$  zoals uitgerekend in Voorbeeld 6.3 krijgen we (met  $\chi_5 = \det$ )

$D_{3h}$	$e$	$r$	$t$	$s$	$rs$	$ts$
$\chi_1$	1	1	1	1	1	1
$\chi_2$	1	1	-1	1	1	-1
$\chi_3$	2	-1	0	2	-1	0
$\chi_4$	1	1	1	-1	-1	-1
$\chi_5$	1	1	-1	-1	-1	1
$\chi_6$	2	-1	0	-2	1	0
$\chi$	3	0	1	1	-2	-1
$\det \cdot \chi$	3	0	-1	-1	2	-1
$X$	12	0	2	4	-2	-2
$X_V$	6	0	2	4	-2	0
$\chi^2 - \det \cdot \chi$	6	0	2	2	2	2

Men controleert eenvoudig dat  $X_V = \chi_1 + 2\chi_3 + \chi_4$ ,  $\chi = \chi_3 + \chi_4$  en  $\chi^2 - \det \cdot \chi = 2\chi_1 + \chi_3 + \chi_6$ . Het volledige vibratiespectrum heeft dus 4 frequenties. Hiervan zien we er 3 in het infraroodspectrum, en ook 3 in het Ramanspectrum. Het infraroodspectrum en het Ramanspectrum hebben 2 frequenties gemeen.

**Voorbeeld 7.6** Het *buckminsterfullerene* molecuul  $C_{60}$  of kortweg de *buckyball* (genoemd naar de architect Buckminster Fuller) heeft 60 koolstofatomen op de hoekpunten van een

afgeknot icoesaëder. Op elke ribbe van het icoesaëder (totaal 30 stuks) liggen dus 2 koolstofatomen die de ribbe verdelen in een verhouding  $l : k : l$ . De symmetriegroep  $G$  is de groep  $I_h = I \times C_2$  met  $I$  de icoesaëdergroep en  $C_2 = \{e, s\}$  met  $s$  de centrale inversie. De 10 irreducibele karakters  $\chi_{1,\pm}, \dots, \chi_{5,\pm}$  op de conjugatieklassen met als representant  $e, a, b, c, d, s, as, bs, cs, ds$  zijn beschreven in Voorbeeld 6.7. De standaardrepresentatie  $\pi : I_h \rightarrow GL_3(\mathbb{C})$  is irreducibel met karakter  $\chi = \chi_{2,-}$ . Evenzo is  $\det \otimes \pi$  ook irreducibel met karakter  $\chi_{2,+}$ . De tweede symmetrische macht  $S^2(\pi)$  heeft karakter  $S^2(\chi) = \chi^2 - \det \cdot \chi$  en men rekent direct na dat  $S^2(\chi) = \chi_{1,+} + \chi_{5,+}$ . De natuurlijke representatie  $\Pi$  van  $I_h$  op  $\mathbb{R}^{180}$  heeft karakter  $X$ . Met behulp van de regel van Wigner vindt men

$$X(x) = \begin{cases} 180 & \text{als } x = e \\ 4 & \text{als } x = as \\ 0 & \text{anders} \end{cases}$$

Inderdaad de enige groeps-elementen die minsten één koolstofatoom vastlaten zijn het eenheidselement  $e$  (en wel alle 60 koolstofatomen) of een spiegeling  $as$  (en wel precies 4 koolstofatomen op de bijbehorende spiegel). Een eenvoudige berekening geeft

$$\begin{aligned} (X|\chi_{2,-}) &= (180.3 + 15.4.1)/120 = 5 \\ (X|\chi_{1,+}) &= (180.1 + 15.4.1)/120 = 2 \\ (X|\chi_{5,+}) &= (180.5 + 15.4.1)/120 = 8 \end{aligned}$$

en omdat  $X_V = X - \chi - \det \cdot \chi = X - \chi_{2,-} - \chi_{2,+}$  komen we tot de volgende conclusie. Het infraroodspectrum heeft 4 frequenties en het Ramanspectrum 10 frequenties.

Men kan narekenen dat het volledige vibratiespectrum 46 frequenties heeft. Het  $C_{60}$ -molecuul met deze rijke icoesaëdersymmetrie werd pas in 1985 experimenteel gevonden door Kroto, Heath, O'Brien, Curl, Smalley. Voor dit werk hebben Curl, Kroto en Smalley in 1996 de Nobelprijs voor chemie ontvangen. De bovenstaande wiskundige conclusies voor het vibratiespectrum van  $C_{60}$  zijn alle experimenteel geverifieerd.

## Opgaven

- 7.1. Bewijs dat ammoniak  $NH_3$ , waarvan de atomen in evenwichtsstand een regelmatige 3-zijdige piramide vormen met het stikstofatoom aan de top, 4 dezelfde frequenties heeft in het infraroodspectrum en het Ramanspectrum.
- 7.2. Methaan  $CH_4$  heeft 4 waterstofatomen op de hoekpunten van een tetraëder en 1 koolstofatoom in het zwaartepunt. Bepaal het aantal frequenties in het infraroodspectrum en het Ramanspectrum van  $CH_4$ .
- 7.3. Bewijs dat  $\dim R = 3$  als  $rg\{q_1, \dots, q_n\} \geq 2$  en  $\dim(R + T) = 6$  als  $q_1, \dots, q_n$  niet op één lijn liggen.

7.4 Heeft een molecuul  $M$  centrale symmetrie (d.w.z. met het zwaartepunt als oorsprong zit  $s(x) = -x$  voor  $x \in \mathbb{R}^3$  in de symmetriegroep van  $M$ ) dan zijn het infraroodspectrum en het Ramanspectrum disjunct (als we veronderstellen dat er geen toevallige ontaarding is). Waarom?

7.5 Met de notatie van Voorbeeld 7.6 definiëren we het karakter  $\psi$  op  $I_h$  door  $\psi = \sum_1^5 \chi_{j,+} + \sum_1^5 \chi_{j,-}$ .

1. Bereken  $\psi(e)$  en  $\psi(as)$ .
2. Bewijs dat  $(X|\psi) = 48$ .
3. Bewijs dat het volledige vibratiespectrum van  $C_{60}$  46 frequenties heeft.

## Index

abels	3
algemene lineaire groep	3
alternerende groep	12
associativiteit	3
buckminsterfullerene	34
buckyball	34
centrale inversie	28
centrum	11
commuteren	3
commutatief	3
conjugatieklassen	8
cyclisch	4
cyclische ondergroep	4
cykel	8
cykeltype	9
deelrepresentatie	16
diëdergroep	5
disjunct	9
draaiing	15
duale representatie	18
eenheidselement	3
equivalente representaties	16
equivalentierelatie	7
factorruimte	7
factorgroep	11
geconjugerd	8
groep	3
homomorfisme	12
icosaëdergroep	29
index	7
infraroodspectrum	33
intertwiner	16
invariante lineaire deelruimte	16
inverse	3
irreducibel	16
isomorf	12
isomorfisme	12

karakter	21
klassefunctie	24
kring	8
kringstructuur	9
linkernevenklassen	7
multipliciteit	22
natuurlijke ontanding	33
normaaldeler	11
octaëdergroep	28
ondergroep	4
optelgroep van	3
orde	3
orde van een element	4
orthogonale groep	5
orthogonale representatie	18
partitie	9
permutatiematrix	12
product	3
productregel	3
quaterniongroep	10
Ramanspectrum	33
rechternevenklassen	8
reducibel	16
reguliere representatie	23
relatie	7
representant	7
representatie	16
rotatiedeelruimte	31
selectieregel	33
semidirect product	13
speciale lineaire groep	5
speciale orthogonale groep	5
speciale unitaire groep	5
spiegel	15
spiegeling	15
spiegelingsrepresentatie	19
standaardrepresentatie	16
symmetrische groep	4

tekenhomomorfisme	13
tekenrepresentatie	27
tensorproduct	18
tetraëder	14
tetraëdergroep	14
toevallige ontaarding	33
triviale representatie	16
translatiedeelruimte	31
transposities	9
uitwendig product	25
unitaire groep	5
unitaire representatie	18
vermenigvuldiging	3
vermenigvuldigingsgroep	3
verwisselingen	9
vibratiedeelruimte	33
vibratiespectrum	33
viergroep van Klein	4
voortbrenger	4
zelfduale representatie	18