

Московский государственный университет  
имени М. В. Ломоносова

---

Механико-математический факультет

На правах рукописи

УДК 511.36

*ЗУДИЛИН Вадим Валентинович*

**Об оценках меры линейной независимости  
значений некоторых аналитических функций**

Специальность 01.01.06 – математическая логика,  
алгебра и теория чисел

**ДИССЕРТАЦИЯ**

на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук

Научный руководитель: доктор физико-математических наук,  
профессор *НЕСТЕРЕНКО Юрий Валентинович*

Москва

1995

## Содержание

<b>Введение</b> .....	3
<b>Глава I. Мера иррациональности значений E-функций</b> .....	26
§1. Конструкция рациональных приближений к числу $f_l^*(\alpha)$ .....	26
§2. Алгебраическая природа переходной матрицы.	35
§3. Доказательство теоремы 1.....	50
§4. Доказательство теоремы 2 и следствий из нее .	63
<b>Глава II. Мера иррациональности значений G-функций</b> .....	72
§1. Градуированные приближения Паде.....	72
§2. Переход к числовым линейным формам.....	87
§3. Рациональные приближения обобщенных поли- логарифмов.....	96
<b>Литература</b> .....	105

## Введение

Одним из направлений теории трансцендентных чисел является исследование поведения величины

$$|h_0 + h_1\xi_1 + \cdots + h_m\xi_m|, \quad h_j \in \mathbb{Z}, \quad j = 0, 1, \dots, m, \quad (0.1)$$

для заданных действительных  $\xi_1, \dots, \xi_m$ ,  $m \geq 1$ , и ее оценка снизу в зависимости от

$$\max_{0 \leq j \leq m} \{|h_j|\}.$$

Как следует из теоремы Дирихле [20, §2 гл.1], для любого действительного  $H \geq 1$  существуют целые числа  $h_0, h_1, \dots, h_m$  такие, что

$$|h_0 + h_1\xi_1 + \cdots + h_m\xi_m| < H^{-m}, \quad 0 < \max_{1 \leq j \leq m} \{|h_j|\} \leq H.$$

Тем самым, теорема Дирихле отвечает на вопрос, сколь малым может быть величина (0.1), в общем случае, не принимая во внимание конкретную структуру чисел  $\xi_1, \dots, \xi_m$ . Из метрических соображений (см. теорему 12 [16, §5 гл. I]) следует, что при любом  $\varepsilon > 0$  для почти всех (в смысле меры Лебега) точек  $\bar{\xi} = (\xi_1, \dots, \xi_m) \in \mathbb{R}^m$  существует постоянная  $C = C(\bar{\xi}, \varepsilon) > 0$  такая, что для произвольных целых  $h_0, h_1, \dots, h_m$ , не равных нулю одновременно, справедливо неравенство

$$|h_0 + h_1\xi_1 + \cdots + h_m\xi_m| > CH^{-m}(\log H)^{-1-\varepsilon}, \quad (0.2)$$

$$H = \max \left\{ e, \max_{1 \leq j \leq m} \{|h_j|\} \right\}.$$

Методы теории трансцендентных чисел позволяют получать оценки снизу величины (0.1), близкие по порядку к оценкам (0.2), при специальном выборе  $\bar{\xi}$ .

В качестве чисел  $\xi_1, \dots, \xi_m$  можно рассматривать значения в рациональной точке  $\alpha \neq 0$  аналитических функций

$$f_j(z) = \sum_{\nu=0}^{\infty} f_{j,\nu} z^\nu, \quad f_{j,\nu} \in \mathbb{Q}, \quad j = 1, \dots, m, \quad \nu \in \mathbb{Z}^+ = \{0, 1, 2, \dots\}. \quad (0.3)$$

При получении оценок снизу величины (0.1) возникает вопрос о линейной независимости чисел  $1, f_1(\alpha), \dots, f_m(\alpha)$  над  $\mathbb{Q}$ . В случае, когда функции (0.3) линейно зависимы с единицей над  $\mathbb{C}(z)$ , как легко показать (см. лемму 2 [20, § 2 гл. 3]), существует уравнение вида

$$P_0(z) + \sum_{j=1}^m P_j(z) f_j(z) \equiv 0, \quad P_j \in \mathbb{Q}[z], \quad j = 0, 1, \dots, m,$$

связывающее функции  $f_1(z), \dots, f_m(z)$ . При этом можно считать, что многочлены  $P_0(z), P_1(z), \dots, P_m(z)$  в совокупности взаимно просты и, следовательно, хотя бы одно из чисел  $P_1(\alpha), \dots, P_m(\alpha)$  отлично от нуля. Но это означает, что числа  $1, f_1(\alpha), \dots, f_m(\alpha)$  линейно зависимы над  $\mathbb{Q}$ . Таким образом, *необходимым условием линейной независимости чисел  $1, f_1(\alpha), \dots, f_m(\alpha)$  над  $\mathbb{Q}$  является линейная независимость функций  $1, f_1(z), \dots, f_m(z)$  над полем  $\mathbb{C}(z)$ .*

В работе К. Л. Зигеля [26] был предложен метод исследования арифметических свойств значений некоторых аналитических функций  $f_1(z), \dots, f_m(z)$ , удовлетворяющих системе линейных дифференциальных уравнений, в алгебраической точке  $\alpha$ . Оформив свой метод в виде общей теоремы, К. Л. Зигель [27] указал некоторые достаточные условия, которым должны удовлетворять такие функции для того, чтобы числа

$1, f_1(\alpha), \dots, f_m(\alpha)$  были однородно алгебраически и, в частности, линейно независимы над  $\mathbb{Q}$ . Правда, эта теорема относилась только к значениям E-функций, а развитие метода применительно к классу G-функций так и осталось на уровне замечания о его возможности в статье [26].

Метод Зигеля был существенно обобщен в работах А.Б. Шидловского, который доказал критерий алгебраической независимости значений E-функций. Подробную историю этого вопроса можно найти в его монографии [20]. Сразу отметим, что приводимые ниже результаты затрагивают только *линейную* независимость над  $\mathbb{Q}$  значений E- и G-функций, имеющих *рациональные* коэффициенты рядов Тейлора ( $\mathbb{Q}$ E-функций в смысле [20] и  $\mathbb{Q}$ G-функций в духе [20]).

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Функция

$$f(z) = \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{f_{\nu}}{\nu!} z^{\nu} \quad (0.4)$$

называется E-*функцией*, если выполнены следующие условия:

- 1)  $f_{\nu} \in \mathbb{Q}$  для  $\nu \in \mathbb{Z}^+$ ;
- 2) для некоторой положительной константы  $C$  справедливо неравенство  $|f_{\nu}| < C^{\nu+1}$  при  $\nu \in \mathbb{Z}^+$ ;
- 3) существует последовательность  $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{N} = \mathbb{Z}^+ \setminus \{0\}$  такая, что  $\varphi_n f_{\nu} \in \mathbb{Z}$ ,  $\nu = 0, 1, \dots, n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , и  $\varphi_n < C^n$  при  $n \in \mathbb{N}$ .

Данное определение E-функции было введено С. Ленгом [25] для функции с алгебраическими коэффициентами ряда Тейлора и несколько отличается от классического определения Зигеля. Однако, все известные E-функции (в смысле Зигеля) с рациональными коэффициентами рядов Тейлора, являющиеся решениями линейных дифференциальных уравнений, удовлетворяют определению 1. В частности, это относится ко всем гипергеометрическим функциям с рациональными параметрами (см. [20, § 1 гл. 5]).

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Функция

$$f(z) = \sum_{\nu=0}^{\infty} f_{\nu} z^{\nu}$$

называется *G-функцией*, если для нее выполнены условия 1)–3) определения 1.

Заметим, что рассматриваемые в методе Зигеля–Шидловского аналитические функции  $f_1(z), \dots, f_m(z)$  должны удовлетворять системе линейных дифференциальных уравнений

$$\frac{d}{dz} y_l = Q_{l0} + \sum_{j=1}^m Q_{lj} y_j, \quad l = 1, \dots, m; \quad (0.5)$$

$$Q_{lj} = Q_{lj}(z) \in \mathbb{C}(z), \quad l = 1, \dots, m, \quad j = 0, \dots, m,$$

первого порядка. Если известно, что эти функции вместе с единицей линейно независимы над  $\mathbb{C}(z)$ , то, как вытекает из леммы 3 [20, §2 гл.3], все  $Q_{lj}(z) \in \mathbb{Q}(z)$  и можно выбрать многочлен  $T(z) \in \mathbb{Z}[z]$  так, что

$$T(z)Q_{lj}(z) \in \mathbb{Z}[z], \quad l = 1, \dots, m, \quad j = 0, \dots, m. \quad (0.6)$$

В 1955г. А.Б. Шидловский доказал, что условие линейной независимости *E-функций*  $f_1(z), \dots, f_m(z)$ , удовлетворяющих системе линейных дифференциальных уравнений (0.5), с единицей над  $\mathbb{C}(z)$  является не только необходимым, но и достаточным условием линейной независимости чисел  $1, f_1(\alpha), \dots, f_m(\alpha)$  над  $\mathbb{Q}$  для рациональной точки  $\alpha$ , отличной от нуля и полюсов коэффициентов системы (0.5) (иными словами, для точки  $\alpha \in \mathbb{Q}$  такой, что  $\alpha T(\alpha) \neq 0$ ).

Тем самым, применение метода Зигеля к линейной независимости значений  $E$ -функций с рациональными коэффициентами было доведено до его естественных границ.

Как и большинство методов теории трансцендентных чисел, метод Зигеля–Шидловского позволил получить не только качественные, но и количественные характеристики арифметических свойств значений заданных функций в точке  $\alpha$ . Сам К. Л. Зигель в статье [26] указывал (без доказательства), что для значений функции Бесселя

$$J_0(z) = \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{(-1)^\nu}{(\nu!)^2} \left(\frac{z}{2}\right)^{2\nu}$$

и ее производной в рациональной точке  $\alpha \neq 0$  справедливо неравенство

$$|h_0 + h_1 J_0(\alpha) + h_2 J_0'(\alpha)| > C H^{-2-\delta}, \quad \delta > 0,$$

$$h_j \in \mathbb{Z}, \quad H = \max_{0 \leq j \leq 2} \{|h_j|\} > 0, \quad C = C(\alpha, \delta) > 0.$$

Развитие метода в работах А. Б. Шидловского позволило в 1967 г. установить следующий общий результат [17]:

*Пусть совокупность  $E$ -функций  $f_1(z), \dots, f_m(z)$ ,  $m \geq 1$ , линейно независима над  $\mathbb{C}(z)$  с единицей и составляет решение системы линейных дифференциальных уравнений (0.5), а  $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$  – произвольная неособая точка этой системы. Тогда для любого  $\delta > 0$  существует постоянная  $C = C(f_1, \dots, f_m; \alpha, \delta) > 0$  такая, что*

$$|h_0 + h_1 f_1(\alpha) + \dots + h_m f_m(\alpha)| > C H^{-m-\delta},$$

$$h_j \in \mathbb{Z}, \quad H = \max_{0 \leq j \leq m} \{|h_j|\} > 0.$$

В этом же году в заметке [18] были анонсированы, а в 1979г. в статье [19] опубликованы доказательства оценок, уточняющих остаточный член в показателе неравенства, а именно, что в условиях сформулированной теоремы *существует постоянная*  $\gamma = \gamma(f_1, \dots, f_m; \alpha) > 0$  *такая, что для всех*  $H \geq H_*(f_1, \dots, f_m; \alpha)$  *выполнено*

$$|h_0 + h_1 f_1(\alpha) + \dots + h_m f_m(\alpha)| > H^{-m-\gamma(\log \log H)^{-1/2}}. \quad (0.7)$$

Из (0.7) вытекает оценка для рациональных приближений значений любой из участвующих E-функций:

$$\left| f_l(\alpha) - \frac{p}{q} \right| > |q|^{-m-1-\gamma(\log \log |q|)^{-1/2}}, \quad l = 1, \dots, m, \quad p, q \in \mathbb{Z}, \quad (0.8)$$

$$|q| \geq q_*(f_1, \dots, f_m; \alpha), \quad \gamma = \gamma(f_1, \dots, f_m; \alpha).$$

В 1984г. Г.В. Чудновский в статье [23] предложил оригинальную конструкцию, позволяющую получать оценки снизу линейных форм от значений E-функций, каждая из которых удовлетворяет своему линейному однородному дифференциальному уравнению произвольного порядка. При этом на совокупность этих уравнений накладывалось очень жесткое ограничительное условие, схожее с условием Зигеля [27]. Кроме этого, Чудновскому не удалось корректно осуществить переход от линейных приближающих функциональных форм, названных им *градуированными приближениями Паде*, к линейным числовым формам. В целом, метод Чудновского являлся непосредственным развитием метода Зигеля–Шидловского.

В первой главе настоящей диссертации с помощью некоторого усовершенствования конструкции Чудновского доказывается усиление оценки (0.8), близкое по порядку к неравенствам (0.2) при  $m = 1$ . Этот

результат формулируется в виде двух отдельных теорем по следующей причине: в случае  $m = 2$  условие, накладываемое на функции  $f_1(z), \dots, f_m(z)$ , является более слабым, чем в случае произвольного  $m \geq 2$ , что дает возможность указать более сильные следствия. Заметим только, что это условие в обеих теоремах существенно слабее соответствующего условия работы [23]. Случай  $m = 1$  полностью исчерпывается результатом А. Б. Шидловского (0.8).

**ТЕОРЕМА 1.** Пусть алгебраически независимые над  $\mathbb{C}(z)$  E-функции  $f_1(z), \dots, f_m(z)$ ,  $m \geq 2$ , составляют решение системы (0.5). Пусть, кроме того,  $\alpha \in \mathbb{Q}$ ,  $\alpha T(\alpha) \neq 0$ . Тогда существует постоянная  $\gamma = \gamma(f_1, \dots, f_m; \alpha) > 0$  такая, что для всех  $q \in \mathbb{Z}$ ,  $|q| \geq q_*(f_1, \dots, f_m; \alpha)$ , справедливы неравенства

$$\left| f_l(\alpha) - \frac{p}{q} \right| > |q|^{-2-\gamma(\log \log |q|)^{-1/(m+1)}}, \quad l = 1, \dots, m,$$

каково бы ни было целое  $p$ .

**СЛЕДСТВИЕ 1.** Пусть E-функция  $f(z)$  удовлетворяет линейному дифференциальному уравнению

$$A_m y^{(m)} + \dots + A_1 y' + A_0 y = B, \quad m \geq 2,$$

$$A_j = A_j(z) \in \mathbb{C}[z], \quad j = 0, 1, \dots, m, \quad B = B(z) \in \mathbb{C}[z],$$

порядка  $m$  и алгебраически независима над  $\mathbb{C}(z)$  со своими производными  $f'(z), \dots, f^{(m-1)}(z)$ ; рациональная точка  $\alpha$  такова, что  $\alpha A_m(\alpha) \neq 0$ . Тогда существует постоянная  $\gamma = \gamma(f; \alpha) > 0$  такая, что для всех  $q \in \mathbb{Z}$ ,  $|q| \geq q_*(f; \alpha)$ , справедливо неравенство

$$\left| f(\alpha) - \frac{p}{q} \right| > |q|^{-2-\gamma(\log \log |q|)^{-1/(m+1)}},$$

каково бы ни было целое  $p$ .

Доказательство этого следствия вытекает из того факта, что совокупность  $m$  E-функций  $f_l(z) = f^{(l-1)}(z)$ ,  $l = 1, \dots, m$ , составляет решение системы линейных дифференциальных уравнений первого порядка. Это дает возможность применить к ней утверждение теоремы 1, из которого и следует требуемое неравенство.

**СЛЕДСТВИЕ 2.** Пусть  $t, l$  – неотрицательные целые числа,  $t$  нечетно,  $t+l > 1$  и параметры  $\lambda_1, \dots, \lambda_{t+l}; \beta_1, \dots, \beta_l \in \mathbb{Q} \setminus \{-1, -2, \dots\}$  функции

$$f(z) = \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{(\beta_1)_{\nu} \cdots (\beta_l)_{\nu}}{(\lambda_1 + 1)_{\nu} \cdots (\lambda_{t+l} + 1)_{\nu}} \left(\frac{z}{t}\right)^{t\nu},$$

где

$$(\beta)_0 = 1, \quad (\beta)_{\nu} = \beta(\beta + 1) \cdots (\beta + \nu - 1), \quad \nu = 1, 2, \dots,$$

удовлетворяют следующим условиям:

- 1)  $\lambda_i - \beta_j \notin \mathbb{Z}$  для всех  $i = 1, \dots, t+l$ ,  $j = 1, \dots, l$ ;
- 2) не существует общего делителя  $d > 1$  чисел  $t, l$  такого, что

$$(\lambda_1 + 1/d, \dots, \lambda_{t+l} + 1/d) \sim (\lambda_1, \dots, \lambda_{t+l}),$$

$$(\beta_1 + 1/d, \dots, \beta_l + 1/d) \sim (\beta_1, \dots, \beta_l)$$

(запись  $(\beta'_1, \dots, \beta'_m) \sim (\beta_1, \dots, \beta_m)$  означает, что для некоторой перестановки  $\sigma : \{1, \dots, m\} \rightarrow \{1, \dots, m\}$ , отличной от тождественной, при всех  $j = 1, \dots, m$  выполнено  $\beta'_j - \beta_{\sigma(j)} \in \mathbb{Z}$ ). Тогда для любого  $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$  существует постоянная  $\gamma = \gamma(\lambda_1, \dots, \lambda_{t+l};$

$\beta_1, \dots, \beta_l; \alpha) > 0$  такая, что для всех  $q \in \mathbb{Z}$ ,  $|q| \geq q_*(\lambda_1, \dots, \lambda_{t+l}; \beta_1, \dots, \beta_l; \alpha)$ , справедливо неравенство

$$\left| f(\alpha) - \frac{p}{q} \right| > |q|^{-2-\gamma(\log \log |q|)^{-1/(t+l+1)}},$$

каково бы ни было целое  $p$ .

Действительно, обобщенная гипергеометрическая функция  $f(z)$  удовлетворяет дифференциальному уравнению

$$\begin{aligned} \left( \left( z \frac{d}{dz} + t\lambda_1 \right) \cdots \left( z \frac{d}{dz} + t\lambda_{t+l} \right) - z^t \left( z \frac{d}{dz} + t\beta_1 \right) \cdots \left( z \frac{d}{dz} + t\beta_l \right) \right) y \\ = t^{t+l} \lambda_1 \cdots \lambda_{t+l}, \end{aligned}$$

а алгебраическая независимость функций  $f(z), f'(z), \dots, f^{(t+l-1)}(z)$  вытекает из теоремы 1.1 работы В. Х. Салихова [15].

Если воспользоваться теоремой 1.2 [15], то можно получить аналогичный результат и в случае четного  $t$ .

В случае  $l = 0$  условие следствия 2 можно упростить.

**СЛЕДСТВИЕ 3.** Пусть целое  $t > 1$  нечетно или  $t = 2$  и параметры  $\lambda_1, \dots, \lambda_t \in \mathbb{Q} \setminus \{-1, -2, \dots\}$  функции

$$f(z) = \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{1}{(\lambda_1 + 1)_{\nu} \cdots (\lambda_t + 1)_{\nu}} \left( \frac{z}{t} \right)^{t\nu}$$

не удовлетворяют следующему условию: числа  $t\lambda_1, \dots, t\lambda_t$  являются целыми и образуют полную систему вычетов по mod  $t$ .

Тогда для любого  $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$  существует постоянная  $\gamma = \gamma(\lambda_1, \dots, \lambda_t; \alpha) > 0$  такая, что для всех  $q \in \mathbb{Z}$ ,  $|q| \geq q_*(\lambda_1, \dots, \lambda_t; \alpha)$ , справедливо неравенство

$$\left| f(\alpha) - \frac{p}{q} \right| > |q|^{-2-\gamma(\log \log |q|)^{-1/(t+1)}},$$

каково бы ни было целое  $p$ .

Доказательство алгебраической независимости функций  $f(z)$ ,  $f'(z)$ ,  $\dots$ ,  $f^{(t-1)}(z)$  в случае нечетного  $t$  получено в работе В. Х. Салихова [14] при доказательстве теоремы 2; при  $t = 2$  этот результат вытекает из теоремы 4 статьи В. А. Олейникова [13].

**ТЕОРЕМА 2.** Пусть  $E$ -функции  $f_1(z)$ ,  $f_2(z)$  составляют решение системы

$$\frac{d}{dz} y_l = Q_{l0} + Q_{l1} y_1 + Q_{l2} y_2, \quad l = 1, 2; \quad (0.9)$$

$$Q_{lj} = Q_{lj}(z) \in \mathbb{C}(z), \quad l = 1, 2, \quad j = 0, 1, 2,$$

и линейно независимы над  $\mathbb{C}(z)$  с единицей;  $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$  – особая точка системы (0.9). Тогда существует постоянная  $\gamma = \gamma(f_1, f_2; \alpha) > 0$  такая, что для всех  $q \in \mathbb{Z}$ ,  $|q| \geq q_*(f_1, f_2; \alpha)$ , справедливы неравенства

$$\left| f_l(\alpha) - \frac{p}{q} \right| > |q|^{-2-\gamma(\log \log |q|)^{-1/3}}, \quad l = 1, 2,$$

каково бы ни было целое  $p$ .

В случае  $t = 2$  справедлив аналог следствия 1 из теоремы 1, в котором полностью отсутствует условие независимости функции  $f(z)$  и ее производной.

СЛЕДСТВИЕ 1. Пусть  $E$ -функция  $f(z)$  является решением дифференциального уравнения

$$A_2(z)y'' + A_1(z)y' + A_0(z)y = B(z), \quad A_2, A_1, A_0, B \in \mathbb{C}[z],$$

и  $\alpha \in \mathbb{Q}$ ,  $\alpha A_2(\alpha) \neq 0$ . Тогда существует постоянная  $\gamma = \gamma(f; \alpha) > 0$  такая, что для любых целых  $p, q$ ,  $|q| \geq q_*(f; \alpha)$ , либо  $f(\alpha) = p/q$  либо

$$\left| f(\alpha) - \frac{p}{q} \right| > |q|^{-2-\gamma(\log \log |q|)^{-1/3}}.$$

В двух следующих утверждениях полностью решается вопрос об оценке снизу рациональных приближений значений гипергеометрических функций, удовлетворяющих линейным дифференциальным уравнениям второго порядка.

СЛЕДСТВИЕ 2. Пусть

$$K_{\lambda, \mu}(z) = \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{(-1)^\nu}{(\lambda+1)_\nu (\mu+1)_\nu} \left(\frac{z}{2}\right)^{2\nu}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{Q} \setminus \{-1, -2, \dots\},$$

и  $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ . Тогда существует постоянная  $\gamma = \gamma(\lambda, \mu; \alpha) > 0$  такая, что для всех  $q \in \mathbb{Z}$ ,  $|q| \geq q_*(\lambda, \mu; \alpha)$ , справедливо неравенство

$$\left| K_{\lambda, \mu}(\alpha) - \frac{p}{q} \right| > |q|^{-2-\gamma(\log \log |q|)^{-1/3}},$$

каково бы ни было целое  $p$ .

СЛЕДСТВИЕ 3. Пусть

$$A_{\lambda, \mu, \beta}(z) = \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{(\beta+1)_{\nu}}{(\lambda+1)_{\nu}(\mu+1)_{\nu}} z^{\nu}, \quad \lambda, \mu, \beta \in \mathbb{Q} \setminus \{-1, -2, \dots\},$$

$$\beta - \lambda, \beta - \mu \notin \mathbb{N},$$

и  $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ . Тогда существует постоянная  $\gamma = \gamma(\lambda, \mu, \beta; \alpha) > 0$  такая, что для всех  $q \in \mathbb{Z}$ ,  $|q| \geq q_*(\lambda, \mu, \beta; \alpha)$ , справедливо неравенство

$$\left| A_{\lambda, \mu, \beta}(\alpha) - \frac{p}{q} \right| > |q|^{-2 - \gamma(\log \log |q|)^{-1/3}},$$

каково бы ни было целое  $p$ .

В первых работах, связанных с применением метода Зигеля–Шидловского к классу G-функций (см. [11], [12]), были получены оценки линейных форм и многочленов от значений этих функций в алгебраических точках. При этом, однако, величина этих точек зависела от высоты рассматриваемых форм. В 1974 г., воспользовавшись указанием Зигеля в работе [26] о сокращении коэффициентов линейных приближающих форм (“сокращении факториалов”), А. И. Галочкин [1] получил для одного подкласса G-функций оценки модулей многочленов от значений в точках, не зависящих от высоты многочленов. Там же была сформулирована теорема об эффективной оценке линейной формы от G-функций из одного класса, доказательство которой опубликовано в работе [2]. В 1985 г. Д. В. Чудновский и Г. В. Чудновский [22] доказали, что условие “сокращения факториалов”, сформулированное в работе [1], выполняется для однородных систем линейных дифференциальных уравнений, которым удовлетворяют G-функции. Несложное усовершенствование схемы Чудновских позволило в работе [21] получить этот результат

и для неоднородных систем. Таким образом, применение метода Зигеля–Шидловского к классу G-функций было расширено до естественных границ. Отметим, что использование приближений Паде второго рода дает возможность получать оценки линейных форм от значений G-функций без условия “сокращения факториалов” (см. [22]).

Отметим, прежде всего, что для получения оценок снизу линейных форм от значений G-функций требуется более тщательный учет постоянных, чем в аналогичной задаче для E-функций. Именно поэтому, необходимо следующее уточняющее определение для элементов  $f_1(z), \dots, f_m(z)$  класса G-функций.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.** Будем говорить, что *совокупность функций (0.3) принадлежит классу  $G(C, \Phi)$* , где  $C \geq 1$  и  $\Phi \geq 1$ , если для любого  $\varepsilon > 0$  существует постоянная  $\gamma$ , зависящая только от  $\varepsilon$  и функций  $f_1(z), \dots, f_m(z)$ , такая, что:

- 1)  $|f_{j,\nu}| < \gamma C^{(1+\varepsilon)\nu}$ ,  $j = 1, \dots, m$ ,  $\nu \in \mathbb{Z}^+$ ;
- 2) существуют натуральные числа  $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$  такие, что все числа  $\varphi_n f_{j,\nu} \in \mathbb{Z}$ ,  $j = 1, \dots, m$ ,  $\nu = 0, 1, \dots, n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , и  $\varphi_n < \gamma \Phi^{(1+\varepsilon)n}$  при  $n \in \mathbb{N}$ .

Для совокупности G-функций  $f_1(z), \dots, f_m(z)$ , линейно независимой над  $\mathbb{C}(z)$  с единицей, наряду с системой (0.5) будем рассматривать сопряженную к ее однородной части систему линейных однородных дифференциальных уравнений

$$\frac{d}{dz} a_j = \sum_{l=1}^m S_{jl} a_l, \quad j = 1, \dots, m; \quad (0.10)$$

$$S_{jl}(z) = -Q_{lj}(z) \in \mathbb{Q}(z), \quad j, l = 1, \dots, m.$$

Из (0.10) следует, что для производных порядка  $n$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , имеют

МЕСТО СООТНОШЕНИЯ

$$\frac{d^n}{dz^n} a_j = \sum_{l=1}^m S_{jl}^{[n]} a_l, \quad j = 1, \dots, m, \quad (0.11)$$

где все  $S_{jl}^{[n]}(z) \in \mathbb{Q}(z)$ ,  $j, l = 1, \dots, m$ . Обозначим через  $T_*(z) \in \mathbb{Z}[z]$  наименьший общий знаменатель функций  $S_{jl} = -Q_{lj}$ ,  $j, l = 1, \dots, m$ , т.е. такой многочлен, что

$$T_*(z) S_{lj}(z) \in \mathbb{Z}[z], \quad j, l = 1, \dots, m.$$

Согласно выбору (0.6) многочлена  $T(z) \in \mathbb{Z}[z]$  получаем, что

$$T(z)/T_*(z) \in \mathbb{Z}[z]. \quad (0.12)$$

Несложные выкладки показывают справедливость следующих рекуррентных соотношений для коэффициентов систем (0.11):

$$S_{jl}^{[n+1]}(z) = \frac{d}{dz} S_{jl}^{[n]}(z) + \sum_{i=1}^m S_{ji}^{[n]}(z) \cdot S_{il}(z),$$

$$j, l = 1, \dots, m, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (0.13)$$

и значит,

$$T_*^{n+1}(z) S_{jl}^{[n+1]}(z) = T_*(z) \frac{d}{dz} (T_*^n(z) S_{jl}^{[n]}(z))$$

$$+ \sum_{i=1}^m T_*^n(z) S_{ji}^{[n]}(z) \cdot T_*(z) S_{il}(z) - n T_*'(z) T_*^n(z) S_{jl}^{[n]}(z),$$

$$j, l = 1, \dots, m, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (0.14)$$

Отсюда, в частности, следует, что  $T_*^n(z) S_{jl}^{[n]}(z) \in \mathbb{Q}[z]$ ,  $j, l = 1, \dots, m$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4. Будем говорить, что *система линейных дифференциальных уравнений (0.10) принадлежит классу  $G(\Psi)$*  (удовлетворяет условию “сокращения факториалов” с постоянной  $\Psi$ ), где  $\Psi \geq 1$ , если существуют натуральные числа  $\{\psi_n\}_{n=1}^{\infty}$  такие, что все функции

$$\frac{\psi_n}{i!} T_*^i(z) S_{jl}^{[i]} \in \mathbb{Z}[z], \quad j, l = 1, \dots, m, \quad i = 1, \dots, n, \quad n \in \mathbb{N},$$

и для любого  $\varepsilon > 0$  существует постоянная  $\gamma'$ , зависящая только от  $\varepsilon$  и системы (0.10), такая, что  $\psi_n < \gamma' \Psi^{(1+\varepsilon)n}$  при  $n \in \mathbb{N}$ .

Теперь сформулируем основные результаты второй главы – теорему 3 и следствия из нее. В отличие от случая E-функций, случай  $m = 2$  представлен в теореме 3 отдельным пунктом. Через  $H(\cdot)$  мы обозначаем высоту многочлена из  $\mathbb{C}[z]$  (максимум модулей его коэффициентов).

ТЕОРЕМА 3. Пусть совокупность функций  $f_1(z), \dots, f_m(z)$ ,  $m \geq 2$ , из класса  $G(C, \Phi)$

- а) линейно независима над  $\mathbb{C}(z)$  с единицей в случае  $m = 2$ ;
- б) алгебраически независима над  $\mathbb{C}(z)$  в случае  $m > 2$ ,

и составляет решение системы линейных дифференциальных уравнений (0.5), для которой система (0.10) принадлежит классу  $G(\Psi)$ . Пусть, кроме того,  $\alpha = a/b$ , где  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $b \in \mathbb{N}$ , удовлетворяет условию  $\alpha T(\alpha) \neq 0$ ;  $\varepsilon < \frac{1}{m+t+1}$  – произвольная положительная постоянная. Положим  $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] - m + 1$ ,

$$t = \max \left\{ \deg T - 1, \max_{l,j} \{ \deg T Q_{lj} \} \right\},$$

$$H = \max \left\{ H(T), \max_{l,j} \{ H(T Q_{lj}) \} \right\},$$

$$C_0 = e^{\varepsilon(1-\log \varepsilon)} (2(t+1)^2 H \Psi)^{\varepsilon(1+\log N)} \Phi^{1+t\varepsilon} (C \Phi)^{\frac{1}{\varepsilon} \left(2 - \frac{m-1}{N+m-1}\right) \binom{N+m-2}{m-1}},$$

$$\eta_0 = \frac{(1+t\varepsilon) \log b + \log C_0}{(1 - (m+t+1)\varepsilon) \log b - \log C_0 - (2 - (m+1)\varepsilon) \log(C|a|)}.$$

Если для заданного  $\alpha$  выполнено условие  $\eta_0 > 0$ , иными словами, если

$$b^{1-(m+t+1)\varepsilon} > C_0 \cdot (C|a|)^{2-(m+1)\varepsilon}, \quad (0.15)$$

то числа  $f_l(\alpha)$ ,  $l = 1, \dots, m$ , иррациональны. Более того, для любого  $\eta > \eta_0$  и произвольных  $p \in \mathbb{Z}$ ,  $q \in \mathbb{N}$ ,  $q > q_*(f_1, \dots, f_m; \alpha, \varepsilon, \eta)$ , справедливы оценки

$$\left| f_l(\alpha) - \frac{p}{q} \right| > q^{-1-\eta}, \quad l = 1, \dots, m.$$

В предыдущих работах (см., например, [2], [22]) доказана иррациональность значений  $G$ -функций, удовлетворяющих системе (0.5), в рациональных точках  $\alpha = a/b$ , для которых выполнено условие типа

$$b > C'_0 |a|^{m+1+\delta}, \quad \delta > 0.$$

Поэтому неравенство (0.15) теоремы 3 расширяет класс известных иррациональных значений таких  $G$ -функций.

Следующее утверждение можно считать более “практичным” по сравнению с теоремой 3, поскольку в его формулировке полностью отсутствует условие “сокращения факториалов” и вспомогательный параметр  $N$ .

**СЛЕДСТВИЕ 1.** Пусть функция  $f(z) \in G(C, \Phi)$  является решением линейного дифференциального уравнения

$$A_m y^{(m)} + \dots + A_1 y' + A_0 y = B, \quad m \geq 2,$$

$$A_j = A_j(z) \in \mathbb{C}[z], \quad j = 0, 1, \dots, m, \quad B = B(z) \in \mathbb{C}[z],$$

порядка  $m$  и не удовлетворяет никакому

- а) линейному в случае  $m = 2$ ,
- б) алгебраическому в случае  $m > 2$

дифференциальному уравнению с коэффициентами из  $\mathbb{C}(z)$  меньшего порядка. Пусть, кроме того,  $\alpha = a/b$ , где  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $b \in \mathbb{N}$ , удовлетворяет условию  $\alpha A_m(\alpha) \neq 0$ ;  $\varepsilon < \frac{1}{m+t+1}$  – произвольная положительная постоянная. Обозначим через  $d \in \mathbb{N}$  наименьший общий знаменатель коэффициентов многочленов  $B, A_0, \dots, A_m \in \mathbb{Q}[z]$  и положим

$$t = \max \left\{ \deg A_m - 1, \max_{0 \leq j < m} \{ \deg A_j \}, \deg B \right\},$$

$$H = d \max \left\{ H(B), \max_{0 \leq j \leq m} \{ H(A_j) \} \right\},$$

$$\Psi = (C\Phi)^{6(m+1)^2(t+1)(1+\log m)},$$

$$C_0 = (2e(t+1)^2 H \Psi)^{\varepsilon(1-\log \varepsilon)} \Phi^{1+t\varepsilon} (C\Phi)^{\frac{2-(m-1)\varepsilon}{\varepsilon^m(m-1)!}},$$

$$\eta_0 = \frac{(1+t\varepsilon) \log b + \log C_0}{(1-(m+t+1)\varepsilon) \log b - \log C_0 - (2-(m+1)\varepsilon) \log(C|a|)}.$$

Если для заданного  $\alpha$  выполнено условие (0.15), то число  $f(\alpha)$  иррационально и для любого  $\eta > \eta_0$  и произвольных  $p \in \mathbb{Z}$ ,  $q \in \mathbb{N}$ ,  $q > q_*(f; \alpha, \varepsilon, \eta)$  справедливы оценки

$$\left| f(\alpha) - \frac{p}{q} \right| > q^{-1-\eta}.$$

Вывод этого утверждения из теоремы 3 проводится по следующей схеме. Функции  $f_l(z) = f^{(l-1)}(z)$ ,  $l = 1, \dots, m$ , удовлетворяют системе линейных дифференциальных уравнений

$$y'_l = y_{l+1}, \quad l = 1, \dots, m-1, \quad y'_m = \frac{B}{A_m} - \frac{A_0}{A_m} y_1 - \dots - \frac{A_{m-1}}{A_m} y_{m-1},$$

и принадлежат классу  $G(C, \Phi)$ . Как следует из теоремы [21, § 4 гл. VI] сокращение факториалов для системы (0.5) происходит с постоянной, не большей  $(C\Phi)^{6(m+1)^2(t+1)}$ , а согласно утверждению [21, § 5.5 гл. IV] для системы (0.10), сопряженной к (0.5), эту постоянную необходимо еще возвести в степень  $1 + \log m$ . Кроме того, для  $N = \lfloor \frac{1}{\varepsilon} \rfloor - m + 1 \geq 1$  справедливы следующие неравенства:

$$\begin{aligned} \log N < \log(N + m - 1) \leq -\log \varepsilon, \quad \frac{m - 1}{N + m - 1} \geq (m - 1)\varepsilon, \\ \binom{N + m - 2}{m - 1} < \frac{(N + m - 1)^{m-1}}{(m - 1)!} \leq \frac{1}{\varepsilon^{m-1}(m - 1)!}. \end{aligned} \quad (0.16)$$

Результат следствия получается теперь из основной теоремы прямой подстановкой.

Наконец, утверждение следствия 2, приводимого ниже, относится к значениям так называемых обобщенных полилогарифмических функций. Для его формулировки нам потребуются вспомогательные обозначения. Под  $\text{den } \lambda \in \mathbb{N}$  будем понимать знаменатель несократимой дроби  $\lambda$ . Введем в рассмотрение следующие функции натурального аргумента:

$$\rho(b) = \frac{b}{\varphi(b)} \sum_{\substack{1 \leq i \leq b \\ (i, b) = 1}} \frac{1}{i}, \quad \chi(b) = \sum_{p|b} \frac{\log p}{p - 1}, \quad (0.17)$$

$$\varphi(b) = \sum_{\substack{1 \leq i \leq b \\ (i, b) = 1}} 1 \text{ — функция Эйлера, } b \in \mathbb{N}.$$

Так, например,  $\rho(1) = 1$ ,  $\chi(1) = 0$ ;  $\rho(2) = 2$ ,  $\chi(2) = \log 2$ ;  $\rho(3) = \frac{9}{4}$ ,  $\chi(3) = \frac{1}{2} \log 3$ ;  $\rho(4) = \frac{8}{3}$ ,  $\chi(4) = \log 2$  и т.д.

**СЛЕДСТВИЕ 2.** *Рассмотрим функцию*

$$f(z) = \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{z^{\nu}}{(\nu + \lambda)^m}, \quad m \geq 2, \quad \lambda \in \mathbb{Q} \setminus \{-1, -2, \dots\}.$$

Пусть  $\alpha = a/b \neq 0$ , где  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $b \in \mathbb{N}$ , и пусть  $\varepsilon < \frac{1}{m+2}$  – произвольная положительная постоянная. Положим  $\rho = \rho(\text{den } \lambda)$ ,  $\chi = \chi(\text{den } \lambda)$ ,  $H = \text{den } \lambda \cdot \max\{1, |\lambda|\}$ ,

$$C_0 = \exp\left\{(\log(8H) + \chi + m)\varepsilon(1 - \log \varepsilon) + m\rho\left(1 + \varepsilon + \frac{2-(m-1)\varepsilon}{\varepsilon^m(m-1)!}\right)\right\},$$

$$\eta_0 = \frac{(1 + \varepsilon) \log b + \log C_0}{(1 - (m + 2)\varepsilon) \log b - \log C_0 - (2 - (m + 1)\varepsilon) \log |a|}.$$

Если для заданного  $\alpha$  выполнено условие

$$b^{1-(m+2)\varepsilon} > C_0 \cdot |a|^{2-(m+1)\varepsilon},$$

то число  $f(\alpha)$  иррационально и для любого  $\eta > \eta_0$  и произвольных  $p \in \mathbb{Z}$ ,  $q \in \mathbb{N}$ ,  $q > q_*(\lambda, \alpha, \varepsilon, \eta)$  справедливы оценки

$$\left|f(\alpha) - \frac{p}{q}\right| > q^{-1-\eta}.$$

В частном случае, при  $\lambda = 0$ , имеем:

$$C_0 = \exp\left\{(m + \log 8)\varepsilon(1 - \log \varepsilon) + m\left(1 + \varepsilon + \frac{2-(m-1)\varepsilon}{\varepsilon^m(m-1)!}\right)\right\}.$$

Опишем теперь коротко метод настоящей диссертации для исследования арифметических свойств значений E- и G-функций, названный Г. В. Чудновским методом “градуированных приближений Паде”.

В конструкции Зигеля–Шидловского строится (с помощью принципа

Дирихле) одна линейная приближающая функциональная форма

$$R(z) = P_0(z) + \sum_{j=1}^m P_j(z) f_j(z), \quad P_j \in \mathbb{C}[z], \quad j = 0, 1, \dots, m,$$

а остальные формы (такого же вида) получаются из нее дифференцированием по  $z$  с последующим домножением на определенный выше многочлен  $T(z)$ . Именно в этом месте используется тот факт, что совокупность функций  $f_1(z), \dots, f_m(z)$  удовлетворяет системе линейных дифференциальных уравнений (0.5). Арифметические свойства коэффициентов-многочленов получающихся линейных функциональных форм, зависящие от свойств числовых коэффициентов в рядах Тейлора рассматриваемых функций, вместе с невырожденностью определителя, составленного из этих многочленов, позволяют перейти к линейным приближающим формам от чисел  $1, f_1(\alpha), \dots, f_m(\alpha)$ . В применении к  $G$ -функциям метод Зигеля–Шидловского позволяет получать арифметические результаты только в точках, достаточно малых по модулю. Это обстоятельство связано с тем, что в числовых линейных приближающих формах от значений  $G$ -функций, построенных с помощью этого метода, малость форм достигается не за счет множителя  $1/\nu!$  в общем члене ряда, как в случае  $E$ -функций, а за счет  $|\alpha|^\nu$ . Конструкции “градуированных приближений Паде” как потомку метода Зигеля–Шидловского не удастся преодолеть этот недостаток. Поэтому в результатах второй главы появляется условие (0.15) на число  $\alpha$ .

Параметрами описываемой ниже конструкции являются натуральные числа  $M, N$  и (достаточно малое) вещественное  $\varepsilon > 0$ . Обозначим через  $\bar{a} = (a_1, \dots, a_m)$  – набор вспомогательных переменных. В дальнейшем будут встречаться суммы, слагаемые которых нумеруются мультииндексами  $\bar{\kappa} = (\kappa_1, \dots, \kappa_m) \in \mathbb{Z}^m$ . При этом если в некоторой сумме по  $\bar{\kappa}$  встретится слагаемое хотя бы с одной компонентой  $\kappa_j < 0$ ,

то будем считать это слагаемое отсутствующим (равным нулю). Через  $\bar{e}_j$  обозначим мультииндекс, у которого на месте с номером  $j$  стоит единица, а на остальных местах – нули. Для экономии места в формулах будем писать:

$$\bar{a}^{\bar{\kappa}} = \prod_{j=1}^m a_j^{\kappa_j}; \quad |\bar{\kappa}| = \sum_{j=1}^m \kappa_j.$$

Введем, наконец, следующие множества мультииндексов:

$$\begin{aligned} \Omega &= \Omega(m, N) = \{ \bar{\kappa} : |\bar{\kappa}| \in \{N-1, N\} \}, \quad \Theta = \Theta(m, N) = \{ \bar{s} : |\bar{s}| = N \}; \\ \omega &= \text{Card } \Omega = \binom{N+m-2}{m-1} + \binom{N+m-1}{m-1}, \\ \theta &= \text{Card } \Theta = \binom{N+m-1}{m-1} \end{aligned}$$

(результаты о количествах элементов в этих множествах следуют, например, из леммы 7 [20, § 7 гл. 2]). Упорядочим элементы множеств  $\Omega$  и  $\Theta$  в лексикографическом порядке, т.е. будем говорить, что мультииндекс  $\bar{\kappa}$  меньше мультииндекса  $\bar{\kappa}'$  (запись  $\bar{\kappa} \prec \bar{\kappa}'$ ), если  $\kappa_1 = \kappa'_1$ ,  $\kappa_2 = \kappa'_2, \dots, \kappa_{j-1} = \kappa'_{j-1}$ , но  $\kappa_j < \kappa'_j$  для некоторого  $j$ ,  $1 \leq j \leq m$ . Под  $\delta_{\bar{s}', \bar{s}}$ ,  $\bar{s}', \bar{s} \in \Theta$ , будем понимать “обобщенный” символ Кронекера множества  $\Theta$ , а именно,

$$\delta_{\bar{s}', \bar{s}} = \begin{cases} 1 & \text{при } \bar{s}' = \bar{s}, \\ 0 & \text{иначе.} \end{cases}$$

Рассматриваются формы от переменных  $a_1, \dots, a_m$  с функциональными коэффициентами вида

$$R(z; \bar{a}) = \sum_{\bar{\kappa}: |\bar{\kappa}|=N} \bar{a}^{\bar{\kappa}} P_{\bar{\kappa}}(z) + \sum_{\bar{\kappa}: |\bar{\kappa}|=N-1} \bar{a}^{\bar{\kappa}} P_{\bar{\kappa}}(z) \sum_{j=1}^m a_j f_j(z),$$

$$P_{\bar{\kappa}}(z) \in \mathbb{Q}[z]. \quad (0.18)$$

Поскольку такие формы однородны и имеют степень  $N$ , их можно представить в виде

$$R(z; \bar{a}) = \sum_{\bar{s} \in \Theta} \bar{a}^{\bar{s}} R_{\bar{s}}(z). \quad (0.19)$$

Сравнивая коэффициенты при  $\bar{a}^{\bar{s}}$ ,  $\bar{s} \in \Theta$ , в (0.18) и (0.19), выразим элементы строки  $(R_{\bar{s}}(z))_{\bar{s} \in \Theta}$  через элементы строки  $(P_{\bar{\kappa}}(z))_{\bar{\kappa} \in \Omega}$ .

$$R_{\bar{s}}(z) = \sum_{\bar{\kappa}: |\bar{\kappa}|=N} P_{\bar{\kappa}}(z) \delta_{\bar{\kappa}, \bar{s}} + \sum_{\bar{\kappa}: |\bar{\kappa}|=N-1} P_{\bar{\kappa}}(z) \sum_{j=1}^m \delta_{\bar{\kappa} + \bar{e}_j, \bar{s}} f_j(z), \quad \bar{s} \in \Theta, \quad (0.20)$$

или

$$R_{\bar{s}}(z) = P_{\bar{s}}(z) + \sum_{j=1}^m P_{\bar{s} - \bar{e}_j}(z) f_j(z), \quad \bar{s} \in \Theta. \quad (0.21)$$

Также, как и в методе Зигеля–Шидловского, с помощью принципа Дирихле удастся построить совокупность линейных функциональных форм (0.21) с оценкой

$$\deg P_{\bar{\kappa}} < M, \quad \bar{\kappa} \in \Omega,$$

на степени входящих в них многочленов (и, кроме того, с некоторой оценкой их высот) такую, что

$$\text{ord}_{z=0} R_{\bar{s}}(z) \geq \left[ \frac{(\omega - \varepsilon)M}{\theta} \right] = \left[ \left( 2 - \frac{m-1}{N+m-1} - \frac{\varepsilon}{\theta} \right) M \right], \quad \bar{s} \in \Theta.$$

Теперь применение к формам вида (0.18) дифференциального оператора

$$D = \frac{\partial}{\partial z} - \sum_{j=1}^m \left( \sum_{l=1}^m Q_{lj}(z) a_l \right) \frac{\partial}{\partial a_j}, \quad (0.22)$$

связанного с системой дифференциальных уравнений (0.10), с последующим домножением на многочлен  $T(z)$  переводит их в формы того же вида с другими коэффициентами-многочленами  $P_{\bar{\kappa}}(z)$ ,  $\bar{\kappa} \in \Omega$ . Это обстоятельство связано со следующим простым свойством оператора  $D$ :

$$D \sum_{j=1}^m a_j f_j(z) = \sum_{l=1}^m a_l Q_{l0}(z). \quad (0.23)$$

Таким образом, по одной построенной форме вида (0.18) удается построить целый набор таких форм. Наиболее трудным моментом метода является доказательство невырожденности функционального определителя, составленного из коэффициентов-многочленов этих форм. Для его преодоления исследуются свойства матрицы перехода от строки многочленов  $(P_{\bar{\kappa}}(z))_{\bar{\kappa} \in \Omega}$  к строке линейных форм  $(R_{\bar{s}}(z))_{\bar{s} \in \Theta}$ , а также используется технический аппарат для оценки порядка нуля многочленов от  $z, f_1(z), \dots, f_m(z)$ , разработанный Ю. В. Нестеренко в [9], [10] и других работах. Заключительная часть доказательств теорем 1 и 3 проводится по двум различным схемам: традиционной схеме метода Зигеля–Шидловского (см., например, лемму 17 [20, § 11 гл. 3]) и использованию приближений Паде второго рода.

Отметим, что доказательство теорем 1–3 проводятся для фиксированного  $l = l^*$ ,  $1 \leq l^* \leq m$ .

Основные результаты этой диссертации опубликованы в работах [5], [6].

Автор выражает глубокую признательность Ю. В. Нестеренко за интересную тему и большое внимание, оказанное настоящей работе.

## ГЛАВА I

## Мера иррациональности значений E-функций

§ 1. Конструкция рациональных приближений к числу  $f_{l^*}(\alpha)$ 

Договоримся сразу представление функции  $f(z)$  в виде ряда (0.4) называть *нормальным разложением функции в степенной ряд* (или просто *нормальным разложением*), а числа  $\{f_\nu\}_{\nu=0}^\infty$  — *коэффициентами в нормальном разложении*. При этом в случае  $f(z) \in \mathbb{C}[z]$  будет считаться, что  $f_\nu = 0$  для  $\nu > \deg f$ .

Положим

$$N = [(\log M)^{1/(m+1)}], \quad \varepsilon = \frac{1}{3(N + m - 1)}, \quad (1.1)$$

при этом будем считать натуральный параметр  $M$  достаточно большим, т.е.  $M > M_*(f_1, \dots, f_m)$ . Буквы  $C$  с индексами будем использовать для обозначения положительных постоянных, зависящих от функций  $f_1(z), \dots, f_m(z)$  и числа  $\alpha$ .

**ЛЕММА 1.1.** *Для натурального  $M > M_*$  и выбранных согласно (1.1) числам  $N$  и  $\varepsilon$  существуют многочлены  $P_{\bar{k}}(z) \in \mathbb{Q}[z]$ ,  $\bar{k} \in \Omega$ , удовлетворяющие следующим условиям:*

- 1) *не все они тождественно равны нулю;*
- 2)  *$\deg P_{\bar{k}} < M$  для всех  $\bar{k} \in \Omega$ ;*
- 3) *коэффициенты в нормальном разложении этих многочленов являются целыми числами, ограниченными по модулю величиной  $C_0^{\omega M/\varepsilon}$ ;*

- 4) порядок нуля в точке  $z = 0$  каждой из линейных функциональных форм (0.21) не ниже

$$K = \left\lfloor \frac{(\omega - \varepsilon)M}{\theta} \right\rfloor = \left\lfloor \left( 2 - \frac{m-1}{N+m-1} - \frac{\varepsilon}{\theta} \right) M \right\rfloor.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим нормальное разложение требуемых многочленов:

$$P_{\bar{\kappa}}(z) = \sum_{\nu=0}^{M-1} \frac{P_{\bar{\kappa},\nu}}{\nu!} z^\nu, \quad \bar{\kappa} \in \Omega, \quad (1.2)$$

и будем искать нужную совокупность целых чисел  $P_{\bar{\kappa},\nu}$ ,  $\bar{\kappa} \in \Omega$ ,  $\nu = 0, 1, \dots, M-1$ , общее количество которых  $\omega M$ .

Пользуясь определением E-функции одновременно для функций

$$f_j(z) = \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{f_{j,\nu}}{\nu!} z^\nu, \quad j = 1, \dots, m,$$

получим некоторую положительную константу  $C$  и последовательность  $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{N}$  такие, что

$$|\varphi_K f_{j,\nu}| < C^{2K}, \quad \varphi_K f_{j,\nu} \in \mathbb{Z}, \quad j = 1, \dots, m, \quad \nu = 0, 1, \dots, K-1. \quad (1.3)$$

Запишем искомые формы в виде

$$R_{\bar{s}}(z) = \sum_{\mu=0}^{\infty} \frac{R_{\bar{s},\mu}}{\mu!} z^\mu, \quad \bar{s} \in \Theta,$$

где, согласно формулам (0.21),

$$R_{\bar{s},\mu} = P_{\bar{s},\mu} + \sum_{j=1}^m \sum_{\substack{0 \leq \nu \leq \mu \\ \mu - \nu < M}} \binom{\mu}{\nu} P_{\bar{s} - \bar{e}_j, \mu - \nu} f_{j,\nu}, \quad \mu = 0, 1, \dots, K-1.$$

Домножая каждое из этих равенств на  $\varphi_K$ , мы получим, согласно условию

$$\operatorname{ord}_{z=0} R_{\bar{s}}(z) \geq K, \quad \bar{s} \in \Theta,$$

в точности  $\theta K \leq (\omega - \varepsilon)M$  линейных уравнений

$$\varphi_K R_{\bar{s}, \mu} = 0, \quad \bar{s} \in \Theta, \quad \mu = 0, 1, \dots, K-1,$$

относительно  $P_{\bar{k}, \nu}$ ,  $\bar{k} \in \Omega$ ,  $\nu = 0, 1, \dots, M-1$ , целые коэффициенты которых в силу (1.3) и того, что

$$\binom{\mu}{\nu} < 2^K, \quad \nu = 0, 1, \dots, \mu, \quad \mu = 0, 1, \dots, K-1,$$

ограничены по модулю величиной  $2^K C^{2K}$ . Осталось воспользоваться леммой Зигеля (см. лемму 11 [20, гл. 3]), согласно которой существует нетривиальный набор многочленов (1.2) с целыми коэффициентами в нормальном разложении, ограниченными по модулю величиной

$$(\Psi 2^K C^{2K})^{\Upsilon/(\Psi-\Upsilon)} < (\omega M 2^{2M} C^{4M})^{\omega/\varepsilon}.$$

Учитывая, что  $\omega < M$  согласно (1.1), получаем требуемое.

Докажем теперь указанное выше свойство (0.23) дифференциального оператора (0.22):

$$\begin{aligned} D \sum_{j=1}^m a_j f_j(z) &= \sum_{j=1}^m a_j \frac{f_j}{z}(z) - \sum_{j=1}^m \left( \sum_{l=1}^m Q_{lj}(z) a_l \right) f_j(z) \\ &= \sum_{l=1}^m a_l \frac{f_l}{z}(z) - \sum_{l=1}^m a_l \sum_{j=1}^m Q_{lj}(z) f_j(z) \\ &= \sum_{l=1}^m a_l \left( f_l'(z) - \sum_{j=1}^m Q_{lj}(z) f_j(z) \right) \\ &= \sum_{l=1}^m a_l Q_{l0}(z). \end{aligned}$$

Положим

$$\begin{aligned} P_{\bar{\kappa}}^{[0]}(z) &= P_{\bar{\kappa}}(z), \quad \bar{\kappa} \in \Omega; \\ R_{\bar{s}}^{[0]}(z) &= R_{\bar{s}}(z), \quad \bar{s} \in \Theta, \end{aligned}$$

где  $P_{\bar{\kappa}}(z)$ ,  $\bar{\kappa} \in \Omega$ , и  $R_{\bar{s}}(z)$ ,  $\bar{s} \in \Theta$ , – построенные в лемме 1.1 многочлены и отвечающие им линейные формы (0.21);

$$R^{[0]}(z; \bar{a}) = \sum_{\bar{s} \in \Theta} \bar{a}^{\bar{s}} R_{\bar{s}}^{[0]}(z).$$

Тогда функциональные формы

$$R^{[n]}(z; \bar{a}) = (T(z)D)^n R^{[0]}(z; \bar{a}), \quad n \geq 0,$$

будут иметь вид

$$R^{[n]}(z; \bar{a}) = \sum_{\bar{\kappa}: |\bar{\kappa}|=N} \bar{a}^{\bar{\kappa}} P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) + \sum_{\bar{\kappa}: |\bar{\kappa}|=N-1} \bar{a}^{\bar{\kappa}} P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) \sum_{j=1}^m a_j f_j(z), \quad n \geq 0,$$

и входящие в них многочлены от  $z$  удовлетворяют следующим рекуррентным соотношениям:

$$\begin{aligned} P_{\bar{\kappa}}^{[n+1]}(z) &= T(z) \left( \frac{d}{dz} P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) - \sum_{l,j=1}^m (\kappa_j - \delta_{lj} + 1) Q_{lj}(z) P_{\bar{\kappa} - \bar{e}_l + \bar{e}_j}^{[n]}(z) \right. \\ &\quad \left. + (|\bar{\kappa}| - N + 1) \sum_{l=1}^m Q_{l0}(z) P_{\bar{\kappa} - \bar{e}_l}^{[n]}(z) \right), \quad \bar{\kappa} \in \Omega, \quad n \geq 0. \quad (1.4) \end{aligned}$$

Аналогичным соотношениям удовлетворяют и отвечающие каждой функциональной форме

$$R^{[n]}(z; \bar{a}) = \sum_{\bar{s} \in \Theta} \bar{a}^{\bar{s}} R_{\bar{s}}^{[n]}(z), \quad n \geq 0,$$

линейные формы  $R_{\bar{s}}^{[n]}(z)$ ,  $\bar{s} \in \Theta$ ,  $n \geq 0$ , от функций  $f_1(z), \dots, f_m(z)$ :

$$R_{\bar{s}}^{[n+1]}(z) = T(z) \left( \frac{d}{dz} R_{\bar{s}}^{[n]}(z) - \sum_{l,j=1}^m (s_j - \delta_{lj} + 1) Q_{lj}(z) R_{\bar{s} - \bar{e}_l + \bar{e}_j}^{[n]}(z) \right),$$

$$\bar{s} \in \Theta, \quad n \geq 0. \quad (1.5)$$

Если ввести обозначение

$$t = \max \left\{ \deg T, \max_{l,j} \{ \deg T Q_{lj} \} \right\},$$

то из леммы 1.1 и соотношений (1.4), (1.5) имеем:

$$\deg P_{\bar{\kappa}}^{[n]} < M + tn, \quad \bar{\kappa} \in \Omega, \quad n \geq 0; \quad (1.6)$$

$$\text{ord}_{z=0} R_{\bar{s}}^{[n]} \geq K - n, \quad \bar{s} \in \Theta, \quad n \geq 0. \quad (1.7)$$

ЛЕММА 1.2. Для многочлена

$$g(z) = \sum_{\nu} \frac{g_{\nu}}{\nu!} z^{\nu}, \quad g_{\nu} \in \mathbb{C},$$

положим

$$\|g(z)\| = \max_{\nu} \{|g_{\nu}|\}.$$

Тогда

- а)  $\|g'(z)\| \leq \|g(z)\|$ ;
- б)  $\|g_1(z) + g_2(z)\| \leq \|g_1(z)\| + \|g_2(z)\|$ ;
- в)  $\|g_1(z)g_2(z)\| \leq \binom{\deg g_1(z) + \deg g_2(z)}{\deg g_1(z)} \|g_1(z)\| \cdot \|g_2(z)\|$ .

Доказательство свойств а) и б) тривиально.

в) Пусть

$$g_i(z) = \sum_{\nu=0}^{n_i} \frac{g_{i,\nu}}{\nu!} z^\nu, \quad i = 1, 2; \quad h(z) = g_1(z)g_2(z) = \sum_{\eta=0}^{n_1+n_2} \frac{h_\eta}{\eta!} z^\eta.$$

Тогда

$$h(z) = \sum_{\nu=0}^{n_1} \sum_{\mu=0}^{n_2} \frac{g_{1,\nu}}{\nu!} \frac{g_{2,\mu}}{\mu!} z^{\nu+\mu} = \sum_{\eta=0}^{n_1+n_2} \sum_{(\nu,\mu) \in S_\eta} \binom{\eta}{\nu} g_{1,\nu} g_{2,\mu} \frac{z^\eta}{\eta!},$$

$$S_\eta = \{(\nu, \mu) : 0 \leq \nu \leq n_1, 0 \leq \mu \leq n_2, \nu + \mu = \eta\},$$

$$\eta = 0, 1, \dots, n_1 + n_2,$$

откуда

$$|h_\eta| = \left| \sum_{(\nu,\mu) \in S_\eta} \binom{\eta}{\nu} g_{1,\nu} g_{2,\mu} \right| \leq \|g_1(z)\| \cdot \|g_2(z)\| \sum_{(\nu,\mu) \in S_\eta} \binom{\eta}{\nu},$$

$$\eta = 0, 1, \dots, n_1 + n_2. \quad (1.8)$$

Имеем:

$$\sum_{(\nu,\mu) \in S_\eta} \binom{\eta}{\nu} \leq \sum_{(\nu,\mu) \in S_\eta} \binom{n_1 + n_2 - \eta}{n_1 - \nu} \binom{\eta}{\nu}$$

$$= \frac{(n_1 + n_2 - \eta)! \eta!}{n_1! n_2!} \sum_{(\nu,\mu) \in S_\eta} \binom{n_1}{\nu} \binom{n_2}{\mu},$$

$$\eta = 0, 1, \dots, n_1 + n_2. \quad (1.9)$$

Воспользуемся формулой для бинома Ньютона:

$$(1+z)^{n_1} = \sum_{\nu=0}^{n_1} \binom{n_1}{\nu} z^\nu; \quad (1+z)^{n_2} = \sum_{\mu=0}^{n_2} \binom{n_2}{\mu} z^\mu,$$

откуда

$$\begin{aligned} (1+z)^{n_1+n_2} &= \sum_{\nu=0}^{n_1} \binom{n_1}{\nu} z^\nu \sum_{\mu=0}^{n_2} \binom{n_2}{\mu} z^\mu \\ &= \sum_{\eta=0}^{n_1+n_2} \sum_{(\nu,\mu) \in S_\eta} \binom{n_1}{\nu} \binom{n_2}{\mu} z^\eta, \end{aligned} \quad (1.10)$$

а с другой стороны,

$$(1+z)^{n_1+n_2} = \sum_{\eta=0}^{n_1+n_2} \binom{n_1+n_2}{\eta} z^\eta. \quad (1.11)$$

Сравнивая коэффициенты при  $z^\eta$ ,  $\eta = 0, 1, \dots, n_1 + n_2$ , в соотношениях (1.10) и (1.11), заключаем:

$$\sum_{(\nu,\mu) \in S_\eta} \binom{n_1}{\nu} \binom{n_2}{\mu} = \binom{n_1+n_2}{\eta}, \quad \eta = 0, 1, \dots, n_1 + n_2. \quad (1.12)$$

Осталось подставить полученное тождество (1.12) в неравенство (1.9) и продолжить оценку (1.8):

$$\begin{aligned} |h_\eta| &\leq \|g_1(z)\| \cdot \|g_2(z)\| \frac{(n_1+n_2-\eta)! \eta!}{n_1! n_2!} \binom{n_1+n_2}{\eta} \\ &= \|g_1(z)\| \cdot \|g_2(z)\| \binom{n_1+n_2}{n_1}, \quad \eta = 0, 1, \dots, n_1 + n_2, \end{aligned}$$

что и требовалось доказать.

ЛЕММА 1.3. а) Коэффициенты в нормальном разложении многочленов  $P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z)$ ,  $\bar{\kappa} \in \Omega$ ,  $n \geq 0$ , являются целыми числами и при  $n < C_1 \varepsilon M$  имеет место оценка

$$\max_{\bar{\kappa} \in \Omega} \{ \|P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z)\| \} < C_0^{\omega M/\varepsilon} M^{C_2 \varepsilon M}. \quad (1.13)$$

б) При  $n < C_1 \varepsilon M$  справедлива оценка

$$|R_{\bar{s}^*}^{[n]}(\alpha)| < C_0^{\omega M/\varepsilon} M^{C_2 \varepsilon M} C_3^M M^{-K}, \quad \bar{s}^* = N \bar{e}_{l^*}. \quad (1.14)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. а) Первая часть утверждения вытекает из соотношений (1.4) и выбора (0.6) многочлена  $T(z)$ . Положим

$$C_4 = \max \left\{ \|T\|, \max_{l,j} \{ \|TQ_{lj}\| \} \right\}$$

и воспользуемся рекуррентными соотношениями (1.4) и неравенствами леммы 1.2:

$$\begin{aligned} \max_{\bar{\kappa} \in \Omega} \{ \|P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z)\| \} &\leq (m^2 + m + 1)N \binom{M + tn - 1}{t} \cdot C_4 \\ &\times \max_{\bar{\kappa} \in \Omega} \{ \|P_{\bar{\kappa}}^{[n-1]}(z)\| \}, \quad n \geq 1, \end{aligned}$$

откуда простая индукция по  $n$  дает оценку

$$\begin{aligned} \max_{\bar{\kappa} \in \Omega} \{ \|P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z)\| \} &\leq ((m^2 + m + 1)N)^n \cdot \left( \frac{1}{t!} \right)^n \frac{(M + tn - 1)!}{(M - 1)!} \cdot C_4^n \\ &\times \max_{\bar{\kappa} \in \Omega} \{ \|P_{\bar{\kappa}}^{[0]}(z)\| \} \\ &< \left( \frac{C_4(m^2 + m + 1)N}{t!} \right)^n (2M)^{tn} C_0^{\omega M/\varepsilon}, \quad n \geq 0. \end{aligned}$$

Осталось вспомнить, что  $n < C_1 \varepsilon M$ .

б) Пусть  $P_{\bar{s}^*, \nu}^{[n]}$ ,  $P_{\bar{\kappa}^*, \nu}^{[n]}$ ,  $\nu \in \mathbb{Z}^+$ , – коэффициенты в нормальном разложении многочленов  $P_{\bar{s}^*}^{[n]}(z)$ ,  $P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}(z)$ ,  $n \geq 0$ , соответственно,  $\bar{\kappa}^* = \bar{s}^* - \bar{e}_{l^*}$ ;  $R_{\bar{s}^*, \mu}^{[n]}$ ,  $\mu \in \mathbb{Z}^+$ , – коэффициенты в нормальном разложении линейных форм  $R_{\bar{s}^*}^{[n]}(z)$ ,  $n \geq 0$ . Тогда согласно формуле (0.21)

$$R_{\bar{s}^*}^{[n]}(z) = P_{\bar{s}^*}^{[n]}(z) + P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}(z) f_{l^*}(z), \quad n \geq 0, \quad (1.15)$$

и значит,

$$R_{\bar{s}^*, \mu}^{[n]} = P_{\bar{s}^*, \mu}^{[n]} + \sum_{\nu=0}^{\mu} \binom{\mu}{\nu} P_{\bar{\kappa}^*, \nu}^{[n]} f_{l^*, \mu-\nu}, \quad \mu \in \mathbb{Z}^+, \quad n \geq 0. \quad (1.16)$$

При этом

$$R_{\bar{s}^*, \mu}^{[n]} = 0, \quad \mu < K - n, \quad n < C_1 \varepsilon M.$$

Поэтому, если в соотношении (1.16) воспользоваться оценкой (1.13) и определением E-функции для  $f_{l^*}(z)$ , то мы получим (для  $\mu \geq K - n$ ):

$$|R_{\bar{s}^*, \mu}^{[n]}| \leq 2 \sum_{\nu=0}^{\mu} \binom{\mu}{\nu} \max_{\bar{\kappa} \in \Omega} \{ \|P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z)\| \} C^{\mu+1} < (2C)^{\mu+1} C_0^{\omega M/\varepsilon} M^{C_2 \varepsilon M},$$

откуда

$$|R_{\bar{s}^*}^{[n]}(\alpha)| = \left| \sum_{\mu \geq K-n} \frac{R_{\bar{s}^*, \mu}^{[n]} \alpha^\mu}{\mu!} \right| < C_0^{\omega M/\varepsilon} M^{C_2 \varepsilon M} \sum_{\mu \geq K-n} \frac{|\alpha|^\mu}{\mu!} (2C)^{\mu+1}.$$

Пользуясь неравенством

$$\begin{aligned}
\sum_{\mu \geq K-n} \frac{|\alpha|^\mu}{\mu!} (2C)^{\mu+1} &\leq \frac{|\alpha|^{K-n} (2C)^{K-n+1}}{(K-n)!} \sum_{\mu \geq K-n} \frac{(2C|\alpha|)^{\mu-K+n}}{(\mu-K+n)!} \\
&= \frac{|\alpha|^{K-n} (2C)^{K-n+1}}{(K-n)!} e^{2C|\alpha|} \\
&< (2C|\alpha|)^{2M} \left( \frac{e}{K-n} \right)^{K-n} e^{2C|\alpha|} \\
&< (2C|\alpha|)^{2M} \left( \frac{e}{M} \right)^K e^{2C|\alpha|} \\
&< e^{2C|\alpha|} (2C|\alpha|e)^{2M} M^{-K},
\end{aligned}$$

поскольку  $M < K - n \leq K < 2M$ , получаем:

$$|R_{\bar{s}^*}^{[n]}(\alpha)| < C_0^{\omega M/\varepsilon} M^{C_2 \varepsilon M} e^{2C|\alpha|} (2C|\alpha|e)^{2M} M^{-K},$$

что и дает (1.14).

Лемма 1.3 и равенство (1.15) означают, что рациональное число  $-P_{\bar{s}^*}^{[n]}(\alpha)/P_{\bar{s}^* - \bar{e}_{l^*}}^{[n]}(\alpha)$  для любого не слишком большого  $n$  будет достаточно хорошим приближением к числу  $f_{l^*}(\alpha)$ .

## § 2. Алгебраическая природа переходной матрицы

Рассмотрим матрицу

$$(x_{\bar{\kappa}, \bar{s}})_{\bar{\kappa} \in \Omega; \bar{s} \in \Theta}, \quad (2.1)$$

где

$$\begin{aligned}
x_{\bar{\kappa}, \bar{s}} &= \delta_{\bar{\kappa}, \bar{s}}, & \text{если } |\bar{\kappa}| = N; \\
x_{\bar{\kappa}, \bar{s}} &= \sum_{j=1}^m \delta_{\bar{\kappa} + \bar{e}_j, \bar{s}} y_j, & \text{если } |\bar{\kappa}| = N - 1, \quad \bar{s} \in \Theta,
\end{aligned} \quad (2.2)$$

переменные  $y_1, y_2, \dots, y_m$  независимы. При подстановке  $y_j = f_j(z)$ ,  $j = 1, \dots, m$ , матрица (2.1) согласно формуле (0.20) является матрицей перехода от строки  $(P_{\bar{\kappa}}(z))_{\bar{\kappa} \in \Omega}$  к строке  $(R_{\bar{s}}(z))_{\bar{s} \in \Theta}$ .

Пусть задано непустое множество  $\tilde{\Omega} \subset \Omega$  и функции

$$\begin{aligned} D_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'}(z) &\in \mathbb{C}(z), & \bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}, \quad \bar{\kappa}' \in \Omega \setminus \tilde{\Omega}, \\ D_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'}(z) &\equiv 0, \quad \bar{\kappa}' \prec \bar{\kappa}, \end{aligned} \quad (2.3)$$

определяют элементы матрицы

$$(\tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{s}})_{\bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}; \bar{s} \in \Theta} \quad (2.4)$$

по формуле

$$\begin{aligned} \tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{s}} &= x_{\bar{\kappa}, \bar{s}} + \sum_{\bar{\kappa}' \in \Omega \setminus \tilde{\Omega}} D_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'} x_{\bar{\kappa}', \bar{s}} \\ &= x_{\bar{\kappa}, \bar{s}} + \sum_{\substack{\bar{\kappa}' \in \Omega \setminus \tilde{\Omega} \\ \bar{\kappa}' \succ \bar{\kappa}}} D_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'} x_{\bar{\kappa}', \bar{s}}, \quad \bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}, \quad \bar{s} \in \Theta. \end{aligned} \quad (2.5)$$

Целью этого параграфа будет доказательство оценки снизу ранга матрицы (2.4), содержащейся в следующем утверждении.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.1.** *Для любого непустого множества  $\tilde{\Omega} \subset \Omega$ ,  $\text{Card } \tilde{\Omega} = \tilde{\omega}$ , существуют множества  $\Omega_1 \subset \tilde{\Omega}$  и  $\Theta_1 \subset \Theta$ ,  $\text{Card } \Omega_1 = \text{Card } \Theta_1 = \tilde{\theta}$ , зависящие только от множества  $\tilde{\Omega}$  и не зависящие от рациональных функций (2.3), такие, что минор  $\det(\tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{s}})_{\bar{\kappa} \in \Omega_1; \bar{s} \in \Theta_1}$  матрицы (2.4) отличен от нуля и*

$$\begin{cases} \frac{\tilde{\omega}}{\tilde{\theta}} \leq \frac{\omega}{\theta} - \frac{1}{(N+m-1)\theta}, & \text{если } \tilde{\Omega} \neq \Omega; \\ \frac{\tilde{\omega}}{\tilde{\theta}} = \frac{\omega}{\theta}, & \text{если } \tilde{\Omega} = \Omega. \end{cases}$$

ЛЕММА 2.2. Пусть произвольные подмножества  $\Omega_1 \subset \Omega$  и  $\Theta_1 \subset \Theta$  выбраны так, что  $\text{Card } \Omega_1 = \text{Card } \Theta_1$ . Тогда определитель

$$\det(x_{\bar{\kappa}, \bar{s}})_{\bar{\kappa} \in \Omega_1; \bar{s} \in \Theta_1}$$

как многочлен от переменных  $y_1, \dots, y_m$  является мономом мультистепенени

$$\bar{r} = \bar{r}(\Omega_1, \Theta_1) = \sum_{\bar{s} \in \Theta_1} \bar{s} - \sum_{\bar{\kappa} \in \Omega_1} \bar{\kappa}$$

или равен нулю.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Требуемый определитель представляет собой сумму всевозможных произведений вида

$$\pm \prod_{\bar{\kappa} \in \Omega_1} x_{\bar{\kappa}, \sigma(\bar{\kappa})},$$

где  $\sigma$  – произвольное биективное отображение множества  $\Omega_1$  на множество  $\Theta_1$ . Поэтому достаточно показать, что каждое такое ненулевое произведение в точности равно  $\pm \bar{y}^{\bar{r}}$ . Из определения (2.2) элементов матрицы (2.1) следует, что если  $x_{\bar{\kappa}, \sigma(\bar{\kappa})} \neq 0$  для всех  $\bar{\kappa} \in \Omega_1$ , то для каждого  $\bar{\kappa} \in \Omega_1$  либо  $\sigma(\bar{\kappa}) = \bar{\kappa}$  (и тогда  $x_{\bar{\kappa}, \sigma(\bar{\kappa})} = 1$ ,  $|\bar{\kappa}| = N$ ) либо существует  $j = j(\bar{\kappa}, \sigma)$ ,  $1 \leq j \leq m$ , такой, что  $\sigma(\bar{\kappa}) = \bar{\kappa} + \bar{e}_j$  (и тогда  $x_{\bar{\kappa}, \sigma(\bar{\kappa})} = y_j$ ,  $|\bar{\kappa}| = N - 1$ ). Поэтому

$$\prod_{\bar{\kappa} \in \Omega_1} x_{\bar{\kappa}, \sigma(\bar{\kappa})} = \prod_{\substack{\bar{\kappa} \in \Omega_1 \\ |\bar{\kappa}| = N - 1}} y_{j(\bar{\kappa}, \sigma)}, \quad (2.6)$$

где произведение в правой части в случае  $\Omega_1 \subset \Theta$  считаем равным 1.

Сложим равенства

$$\sigma(\bar{\kappa}) = \begin{cases} \bar{\kappa}, & \text{если } |\bar{\kappa}| = N; \\ \bar{\kappa} + \bar{e}_{j(\bar{\kappa}, \sigma)}, & \text{если } |\bar{\kappa}| = N - 1, \end{cases} \quad \bar{\kappa} \in \Omega_1, \quad (2.7)$$

по всевозможным  $\bar{\kappa} \in \Omega_1$  и воспользуемся тем, что  $\sigma : \Omega_1 \rightarrow \Theta_1$  есть биекция:

$$\sum_{\substack{\bar{\kappa} \in \Omega_1 \\ |\bar{\kappa}|=N-1}} \bar{e}_{j(\bar{\kappa}, \sigma)} = \sum_{\bar{\kappa} \in \Omega_1} \sigma(\bar{\kappa}) - \sum_{\bar{\kappa} \in \Omega_1} \bar{\kappa} = \sum_{\bar{s} \in \Theta_1} \bar{s} - \sum_{\bar{\kappa} \in \Omega_1} \bar{\kappa} = \bar{r},$$

а это означает, что

$$\prod_{\substack{\bar{\kappa} \in \Omega_1 \\ |\bar{\kappa}|=N-1}} y_{j(\bar{\kappa}, \sigma)} = \prod_{\substack{\bar{\kappa} \in \Omega_1 \\ |\bar{\kappa}|=N-1}} \bar{y}^{\bar{e}_{j(\bar{\kappa}, \sigma)}} = \bar{y}^{\bar{r}}.$$

Сопоставляя это равенство с (2.6), получаем требуемое утверждение.

ЗАМЕЧАНИЕ. Из доказательства леммы 2.2 вытекает, что величина

$$\text{Card} \{ \bar{\kappa} \in \Omega_1 : \sigma(\bar{\kappa}) = \bar{\kappa} + \bar{e}_j \} = r_j$$

зависит только от множеств  $\Omega_1$ ,  $\Theta_1$ , и не зависит от биективного отображения  $\sigma : \Omega_1 \rightarrow \Theta_1$  вида (2.7).

ЛЕММА 2.3. Пусть заданы множество  $\tilde{\Omega} \subset \Omega$ , рациональные функции (2.3); произвольные множества  $\Omega_1 \subset \tilde{\Omega}$  и  $\Theta_1 \subset \Theta$  таковы, что  $\text{Card } \Omega_1 = \text{Card } \Theta_1$ . Тогда если  $\det(x_{\bar{\kappa}, \bar{s}})_{\bar{\kappa} \in \Omega_1; \bar{s} \in \Theta_1} \neq 0$ , то и  $\det(\tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{s}})_{\bar{\kappa} \in \Omega_1; \bar{s} \in \Theta_1} \neq 0$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Перепишем соотношение (2.5) в виде

$$(\tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{s}})_{\bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}; \bar{s} \in \Theta} = (\tilde{D}_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'})_{\bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}; \bar{\kappa}' \in \Omega} (x_{\bar{\kappa}', \bar{s}})_{\bar{\kappa}' \in \Omega; \bar{s} \in \Theta},$$

где

$$\tilde{D}_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'} = \begin{cases} \delta_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'}, & \text{если } \bar{\kappa}' \in \tilde{\Omega}; \\ D_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'}, & \text{если } \bar{\kappa}' \in \Omega \setminus \tilde{\Omega}, \end{cases} \quad \bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}, \quad (2.8)$$

и воспользуемся формулой Бине–Коши [4, с. 17]:

$$\begin{aligned} & \det(\tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{s}})_{\bar{\kappa} \in \Omega_1; \bar{s} \in \Theta_1} \\ &= \sum_{\substack{\Omega' \subset \Omega \\ \text{Card } \Omega' = \text{Card } \Omega_1}} \det(\tilde{D}_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'} )_{\bar{\kappa} \in \Omega_1; \bar{\kappa}' \in \Omega'} \det(x_{\bar{\kappa}', \bar{s}})_{\bar{\kappa}' \in \Omega'; \bar{s} \in \Theta_1}. \end{aligned} \quad (2.9)$$

Согласно лемме 2.2 каждый определитель  $\det(x_{\bar{\kappa}', \bar{s}})_{\bar{\kappa}' \in \Omega'; \bar{s} \in \Theta_1}$ , отличный от нуля, является произведением степеней переменных  $y_1, \dots, y_m$ . Покажем, что определитель, отвечающий множеству  $\Omega' = \Omega_1$  (отличный от нуля по условию), имеет наибольшую мультистепень среди всех других ненулевых определителей такого вида, а коэффициент при нем в сумме (2.9) равен 1. Отсюда и будет следовать утверждение леммы 2.3.

Рассмотрим каждое ненулевое слагаемое суммы (2.9). Пусть  $\Omega'$  – произвольное подмножество  $\Omega$ ,  $\text{Card } \Omega' = \text{Card } \Omega_1$ , такое, что  $\det(\tilde{D}_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'})_{\bar{\kappa} \in \Omega_1; \bar{\kappa}' \in \Omega'} \neq 0$ .

Если  $\Omega' = \Omega_1$ , то

$$\det(\tilde{D}_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'})_{\bar{\kappa} \in \Omega_1; \bar{\kappa}' \in \Omega'} = \det(\delta_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'})_{\bar{\kappa} \in \Omega_1; \bar{\kappa}' \in \Omega_1} = 1.$$

Если же  $\Omega' \neq \Omega_1$ , то  $\tilde{\Omega}' = \Omega' \cap \tilde{\Omega} \subset \Omega_1$ . Действительно, в противном случае существует мультииндекс  $\bar{\kappa}' \in \tilde{\Omega}' \subset \tilde{\Omega}$  такой, что  $\bar{\kappa}' \notin \Omega_1$ . Тогда для любого  $\bar{\kappa} \in \Omega_1$  имеем  $\tilde{D}_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'} = \delta_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'} = 0$ , и значит,  $\det(\tilde{D}_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'})_{\bar{\kappa} \in \Omega_1; \bar{\kappa}' \in \Omega'} = 0$ . Итак,  $\tilde{\Omega}' \subset \Omega_1$ .

Раскладывая определитель матрицы  $(\tilde{D}_{\bar{k}, \bar{k}'}_{\bar{k} \in \Omega_1; \bar{k}' \in \Omega'})$  последовательно по строкам с номерами  $\bar{k} \in \tilde{\Omega}' \subset \tilde{\Omega}$ , согласно (2.8) получим с точностью до знака определитель

$$\det(\tilde{D}_{\bar{k}, \bar{k}'}_{\bar{k} \in \Omega_1 \setminus \tilde{\Omega}'; \bar{k}' \in \Omega' \setminus \tilde{\Omega}'}) = \det(D_{\bar{k}, \bar{k}'}_{\bar{k} \in \Omega_1 \setminus \tilde{\Omega}'; \bar{k}' \in \Omega' \setminus \tilde{\Omega}'})$$

Поскольку  $\Omega' \neq \Omega_1$ , имеем  $\mu = \text{Card}(\Omega_1 \setminus \tilde{\Omega}') = \text{Card}(\Omega' \setminus \tilde{\Omega}') \geq 1$ .

Упорядочим элементы множеств в лексикографическом порядке:

$$\Omega_1 \setminus \tilde{\Omega}' = \{\bar{k}^{(1)}, \dots, \bar{k}^{(\mu)}\}, \quad \bar{k}^{(1)} \prec \dots \prec \bar{k}^{(\mu)};$$

$$\Omega' \setminus \tilde{\Omega}' = \{\bar{r}^{(1)}, \dots, \bar{r}^{(\mu)}\}, \quad \bar{r}^{(1)} \prec \dots \prec \bar{r}^{(\mu)}.$$

Если для некоторого  $\nu$ ,  $1 \leq \nu \leq \mu$ , выполнено  $\bar{r}^{(\nu)} \prec \bar{k}^{(\nu)}$ , то согласно (2.3)

$$D_{\bar{k}, \bar{k}'} = 0, \quad \bar{k} \in \{\bar{k}^{(\nu)}, \dots, \bar{k}^{(\mu)}\}, \quad \bar{k}' \in \{\bar{r}^{(1)}, \dots, \bar{r}^{(\nu)}\}.$$

Это означает, что первые  $\nu$  столбцов матрицы  $(D_{\bar{k}, \bar{k}'}_{\bar{k} \in \Omega_1 \setminus \tilde{\Omega}'; \bar{k}' \in \Omega' \setminus \tilde{\Omega}'})$  линейно зависимы, что невозможно ввиду условия

$$\det(D_{\bar{k}, \bar{k}'}_{\bar{k} \in \Omega_1 \setminus \tilde{\Omega}'; \bar{k}' \in \Omega' \setminus \tilde{\Omega}'}) = \pm \det(\tilde{D}_{\bar{k}, \bar{k}'}_{\bar{k} \in \Omega_1; \bar{k}' \in \Omega'}) \neq 0.$$

Поэтому  $\bar{r}^{(\nu)} \succ \bar{k}^{(\nu)}$  для всех  $\nu = 1, \dots, \mu$ , и, в частности,

$$\sum_{\nu=1}^{\mu} \bar{r}^{(\nu)} \succ \sum_{\nu=1}^{\mu} \bar{k}^{(\nu)},$$

или

$$\sum_{\bar{k} \in \Omega' \setminus \tilde{\Omega}'} \bar{k} \succ \sum_{\bar{k} \in \Omega_1 \setminus \tilde{\Omega}'} \bar{k}.$$

Таким образом, любому ненулевому слагаемому в сумме (2.9), соответствует либо множество  $\Omega' = \Omega_1$  либо множество  $\Omega'$ , для которого

$$\sum_{\bar{k} \in \Omega'} \bar{k} \succ \sum_{\bar{k} \in \Omega_1} \bar{k}.$$

Но последнее условие согласно лемме 2.2 означает, что мультистепень соответствующего множествам  $\Omega'$ ,  $\Theta_1$  монома младше мультистепени монома, соответствующего множествам  $\Omega_1$ ,  $\Theta_1$ . Следовательно, в многочлене  $\det(\tilde{x}_{\bar{k}, \bar{s}})_{\bar{k} \in \Omega_1; \bar{s} \in \Theta_1}$  от переменных  $y_1, \dots, y_m$  присутствует по крайней мере один моном с ненулевым коэффициентом. Это завершает доказательство.

Будем рассматривать пары  $(\Omega_1, \sigma)$ , где  $\Omega_1 \subset \tilde{\Omega}$  и  $\sigma : \Omega_1 \rightarrow \Theta$ , удовлетворяющие следующим условиям:

- 1)  $\text{Card } \sigma(\Omega_1) = \text{Card } \Omega_1$ , т.е.  $\sigma$  – биекция множеств  $\Omega_1$  и  $\sigma(\Omega_1)$ ;
- 2) отображение  $\sigma : \Omega_1 \rightarrow \Theta$  имеет вид (2.7);
- 3) если  $\bar{k} \in \Omega_1$  и  $\bar{k} + \bar{e}_j \prec \sigma(\bar{k})$ , то  $\bar{k} + \bar{e}_j \in \sigma(\Omega_1)$  и  $\sigma^{-1}(\bar{k} + \bar{e}_j) \succ \bar{k}$ .

**ЛЕММА 2.4.** *Если  $\tilde{\Omega} \neq \emptyset$ , то пары  $(\Omega_1, \sigma)$ , удовлетворяющие условиям 1)–3), существуют.*

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Рассмотрим отдельно случаи, когда  $\tilde{\Omega} \cap \Theta \neq \emptyset$  и когда  $\tilde{\Omega} \cap \Theta = \emptyset$ . В первом возьмем произвольный элемент  $\bar{k} \in \tilde{\Omega} \cap \Theta$  и положим  $\sigma(\bar{k}) = \bar{k}$ , во втором – произвольный элемент  $\bar{k} \in \tilde{\Omega}$  и положим  $\sigma(\bar{k}) = \bar{k} + \bar{e}_m \in \Theta$ . Тогда пара  $(\{\bar{k}\}, \sigma)$ , очевидно, удовлетворяет условиям 1) и 2). Кроме того, не существует  $j$ ,  $1 \leq j \leq m$ , такого, что  $\bar{k} + \bar{e}_j \prec \sigma(\bar{k})$ . Поэтому условие 3) также выполнено для указанной пары.

ЛЕММА 2.5. Пусть множество  $\Omega_1 \subset \tilde{\Omega}$  вместе с отображением  $\sigma : \Omega_1 \rightarrow \Theta$  удовлетворяют условиям 1)–3). Тогда любое биективное отображение множества  $\Omega_1$  в  $\sigma(\Omega_1)$  вида (2.7) совпадает с  $\sigma$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $\sigma'$  – произвольная биекция множества  $\Omega_1$  в  $\Theta_1 = \sigma(\Omega_1)$  вида (2.7). Тогда если  $\bar{k} \in \Omega_1 \cap \Theta$ , то  $\sigma'(\bar{k}) = \bar{k} = \sigma(\bar{k})$ . Поэтому, если  $\sigma'(\bar{k}) \neq \sigma(\bar{k})$ , то  $\bar{k} \in \Omega_1 \setminus \Theta$ . Предположим, что существуют элементы  $\bar{k} \in \Omega_1$ , для которых  $\sigma'(\bar{k}) \neq \sigma(\bar{k})$ . Пусть  $j'$ ,  $1 \leq j' \leq m$ , – наибольший номер, для которого существует  $\bar{k}' \in \Omega_1$  с условием  $\sigma'(\bar{k}') = \bar{k}' + \bar{e}_{j'} \neq \sigma(\bar{k}')$ . Как было отмечено в замечании к лемме 2.2,

$$\text{Card}\{\bar{k} \in \Omega_1 : \sigma'(\bar{k}) = \bar{k} + \bar{e}_j\} = \text{Card}\{\bar{k} \in \Omega_1 : \sigma(\bar{k}) = \bar{k} + \bar{e}_j\}.$$

Из условия  $\sigma'(\bar{k}) = \bar{k} + \bar{e}_j$ ,  $j' < j \leq m$ , в силу выбора  $j'$  вытекает, что  $\sigma'(\bar{k}) = \sigma(\bar{k})$ . Так что множества  $\{\bar{k} \in \Omega_1 : \sigma'(\bar{k}) = \bar{k} + \bar{e}_j\}$  и  $\{\bar{k} \in \Omega_1 : \sigma(\bar{k}) = \bar{k} + \bar{e}_j\}$ ,  $j' < j \leq m$ , совпадают, и значит, если  $\sigma(\bar{k}) = \bar{k} + \bar{e}_j$  при  $j' < j \leq m$ , то  $\sigma(\bar{k}) = \sigma'(\bar{k})$ . Поэтому из условия  $\sigma'(\bar{k}') = \bar{k}' + \bar{e}_{j'} \neq \sigma(\bar{k}') = \bar{k}' + \bar{e}_{j_1}$ , вытекает, что  $j_1 < j'$ . Кроме того, если  $\bar{r} \in \Omega_1$  таково, что  $\sigma'(\bar{r}) = \sigma(\bar{r}) = \bar{r} + \bar{e}_{j_2}$ , то  $j_2 < j'$ . В противном случае  $\sigma(\bar{r}) = \sigma'(\bar{r})$  и поскольку  $\sigma'$  – биекция, имеем  $\bar{k}' = \bar{r}$  и  $\sigma'(\bar{k}') = \sigma(\bar{k}')$ , что противоречит выбору элемента  $\bar{k}' \in \Omega_1$ . Воспользуемся тем, что  $\bar{e}_{j'} \prec \bar{e}_{j_1}$  и  $\bar{e}_{j'} \prec \bar{e}_{j_2}$ :

$$\bar{k}' + \bar{e}_{j'} \prec \bar{k}' + \bar{e}_{j_1} = \sigma(\bar{k}');$$

$$\sigma^{-1}(\bar{k} + \bar{e}_{j'}) = \sigma^{-1}(\sigma'(\bar{k}')) = \bar{r} = \sigma'(\bar{k}') - \bar{e}_{j_2} = \bar{k}' + \bar{e}_{j'} - \bar{e}_{j_2} \prec \bar{k}',$$

а это противоречит условию 3), справедливому для пары  $(\Omega_1, \sigma)$  при  $\bar{k} = \bar{k}'$ . Полученное противоречие доказывает, что  $\sigma'(\bar{k}) = \sigma(\bar{k})$  для всех  $\bar{k} \in \Omega_1$ .

Пусть

$$\tilde{\theta} = \max_{(\Omega_1, \sigma)} \{\text{Card } \Omega_1\},$$

где максимум берется по всевозможным парам  $(\Omega_1, \sigma)$ ,  $\Omega_1 \subset \tilde{\Omega}$ , удовлетворяющим условиям 1)–3). Среди всех таких пар  $(\Omega_1, \sigma)$ ,  $\text{Card } \Omega_1 = \tilde{\theta}$ , выберем ту, для которой величина

$$\sum_{\bar{\kappa} \in \Omega_1} (\sigma(\bar{\kappa}) - \bar{\kappa})$$

минимальна (в смысле лексикографического порядка), и зафиксируем ее. Для выбранной таким образом пары  $(\Omega_1, \sigma)$  положим  $\Theta_1 = \sigma(\Omega_1)$ ,  $\Omega_2 = \tilde{\Omega} \setminus \Omega_1$ .

**ЛЕММА 2.6.** *Справедливо следующее вложение:*

$$\bigcup_{j=1}^m (\Omega_2 + \bar{e}_j) \subset \Theta_1.$$

(Здесь мы полагаем  $\Omega_2 + \bar{e}_j = \{\bar{\kappa} + \bar{e}_j : \bar{\kappa} \in \Omega_2\}$ ,  $j = 1, \dots, m$ .)

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Прежде всего докажем, что  $\Omega_2 \cap \Theta = \emptyset$ , точнее, что если  $\bar{\kappa} \in \tilde{\Omega} \cap \Theta$ , то  $\bar{\kappa} \in \Omega_1$ . Если это не выполнено, т.е. некоторый элемент  $\bar{\kappa}^* \in \tilde{\Omega} \cap \Theta$  не лежит в  $\Omega_1$ , то существует пара  $(\Omega_1^*, \sigma^*)$ , где  $\Omega_1^* = \Omega_1 \cup \{\bar{\kappa}^*\}$ ,

$$\sigma^*(\bar{\kappa}) = \begin{cases} \sigma(\bar{\kappa}), & \text{если } \bar{\kappa} \in \Omega_1; \\ \bar{\kappa}^*, & \text{если } \bar{\kappa} = \bar{\kappa}^*, \end{cases}$$

удовлетворяющая условиям 1)–3), но  $\text{Card } \Omega_1^* > \text{Card } \Omega_1$ . Это противоречит выбору пары  $(\Omega_1, \sigma)$ . Поэтому  $\Omega_2 \cap \Theta = \emptyset$  и, значит,

$$\bigcup_{j=1}^m (\Omega_2 + \bar{e}_j) \subset \Theta.$$

Предположим теперь существование  $j$ ,  $1 \leq j \leq m$ , такого, что  $\Omega_2 + \bar{e}_j \not\subset \Theta_1$ , и среди всех таких  $j$  выберем максимальное  $j^*$ . Это означает, что для некоторого  $\bar{\kappa}^* \in \Omega_2$  выполнено  $\bar{\kappa}^* + \bar{e}_{j^*} \not\subset \Theta_1$ . Кроме того,  $\bar{\kappa}^* + \bar{e}_j \in \Theta_1 = \sigma(\Omega_1)$  для всех  $j$ ,  $j^* < j \leq m$ , т.е. для таких  $j$ , что  $\bar{\kappa}^* + \bar{e}_j \prec \bar{\kappa}^* + \bar{e}_{j^*}$ . Покажем, что  $\sigma^{-1}(\bar{\kappa}^* + \bar{e}_j) \succ \bar{\kappa}^*$  для всех таких  $j$ .

Если это не так, то выберем максимальное  $j$  такое, что  $\bar{\kappa}^* + \bar{e}_j \prec \bar{\kappa}^* + \bar{e}_{j^*}$  и  $\bar{\kappa}' = \sigma^{-1}(\bar{\kappa}^* + \bar{e}_j) \prec \bar{\kappa}^*$ . Если  $\sigma(\bar{\kappa}') = \bar{\kappa}' + \bar{e}_{j'}$ , то

$$\bar{\kappa}^* + \bar{e}_j - \bar{e}_{j'} = \bar{\kappa}' = \sigma^{-1}(\bar{\kappa}^* + \bar{e}_j) \prec \bar{\kappa}^*,$$

откуда  $\bar{e}_j \prec \bar{e}_{j'}$ . Рассмотрим пару  $(\Omega_1^*, \sigma^*)$ , где  $\Omega_1^* = (\Omega_1 \setminus \{\bar{\kappa}'\}) \cup \{\bar{\kappa}^*\}$  и

$$\sigma^*(\bar{\kappa}) = \begin{cases} \sigma(\bar{\kappa}), & \text{если } \bar{\kappa} \in \Omega_1 \setminus \{\bar{\kappa}'\} = \Omega_1^* \setminus \{\bar{\kappa}^*\}; \\ \bar{\kappa}^* + \bar{e}_j = \sigma(\bar{\kappa}'), & \text{если } \bar{\kappa} = \bar{\kappa}^*. \end{cases}$$

Для нее, очевидно, справедливы условия 1), 2). В силу выбора  $j$  условие 3) выполнено при  $\bar{\kappa}^* \in \Omega_1^*$ . Поскольку  $\sigma(\Omega_1) = \sigma^*(\Omega_1^*)$  и

$$(\sigma^*)^{-1}(\bar{\kappa}^* + \bar{e}_j) = \bar{\kappa}^* \succ \bar{\kappa}' = \sigma^{-1}(\bar{\kappa}^* + \bar{e}_j) = \sigma^{-1}(\bar{\kappa}' + \bar{e}_{j'}),$$

то условие 3) справедливо и при любом  $\bar{\kappa} \in \Omega_1^* \setminus \{\bar{\kappa}^*\} = \Omega_1 \setminus \{\bar{\kappa}'\}$ . Итак, пара  $(\Omega_1^*, \sigma^*)$  удовлетворяет условиям 1)–3) и

$$\begin{aligned} \sum_{\bar{\kappa} \in \Omega_1^*} (\sigma^*(\bar{\kappa}) - \bar{\kappa}) &= \sum_{\bar{\kappa} \in \Omega_1^* \setminus \{\bar{\kappa}^*\}} (\sigma^*(\bar{\kappa}) - \bar{\kappa}) + (\sigma^*(\bar{\kappa}^*) - \bar{\kappa}^*) \\ &= \sum_{\bar{\kappa} \in \Omega_1 \setminus \{\bar{\kappa}'\}} (\sigma(\bar{\kappa}) - \bar{\kappa}) + \bar{e}_j \\ &\prec \sum_{\bar{\kappa} \in \Omega_1 \setminus \{\bar{\kappa}'\}} (\sigma(\bar{\kappa}) - \bar{\kappa}) + \bar{e}_{j'} \\ &= \sum_{\bar{\kappa} \in \Omega_1} (\sigma(\bar{\kappa}) - \bar{\kappa}), \end{aligned}$$

а это противоречит выбору пары  $(\Omega_1, \sigma)$ .

Таким образом, мы получили, что  $\bar{\kappa}^* \notin \Omega_1$ ,  $\bar{\kappa}^* + \bar{e}_{j^*} \notin \sigma(\Omega_1)$  и если  $\bar{\kappa}^* + \bar{e}_j \prec \bar{\kappa}^* + \bar{e}_{j^*}$ , то  $\bar{\kappa}^* + \bar{e}_j \in \sigma(\Omega_1)$  и  $\sigma^{-1}(\bar{\kappa}^* + \bar{e}_j) \succ \bar{\kappa}^*$ . Поэтому пара  $(\Omega_1^*, \sigma^*)$ , где  $\Omega_1^* = \Omega_1 \cup \{\bar{\kappa}^*\}$ ,

$$\sigma^*(\bar{\kappa}) = \begin{cases} \sigma(\bar{\kappa}), & \text{если } \bar{\kappa} \in \Omega_1; \\ \bar{\kappa}^* + \bar{e}_{j^*}, & \text{если } \bar{\kappa} = \bar{\kappa}^*, \end{cases}$$

удовлетворяет условиям 1)–3), в то время как  $\text{Card } \Omega_1^* > \text{Card } \Omega_1$ . Это противоречит выбору пары  $(\Omega_1, \sigma)$ . Следовательно,  $\Omega_2 + \bar{e}_j \subset \Theta_1$  для всех  $j$ ,  $1 \leq j \leq t$ , что и требовалось доказать.

*ЛЕММА 2.7. Для произвольных множеств  $A$ ,  $B$  и любого вещественного  $\beta$ ,  $0 < \beta < 1$ , имеет место неравенство*

$$\text{Card}(A \cup B) \geq \beta \text{Card } A + (1 - \beta) \text{Card } B;$$

*оно превращается в равенство тогда и только тогда, когда множества  $A$  и  $B$  совпадают.*

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Если умножить первое из очевидных неравенств

$$\text{Card}(A \cup B) \geq \text{Card } A, \quad \text{Card}(A \cup B) \geq \text{Card } B, \quad (2.10)$$

на  $\beta$ , а второе – на  $(1 - \beta)$  и сложить, то получим требуемое неравенство. Неравенства (2.10) превращаются в равенства только в случае  $A \cup B = A$  и  $A \cup B = B$ .

ЛЕММА 2.8. Для натуральных чисел  $m \geq 1$ ,  $N \geq 1$  пусть  $\Omega_2$  – произвольное подмножество  $\{\bar{\kappa} : \kappa_1 + \dots + \kappa_m = N - 1\}$  и

$$\Theta_2 = \bigcup_{j=1}^m (\Omega_2 + \bar{e}_j) \subset \{\bar{\kappa} : \kappa_1 + \dots + \kappa_m = N\}.$$

Тогда

$$\text{Card } \Theta_2 \geq \frac{N + m - 1}{N} \text{Card } \Omega_2, \quad (2.11)$$

причем равенство имеет место лишь в одном из трех случаев:  $m = 1$ ,  $\Omega_2 = \emptyset$  или  $\Omega_2 = \{\bar{\kappa} : \kappa_1 + \dots + \kappa_m = N - 1\}$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В случае  $m = 1$  имеем очевидное равенство  $\text{Card } \Theta_2 = \text{Card } \Omega_2$ . Поэтому пусть  $m \geq 2$  и для  $m - 1$  утверждение леммы доказано. Разобьем множество  $\Omega_2$  (даже если оно пустое) на непересекающиеся подмножества

$$\Omega_2^{(\nu)} = \{\bar{\kappa} \in \Omega_2 : \kappa_1 + \dots + \kappa_{m-1} = \nu\}, \quad \nu = 0, 1, \dots, N - 1, \quad (2.12)$$

и положим

$$\Theta_2^{(\nu)} = \bigcup_{j=1}^{m-1} (\Omega_2^{(\nu)} + \bar{e}_j), \quad \nu = 0, 1, \dots, N - 1. \quad (2.13)$$

Тогда

$$\begin{aligned} \Theta_2 &= \bigcup_{j=1}^m (\Omega_2 + \bar{e}_j) = \bigcup_{j=1}^m \bigcup_{\nu=0}^{N-1} (\Omega_2^{(\nu)} + \bar{e}_j) = \bigcup_{\nu=0}^{N-1} (\Theta_2^{(\nu)} \cup (\Omega_2^{(\nu)} + \bar{e}_m)) \\ &= [\Omega_2^{(0)} + \bar{e}_m] \cup \bigcup_{\nu=1}^{N-1} [\Theta_2^{(\nu-1)} \cup (\Omega_2^{(\nu)} + \bar{e}_m)] \cup [\Theta_2^{(N-1)}]. \end{aligned}$$

Множества в квадратных скобках не пересекаются, так как каждое из них характеризуется своей суммой первых  $m - 1$  координат входящих мультииндексов. Поэтому

$$\text{Card } \Theta_2 = \text{Card } \Omega_2^{(0)} + \sum_{\nu=1}^{N-1} \text{Card}(\Theta_2^{(\nu-1)} \cup (\Omega_2^{(\nu)} + \bar{e}_m)) + \text{Card } \Theta_2^{(N-1)}. \quad (2.14)$$

Согласно лемме 2.7 имеем:

$$\text{Card}(\Theta_2^{(\nu-1)} \cup (\Omega_2^{(\nu)} + \bar{e}_m)) \geq \frac{\nu}{N} \text{Card } \Theta_2^{(\nu-1)} + \frac{N-\nu}{N} \text{Card } \Omega_2^{(\nu)}, \quad \nu = 0, 1, \dots, N-1, \quad (2.15)$$

что дает возможность переписать (2.14) в виде

$$\begin{aligned} \text{Card } \Theta_2 &\geq \text{Card } \Omega_2^{(0)} + \sum_{\nu=1}^{N-1} \left( \frac{\nu}{N} \text{Card } \Theta_2^{(\nu-1)} + \frac{N-\nu}{N} \text{Card } \Omega_2^{(\nu)} \right) \\ &\quad + \text{Card } \Theta_2^{(N-1)} \\ &= \sum_{\nu=0}^{N-1} \left( \frac{\nu+1}{N} \text{Card } \Theta_2^{(\nu)} + \frac{N-\nu}{N} \text{Card } \Omega_2^{(\nu)} \right). \end{aligned} \quad (2.16)$$

Осталось воспользоваться индукционным предположением для множеств (2.12)–(2.13):

$$\text{Card } \Theta_2^{(\nu)} \geq \frac{\nu+m-1}{\nu+1} \text{Card } \Omega_2^{(\nu)}, \quad \nu = 0, 1, \dots, N-1,$$

и неравенство (2.16) примет требуемый вид:

$$\begin{aligned} \text{Card } \Theta_2 &\geq \sum_{\nu=0}^{N-1} \left( \frac{\nu+1}{N} \cdot \frac{\nu+m-1}{\nu+1} \text{Card } \Omega_2^{(\nu)} + \frac{N-\nu}{N} \text{Card } \Omega_2^{(\nu)} \right) \\ &= \frac{N+m-1}{N} \sum_{\nu=0}^{N-1} \text{Card } \Omega_2^{(\nu)} = \frac{N+m-1}{N} \text{Card } \Omega_2. \end{aligned}$$

Это неравенство становится равенством, если каждое из неравенств (2.15) превращается в равенство, т.е. если

$$\Omega_2^{(\nu)} + \bar{e}_m = \Theta_2^{(\nu-1)} = \bigcup_{j=1}^{m-1} (\Omega_2^{(\nu-1)} + \bar{e}_j), \quad \nu = 1, \dots, N-1. \quad (2.17)$$

Если  $\Omega_2^{(0)} \neq \emptyset$ , т.е.  $\Omega_2^{(0)} = \{(0, \dots, 0, N-1)\}$ , то индукцией по  $\nu = 1, \dots, N-1$  с помощью (2.17) легко устанавливаем равенство  $\Omega_2^{(\nu)} = \{\bar{\kappa} : \kappa_1 + \dots + \kappa_{m-1} = \nu\}$ . Если же  $\Omega_2^{(0)} = \emptyset$ , то индукцией по  $\nu = 1, \dots, N-1$  с помощью (2.17) устанавливаем, что  $\Omega_2^{(\nu)} = \emptyset$ . Поэтому (2.11) становится при  $m \geq 2$  равенством только в случае, когда  $\Omega_2$ , являющееся объединением множеств (2.12), либо совпадает с  $\{\bar{\kappa} : \kappa_1 + \dots + \kappa_m = N-1\}$  либо пусто.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2.1.** Выберем множество  $\Omega_1 \subset \tilde{\Omega}$  и отображение  $\sigma : \Omega_1 \rightarrow \Theta$ , как это было проделано перед леммой 2.6, и положим

$$\Theta_1 = \sigma(\Omega_1), \quad \Omega_2 = \tilde{\Omega} \setminus \Omega_1, \quad \Theta_2 = \bigcup_{j=1}^m (\Omega_2 + \bar{e}_j).$$

Поскольку  $\sigma : \Omega_1 \rightarrow \Theta_1$  – единственное биективное отображение множества  $\Omega_1$  во множество  $\Theta_1$ , то  $\det(x_{\bar{\kappa}, \bar{s}})_{\bar{\kappa} \in \Omega_1; \bar{s} \in \Theta_1} \neq 0$ , откуда и из леммы 2.3  $\det(\tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{s}})_{\bar{\kappa} \in \Omega_1; \bar{s} \in \Theta_1} \neq 0$ .

Если  $\Omega_2 = \emptyset$  или  $\Omega_1 = \tilde{\Omega}$ , то

$$\frac{\tilde{\omega}}{\tilde{\theta}} = \frac{\text{Card } \tilde{\Omega}}{\text{Card } \Theta_1} = \frac{\text{Card } \Omega_1}{\text{Card } \Theta_1} = 1 < 1 + \frac{N}{N+m-1}.$$

Если же  $\Omega_2 \neq \emptyset$ , то  $\Theta_2 \neq \emptyset$ , и значит,  $\text{Card } \Theta_2 > 0$ . В силу леммы 2.6 имеем  $\Theta_2 \subset \Theta_1$ , откуда  $\text{Card } \Theta_2 \leq \text{Card } \Theta_1$ . Согласно лемме 2.8 получаем:

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{\omega}}{\tilde{\theta}} &= \frac{\text{Card } \tilde{\Omega}}{\text{Card } \Theta_1} = \frac{\text{Card } \Omega_1 + \text{Card } \tilde{\Omega} \setminus \Omega_1}{\text{Card } \Theta_1} = \frac{\text{Card } \Omega_1}{\text{Card } \Theta_1} + \frac{\text{Card } \tilde{\Omega} \setminus \Omega_1}{\text{Card } \Theta_1} \\ &= 1 + \frac{\text{Card } \Omega_2}{\text{Card } \Theta_1} \leq 1 + \frac{\text{Card } \Omega_2}{\text{Card } \Theta_2} \leq 1 + \frac{N}{N + m - 1}, \end{aligned}$$

причем

$$\frac{\tilde{\omega}}{\tilde{\theta}} = 1 + \frac{N}{N + m - 1} = \frac{\omega}{\theta}$$

только в случае  $\tilde{\Omega} \setminus \Omega_1 = \Omega_2 = \{\bar{k} : |\bar{k}| = N - 1\}$ , т.е.  $\Omega_1 = \Theta_1 = \Theta_2 = \Theta$  или  $\tilde{\Omega} = \Omega = \{\bar{k} : |\bar{k}| \in \{N - 1, N\}\}$ .

Таким образом, если  $\tilde{\Omega} \neq \Omega$ , то

$$\frac{\tilde{\omega}}{\tilde{\theta}} < 1 + \frac{N}{N + m - 1} = \frac{2N + m - 1}{N + m - 1} = \frac{\omega}{\theta}.$$

Последнее означает, что  $(2N + m - 1)\tilde{\theta} - (N + m - 1)\tilde{\omega} \geq 1$ , и поскольку  $\tilde{\theta} \leq \text{Card } \Theta = \theta$ , имеем:

$$\frac{\omega}{\theta} - \frac{\tilde{\omega}}{\tilde{\theta}} = \frac{(2N + m - 1)\tilde{\theta} - (N + m - 1)\tilde{\omega}}{(N + m - 1)\tilde{\theta}} \geq \frac{1}{(N + m - 1)\theta}.$$

Предложение 2.1 доказано полностью.

## §3. Доказательство теоремы 1

Пусть  $a_1, \dots, a_m$  – произвольное решение системы (0.10);  $y_1, \dots, y_m$  – произвольное решение системы (0.5). Тогда набор функций

$$x_{\bar{\kappa}} = \bar{a}^{\bar{\kappa}}(1 + a_1 y_1 + \dots + a_m y_m)^{N - |\bar{\kappa}|}, \quad \bar{\kappa} \in \Omega,$$

удовлетворяет системе линейных однородных дифференциальных уравнений

$$\frac{d}{dz} x_{\bar{\kappa}} = - \sum_{l,j=1}^m \kappa_j Q_{lj} x_{\bar{\kappa} - \bar{e}_j + \bar{e}_l} + (N - |\bar{\kappa}|) \sum_{l=1}^m Q_{l0} x_{\bar{\kappa} + \bar{e}_l}, \quad \bar{\kappa} \in \Omega, \quad (3.1)$$

порядка  $\omega$ . Через  $\beta \in \mathbb{C}$  обозначим точку, отличную от полюсов рациональных функций  $Q_{lj}$ ,  $l = 1, \dots, m$ ,  $j = 0, 1, \dots, m$  (поскольку  $Q_{lj} \in \mathbb{Q}(z)$ ,  $l = 1, \dots, m$ ,  $j = 0, 1, \dots, m$ , в качестве  $\beta$  можно взять любое трансцендентное число, например,  $\beta = e$ ). Согласно теореме существования для дифференциальных уравнений найдется фундаментальная матрица решений  $(\varphi_{lj})_{l,j=1,\dots,m}$  однородной системы (0.10) и частное решение  $(\gamma_l)_{l=1,\dots,m}$  неоднородной системы (0.5) такие, что

$$\varphi_{lj}|_{z=\beta} = \delta_{lj}, \quad \gamma_l|_{z=\beta} = 1, \quad l, j = 1, \dots, m.$$

Положим, кроме того,

$$\psi_j = \sum_{l=1}^m \varphi_{lj} \gamma_l, \quad j = 1, \dots, m.$$

Тогда

$$\psi_j|_{z=\beta} = \sum_{l=1}^m \varphi_{lj}|_{z=\beta} \cdot \gamma_l|_{z=\beta} = 1, \quad j = 1, \dots, m.$$

**ЛЕММА 3.1.** *Элементы произвольной фундаментальной матрицы решений системы (3.1) являются многочленами от*

$$\varphi_{lj}, \psi_j, \quad l, j = 1, \dots, m, \quad (3.2)$$

*степени не выше  $N$  с коэффициентами из  $\mathbb{C}$ .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО достаточно провести для одной фундаментальной матрицы решений, так как любая другая выражается через нее умножением на матрицу с элементами из  $\mathbb{C}$ .

Общее решение  $\bar{a} = (a_1, \dots, a_m)$  системы (0.10) может быть представлено в виде

$$a_l = \rho_1 \varphi_{l1} + \dots + \rho_m \varphi_{lm}, \quad l = 1, \dots, m,$$

где  $\rho_1, \dots, \rho_m$  – произвольные числа из  $\mathbb{C}$ . Тогда

$$a_1 \gamma_1 + \dots + a_m \gamma_m = \sum_{l,j=1}^m \rho_j \varphi_{lj} \gamma_l = \rho_1 \psi_1 + \dots + \rho_m \psi_m$$

и набор функций

$$\begin{aligned} \bar{a}^{\bar{\kappa}} (1 + a_1 \gamma_1 + \dots + a_m \gamma_m)^{N-|\bar{\kappa}|} &= \prod_{l=1}^m (\rho_1 \varphi_{l1} + \dots + \rho_m \varphi_{lm})^{\kappa_l} \\ &\quad \times (1 + \rho_1 \psi_1 + \dots + \rho_m \psi_m)^{N-|\bar{\kappa}|} \\ &= \sum_{\bar{r} \in \Omega} \bar{\rho}^{\bar{r}} u_{\bar{\kappa}, \bar{r}}, \quad \bar{\kappa} \in \Omega, \end{aligned}$$

при любых значениях  $\rho_1, \dots, \rho_m$  составляет решение системы (3.1). Это означает, что для каждого  $\bar{r} \in \Omega$  вектор  $(u_{\bar{\kappa}, \bar{r}})_{\bar{\kappa} \in \Omega}$  размерности  $\omega$  удовлетворяет системе (3.1). Тем самым мы получили  $\omega$  решений этой системы.

Покажем, что  $\det(u_{\bar{\kappa}, \bar{r}})_{\bar{\kappa}, \bar{r} \in \Omega} \neq 0$ . Для этого посчитаем значение этого определителя в точке  $z = \beta$ . Имеем:

$$\begin{aligned} \sum_{\bar{r} \in \Omega} \bar{\rho}^{\bar{r}} u_{\bar{\kappa}, \bar{r}} \Big|_{z=\beta} &= \prod_{l=1}^m (\rho_1 \varphi_{l1} \Big|_{z=\beta} + \dots + \rho_m \varphi_{lm} \Big|_{z=\beta})^{\kappa_l} \\ &\quad \times (1 + \rho_1 \psi_1 \Big|_{z=\beta} + \dots + \rho_m \psi_m \Big|_{z=\beta})^{N-|\bar{\kappa}|} \\ &= \bar{\rho}^{\bar{\kappa}} (1 + \rho_1 + \dots + \rho_m)^{N-|\bar{\kappa}|}, \quad \bar{\kappa} \in \Omega. \end{aligned}$$

Поэтому для всех  $\bar{r} \prec \bar{k}$  выполнено  $u_{\bar{k}, \bar{r}}|_{z=\beta} = 0$ , а кроме того, имеем  $u_{\bar{k}, \bar{k}}|_{z=\beta} = 1$ ,  $\bar{k} \in \Omega$ . Таким образом, числовая матрица  $(u_{\bar{k}, \bar{r}}|_{z=\beta})_{\bar{k}, \bar{r} \in \Omega}$  имеет треугольный вид, причем на ее диагонали стоят единицы. Следовательно, ее определитель  $\det(u_{\bar{k}, \bar{r}}|_{z=\beta})_{\bar{k}, \bar{r} \in \Omega} = 1$ . Но отсюда вытекает, что матрица  $(u_{\bar{k}, \bar{r}})_{\bar{k}, \bar{r} \in \Omega}$  является фундаментальной матрицей решений системы (3.1). Ее элементы  $u_{\bar{k}, \bar{r}}$ ,  $\bar{k}, \bar{r} \in \Omega$ , являются многочленами от функций (3.2) степени не выше  $N$  с коэффициентами из  $\mathbb{C}$ . Лемма доказана.

**ЛЕММА 3.2.** Пусть  $\varphi_1(z), \dots, \varphi_W(z)$  – совокупность функций, аналитических в некоторой области; функции  $\lambda_0(z) \not\equiv 0, \lambda_1(z), \dots, \lambda_L(z)$  являются многочленами от  $\varphi_1, \dots, \varphi_W$  степени не выше  $n$  с коэффициентами из  $\mathbb{C}$ , причем

$$D_l(z) = \frac{\lambda_l(z)}{\lambda_0(z)} \in \mathbb{C}(z), \quad l = 1, \dots, L. \quad (3.3)$$

Тогда для рациональных функций (3.3) справедливо представление

$$D_l(z) = \frac{B_l(z)}{B_0(z)}, \quad l = 1, \dots, L;$$

$$B_l \in \mathbb{C}[z], \quad \deg B_l \leq C_5 n, \quad l = 0, 1, \dots, L,$$

где постоянная  $C_5$  зависит только от функций  $\varphi_1, \dots, \varphi_W$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Рассмотрим кольцо  $\mathbb{C}(z)[\varphi_1, \dots, \varphi_W]$  и выберем в нем максимальное количество алгебраически независимых над  $\mathbb{C}(z)$  элементов  $\xi_1, \dots, \xi_w$  и обозначим буквой  $d$  степень алгебраического расширения  $\mathbb{C}(z, \varphi_1, \dots, \varphi_W) \supset \mathbb{C}(z, \xi_1, \dots, \xi_w)$ . Через  $\mu_1, \dots, \mu_d$  обозначим базис поля  $\mathbb{C}(z, \varphi_1, \dots, \varphi_W)$  над  $\mathbb{C}(z, \xi_1, \dots, \xi_w)$ . Повторяя рассуждения работы [9, с. 274–275], представим функции  $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_L$  в

виде

$$\lambda_l = \frac{\sum_{i=1}^d b_{li}\mu_i}{a^n}, \quad l = 0, 1, \dots, L,$$

$$b_{li} \in \mathbb{C}[z, \xi_1, \dots, \xi_w], \quad \deg_z b_{li} \leq C_5 n, \quad i = 1, \dots, d, \quad l = 0, 1, \dots, L,$$

где многочлен  $a \in \mathbb{C}[z, \xi_1, \dots, \xi_w]$  и постоянная  $C_5$  зависят только от функций  $\varphi_1, \dots, \varphi_W$ . Тогда

$$D_l = \frac{a^n \lambda_l}{a^n \lambda_0} = \frac{\sum_{i=1}^d b_{li}\mu_i}{\sum_{i=1}^d b_{0i}\mu_i}, \quad l = 1, \dots, L,$$

откуда

$$\sum_{i=1}^d \mu_i (D_l b_{0i} - b_{li}) = 0, \quad l = 1, \dots, L,$$

или

$$D_l b_{0i} - b_{li} = 0, \quad i = 1, \dots, d, \quad l = 1, \dots, L,$$

ввиду линейной независимости  $\mu_1, \dots, \mu_d$  над  $\mathbb{C}(z, \xi_1, \dots, \xi_w)$ . Поскольку  $\lambda_0 \neq 0$ , для некоторого  $i$ ,  $1 \leq i \leq d$ , выполнено  $b_{0i} \neq 0$ . Не ограничивая общности можно считать, что  $b_{01} \neq 0$ . Как вытекает из последнего равенства,

$$D_l = \frac{b_{l1}}{b_{01}}, \quad l = 1, \dots, L.$$

Многочлены  $b_{l1}$ ,  $l = 0, 1, \dots, L$ , являются линейными комбинациями произведений степеней  $\xi_1, \dots, \xi_w$  с коэффициентами из  $\mathbb{C}[z]$  и, поскольку

$\xi_1, \dots, \xi_w$  алгебраически независимы над  $\mathbb{C}(z)$ , а  $D_1, \dots, D_L \in \mathbb{C}(z)$ , функции (3.3) запишутся в требуемом виде

$$D_l = \frac{B_l}{B_0}, \quad l = 1, \dots, L,$$

где  $B_l \in \mathbb{C}[z]$  – некоторые коэффициенты многочленов  $b_{l1}, l = 0, 1, \dots, L$ , и значит,

$$\deg B_l \leq \deg_z b_{l1} \leq C_5 n, \quad l = 0, 1, \dots, L,$$

что завершает доказательство леммы.

**ЛЕММА 3.3. *Определитель***

$$\det \left( P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) \right)_{n=0,1,\dots,\omega-1; \bar{\kappa} \in \Omega} \quad (3.4)$$

*отличен от нуля.*

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Предположим, что определитель (3.4) тождественно равен нулю, и значит, ранг совокупности форм  $R^{[0]}(z; \bar{a}), R^{[1]}(z; \bar{a}), R^{[2]}(z; \bar{a}), \dots$  равен  $\tilde{\omega}$ , где  $\tilde{\omega} < \omega$ . Так как  $R^{[0]}(z; \bar{a}) \neq 0$ , то  $\tilde{\omega} \geq 1$ . По лемме 6 [20, гл. 3] функциональные формы

$$R^{[n]}(z; \bar{a}) = \sum_{\bar{\kappa}: |\bar{\kappa}|=N} \bar{a}^{\bar{\kappa}} P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) + \sum_{\bar{\kappa}: |\bar{\kappa}|=N-1} \bar{a}^{\bar{\kappa}} P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) \sum_{j=1}^m a_j f_j(z),$$

$$n = 0, 1, \dots, \tilde{\omega} - 1,$$

линейно независимы. Поэтому ранг матрицы

$$\left( P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) \right)_{n=0,1,\dots,\tilde{\omega}-1; \bar{\kappa} \in \Omega}$$

равен  $\tilde{\omega}$ , и в ней можно выбрать  $\tilde{\omega}$  линейно независимых столбцов. Будем делать такой выбор “слева направо”, т.е. столбец с номером  $\bar{k} \in \Omega$  выбирается в том и только том случае, когда он линейно не выражается через столбцы с номерами, меньшими  $\bar{k}$ . Тогда базисные столбцы будут иметь номера из некоторого множества  $\tilde{\Omega} \subset \Omega$ , причем с некоторыми рациональными функциями (2.3) будут справедливы равенства

$$P_{\bar{k}'}^{[n]}(z) = \sum_{\bar{k} \in \tilde{\Omega}} P_{\bar{k}}^{[n]}(z) D_{\bar{k}, \bar{k}'}(z) = \sum_{\substack{\bar{k} \in \tilde{\Omega} \\ \bar{k} \prec \bar{k}'}} P_{\bar{k}}^{[n]}(z) D_{\bar{k}, \bar{k}'}(z),$$

$$n = 0, 1, \dots, \tilde{\omega} - 1, \quad \bar{k}' \in \Omega \setminus \tilde{\Omega}.$$

Таким образом,

$$\Delta = \Delta(z) = \det(P_{\bar{k}}^{[n]}(z))_{n=0,1,\dots,\tilde{\omega}-1; \bar{k} \in \tilde{\Omega}} \neq 0,$$

и согласно оценке (1.6) находим, что

$$\deg \Delta < \tilde{\omega} M + \frac{\tilde{\omega}(\tilde{\omega} - 1)}{2} t < \tilde{\omega} M + \omega^2 t.$$

Для произвольного решения  $a_1, \dots, a_m$  системы (0.10) набор функций

$$x_{\bar{k}} = \begin{cases} \bar{a}^{\bar{k}}, & \text{если } |\bar{k}| = N; \\ \bar{a}^{\bar{k}}(a_1 f_1 + \dots + a_m f_m), & \text{если } |\bar{k}| = N - 1, \end{cases}$$

составляет решение системы линейных однородных дифференциальных уравнений (3.1) порядка  $\omega$ . В доказательстве леммы 8 [20, гл.3,

с. 102–103] рациональные функции  $D_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'}$ ,  $\bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}$ ,  $\bar{\kappa}' \in \Omega \setminus \tilde{\Omega}$ , были представлены в виде

$$D_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'} = -\frac{\lambda_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'}}{\lambda}, \quad \lambda \neq 0, \quad \bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}, \quad \bar{\kappa}' \in \Omega \setminus \tilde{\Omega}, \quad (3.5)$$

где  $\lambda$  и  $\lambda_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'}$  – миноры порядка  $(\omega - \tilde{\omega})$  некоторой фундаментальной матрицы решений системы (3.1). По лемме 3.1 элементы этой фундаментальной матрицы решений есть многочлены от функций (3.2) степени не выше  $N$  с коэффициентами из  $\mathbb{C}$ . Поэтому миноры  $\lambda$ ,  $\lambda_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'}$ ,  $\bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}$ ,  $\bar{\kappa}' \in \Omega \setminus \tilde{\Omega}$ , порядка  $(\omega - \tilde{\omega})$  являются многочленами от функций (3.2) степени не выше  $(\omega - \tilde{\omega})N \leq \omega N$  с коэффициентами из  $\mathbb{C}$ . Как следует из леммы 3.2, для рациональных функций (3.5) существует представление

$$D_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'}(z) = \frac{B_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'}(z)}{B(z)}, \quad B, B_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'} \in \mathbb{C}[z], \quad B \neq 0, \quad (3.6)$$

$$\deg B \leq C_5 \omega N, \quad \deg B_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'} \leq C_5 \omega N, \quad \bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}, \quad \bar{\kappa}' \in \Omega \setminus \tilde{\Omega},$$

где постоянная  $C_5$  зависит только от совокупности функций (3.2), которые, в свою очередь, однозначно определяются системой (0.5) (точка  $\beta$  не зависит ни от чего). Но из леммы 3 [20, гл. 3] следует, что система (0.5) полностью задается набором линейно независимых над  $\mathbb{C}(z)$  функций  $1, f_1(z), \dots, f_m(z)$ . Поэтому  $C_5 = C_5(f_1, \dots, f_m)$ .

Для произвольного многочлена  $v \in \mathbb{C}(z)[y_1, \dots, y_m]$  через  $v(\bar{f})$  обозначим результат подстановки в него функций  $f_1(z), \dots, f_m(z)$  вместо переменных  $y_1, \dots, y_m$  соответственно. Тогда подобно (0.20)

$$R_{\bar{s}}^{[n]}(z) = \sum_{\bar{\kappa} \in \Omega} P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) x_{\bar{\kappa}, \bar{s}}(\bar{f}), \quad n = 0, 1, \dots, \tilde{\omega} - 1, \quad \bar{s} \in \Theta,$$

и

$$\begin{aligned}
R_{\bar{s}}^{[n]}(z) &= \sum_{\bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}} P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) x_{\bar{\kappa}, \bar{s}}(\bar{f}) + \sum_{\bar{\kappa}' \in \Omega \setminus \tilde{\Omega}} P_{\bar{\kappa}'}^{[n]}(z) x_{\bar{\kappa}', \bar{s}}(\bar{f}) \\
&= \sum_{\bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}} P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) \left( x_{\bar{\kappa}, \bar{s}}(\bar{f}) + \sum_{\bar{\kappa}' \in \Omega \setminus \tilde{\Omega}} D_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'}(z) x_{\bar{\kappa}', \bar{s}}(\bar{f}) \right) \\
&= \sum_{\bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}} P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) \tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{s}}(\bar{f}), \quad n = 0, 1, \dots, \tilde{\omega} - 1, \quad \bar{s} \in \Theta, \quad (3.7)
\end{aligned}$$

где многочлены  $x_{\bar{\kappa}, \bar{s}} \in \mathbb{C}[y_1, \dots, y_m]$ ,  $\bar{\kappa} \in \Omega$ ,  $\tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{s}} \in \mathbb{C}(z)[y_1, \dots, y_m]$ ,  $\bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}$ ,  $\bar{s} \in \Theta$ , определяются согласно формулам (2.2) и (2.5).

Выберем по заданному множеству  $\tilde{\Omega} \subset \Omega$  в соответствии с предложением 2.1 множества  $\Omega_1 \subset \tilde{\Omega}$  и  $\Theta_1 \subset \Theta$ ,  $\text{Card } \Omega_1 = \text{Card } \Theta_1 = \tilde{\theta}$ . Тогда определитель  $\chi = \chi(z)$  матрицы

$$\left( B(z) \tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{s}}(\bar{f}) \mid \delta_{\bar{\kappa}, \bar{r}} \right)_{\substack{\bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}; \bar{s} \in \Theta_1, \\ \bar{r} \in \tilde{\Omega} \setminus \Omega_1}}, \quad (3.8)$$

с точностью до знака равный

$$B^{\tilde{\theta}} \cdot \det \left( \tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{s}}(\bar{f}) \right)_{\substack{\bar{\kappa} \in \Omega_1; \bar{s} \in \Theta_1}},$$

является невырожденным многочленом от функций  $f_1(z), \dots, f_m(z)$  и не равен нулю тождественно ввиду их алгебраической независимости. С другой стороны,  $B(z) \tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{s}}(\bar{f})$ ,  $\bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}$ ,  $\bar{s} \in \Theta_1$ , есть некоторые линейные формы от функций  $1, f_1(z), \dots, f_m(z)$  с коэффициентами из  $\mathbb{C}[z]$  и оценкой  $C_5 \omega N$  на степени этих коэффициентов согласно (3.6). Поэтому  $\chi$  как многочлен от  $z, f_1, \dots, f_m$  имеет степень не выше  $\tilde{\theta} \cdot C_5 \omega N$  по  $z$

и не выше  $\tilde{\theta}$  по группе  $f_1, \dots, f_m$ . По теореме 1 [10] порядок нуля этого определителя в точке  $z = 0$  не превосходит

$$C_6(C_5\tilde{\theta}\omega N + 1)\tilde{\theta}^m < 2C_5C_6\theta^{m+1}\omega N,$$

где  $C_6 = C_6(f_1, \dots, f_m)$ .

Если умножить матрицу

$$(P_{\tilde{\kappa}}^{[n]}(z))_{n=0,1,\dots,\tilde{\omega}-1;\tilde{\kappa}\in\tilde{\Omega}},$$

определитель которой равен  $\Delta$ , справа на матрицу (3.8), то согласно соотношениям (3.7) получим матрицу

$$(B(z)R_{\tilde{s}}^{[n]}(z) \mid P_{\tilde{r}}^{[n]}(z))_{n=0,1,\dots,\tilde{\omega}-1;\tilde{s}\in\Theta_1,\tilde{r}\in\tilde{\Omega}\setminus\Omega_1}.$$

Ее определитель равен  $\Delta\chi \neq 0$ . В первых  $\tilde{\theta}$  столбцах этой матрицы стоят линейные функциональные формы, порядок нуля которых в точке  $z = 0$  в соответствии с оценками (1.7) не ниже  $K - \tilde{\omega}$ . Поэтому

$$\text{ord}_{z=0} \Delta\chi \geq \tilde{\theta}(K - \tilde{\omega}) > \tilde{\theta}K - \theta\omega.$$

С другой стороны,

$$\text{ord}_{z=0} \Delta\chi = \text{ord}_{z=0} \Delta + \text{ord}_{z=0} \chi \leq \text{ord}_{z=0} \Delta + 2C_5C_6\theta^{m+1}\omega N,$$

откуда

$$\text{ord}_{z=0} \Delta > \tilde{\theta}K - \theta\omega - 2C_5C_6\theta^{m+1}\omega N,$$

и значит,

$$0 \leq \deg \Delta - \operatorname{ord}_{z=0} \Delta < \tilde{\omega}M - \tilde{\theta}K + \omega^2t + \theta\omega + 2C_5C_6\theta^{m+1}\omega N. \quad (3.9)$$

Выбираем  $M_* = M_*(f_1, \dots, f_m)$  так, чтобы для всех  $M > M_*$  выполнялось

$$\omega^2t + \theta\omega + 2C_5C_6\theta^{m+1}\omega N < \frac{\varepsilon}{\theta}M, \quad (3.10)$$

и тогда

$$K < \left( \frac{\tilde{\omega}}{\tilde{\theta}} + \frac{\varepsilon}{\theta\tilde{\theta}} \right) M \leq \left( \frac{\tilde{\omega}}{\tilde{\theta}} + \frac{\varepsilon}{\theta} \right) M.$$

Осталось воспользоваться оценкой предложения 2.1:

$$\frac{\tilde{\omega}}{\tilde{\theta}} \leq \frac{\omega}{\theta} - \frac{1}{(N+m-1)\theta} = \frac{\omega - 3\varepsilon}{\theta},$$

откуда

$$K < \frac{\omega - 2\varepsilon}{\theta}M,$$

что противоречит выбору  $K$  в условии леммы 1.1. Полученное противоречие доказывает лемму.

**ЛЕММА 3.4.** *Справедливо равенство*

$$\Delta(z) = \det(P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z))_{n=0,1,\dots,\omega-1; \bar{\kappa} \in \Omega} = z^{\operatorname{ord}_{z=0} \Delta} \Delta_0(z),$$

где  $\Delta_0(z)$  – многочлен,  $\Delta_0 \not\equiv 0$  и  $\deg \Delta_0 < 2\varepsilon M$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно оценке (3.9) с  $\tilde{\omega} = \omega$  и  $\tilde{\theta} = \theta$  имеем:

$$\deg \Delta - \operatorname{ord}_{z=0} \Delta < \omega M - \theta K + \omega^2 t + \theta \omega + 2C_5 C_6 \theta^{m+1} \omega N < 2\varepsilon M,$$

что и требовалось.

Теперь мы подготовлены для перехода к числовым линейным формам.

ЛЕММА 3.5. *Ранг числовой матрицы*

$$\left( P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(\alpha) \right)_{n=0,1,\dots,\omega+[2\varepsilon M]; \bar{\kappa} \in \Omega}$$

равен в точности  $\omega$ .

Доказательство этого факта использует ставшие уже стандартными рассуждения Зигеля, аналогичные приведенным в доказательстве леммы 10 [20, гл. 3], и опирается на результат леммы 3.4. Очевидным следствием из этой леммы является следующее утверждение.

ЛЕММА 3.6. *Ранг числовой матрицы*

$$\left( P_{\bar{s}^*}^{[n]}(\alpha) \quad P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}(\alpha) \right)_{n=0,1,\dots,\omega+[2\varepsilon M]},$$

где  $\bar{s}^* = N\bar{e}_{l^*}$ ,  $\bar{\kappa}^* = (N-1)\bar{e}_{l^*}$ , равен двум.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1. Для произвольного  $M > M_*$ , где  $M_*$  определяется согласно неравенству (3.10), воспользуемся результатом леммы 3.6 и выберем целые числа  $n_1, n_2$ ,  $0 \leq n_1 < n_2 \leq \omega + 2\varepsilon M < 3\varepsilon M$ , такие, что числовая матрица

$$\begin{pmatrix} P_{\bar{s}^*}^{[n_1]}(\alpha) & P_{\bar{s}^* - \bar{e}_{l^*}}^{[n_1]}(\alpha) \\ P_{\bar{s}^*}^{[n_2]}(\alpha) & P_{\bar{s}^* - \bar{e}_{l^*}}^{[n_2]}(\alpha) \end{pmatrix}, \quad (3.11)$$

где  $\bar{s}^* = N\bar{e}_{l^*}$ ,  $\bar{k}^* = (N-1)\bar{e}_{l^*}$ , невырождена. Пусть  $\alpha = a/b$ , где  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $b \in \mathbb{N}$ . Положим

$$\begin{aligned} q_j &= b^{M+tn_j} (M+tn_j)! P_{\bar{s}^* - \bar{e}_{l^*}}^{[n_j]}(\alpha) \in \mathbb{Z}; \\ p_j &= -b^{M+tn_j} (M+tn_j)! P_{\bar{s}^*}^{[n_j]}(\alpha) \in \mathbb{Z}; \\ r_j &= b^{M+tn_j} (M+tn_j)! R_{\bar{s}^*}^{[n_j]}(\alpha) = q_j f_{l^*}(\alpha) - p_j, \end{aligned} \quad j = 1, 2.$$

Поскольку  $n_j < 3\varepsilon M$ , можно воспользоваться оценками леммы 1.3 для целых чисел  $q_j$  и линейных форм  $r_j$ ,  $j = 1, 2$ :

$$\begin{aligned} |q_j| &< b^{M+tn_j} (M+tn_j)! \sum_{\nu=0}^{M+tn_j} \frac{C_0^{\omega M/\varepsilon} M^{C_2\varepsilon M}}{\nu!} \alpha^\nu \\ &\leq C_0^{\omega M/\varepsilon} M^{M+C_7\varepsilon M} \leq M^M C_8^{M(\log M)^{m/(m+1)}}; \\ |r_j| &< b^{M+tn_j} (M+tn_j)! C_0^{\omega M/\varepsilon} M^{C_2\varepsilon M} C_3^M M^{-K} \\ &\leq M^{-M+C_9\varepsilon M+M(m-1)/(N+m-1)} C_0^{\omega M/\varepsilon} \leq M^{-M} C_{10}^{M(\log M)^{m/(m+1)}}, \end{aligned} \quad j = 1, 2. \quad (3.12)$$

Выберем  $q_* = \frac{1}{2} M_*^{M_*} C_{10}^{-M_*} (\log M_*)^{m/(m+1)}$  и пусть  $p, q$  – произвольные целые числа,  $|q| \geq q_*$ . Возьмем наименьшее целое  $M$  такое, что

$$M^{-M} C_{10}^{M(\log M)^{m/(m+1)}} \leq \frac{1}{2} |q|^{-1}, \quad (3.13)$$

при этом выполнено  $M > M_*$ . Тогда

$$\begin{aligned} M^M C_8^{M(\log M)^{m/(m+1)}} &\leq (M-1)^{M-1} (2C_8)^{M(\log M)^{m/(m+1)}} \\ &\leq 2|q|(2C_8)^{M(\log M)^{m/(m+1)}} \\ &\leq \frac{1}{2}|q|(4C_8)^{M(\log M)^{m/(m+1)}}. \end{aligned} \quad (3.14)$$

Из выбора (3.13) вытекает, что

$$C_{11} \log M < \log \log |q| < C_{12} \log M,$$

и следовательно,

$$\begin{aligned} (4C_8)^{M(\log M)^{m/(m+1)}} &\leq (M^M)^{C_{13}(\log M)^{-1/(m+1)}} \\ &\leq |q|^{\gamma(\log \log |q|)^{-1/(m+1)}}, \quad \gamma > 0. \end{aligned} \quad (3.15)$$

Оценки (3.12) согласно неравенствам (3.14), (3.15) и (3.13) соответственно переписутся в виде:

$$|q_j| < \frac{1}{2}|q|^{1+\gamma(\log \log |q|)^{-1/(m+1)}}, \quad |r_j| < \frac{1}{2}|q|^{-1}, \quad j = 1, 2.$$

Матрица

$$\begin{pmatrix} q_1 & p_1 \\ q_2 & p_2 \end{pmatrix}$$

невырождена в виду невырожденности (3.11). Поэтому, по крайней мере, одна из линейно независимых над  $\mathbb{C}$  линейных форм  $r_1, r_2$  должна быть линейно независимой с  $r = qf_{l^*}(\alpha) - p$ . Пусть для определенности это будет форма  $r_1$ , т.е.

$$\lambda = \det \begin{pmatrix} q & p \\ q_1 & p_1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} q & -r \\ q_1 & -r_1 \end{pmatrix} \neq 0.$$

Поскольку все входящие в левый определитель числа являются целыми, то и  $\lambda \in \mathbb{Z}$ , иными словами,  $|\lambda| \geq 1$ . Таким образом,

$$\begin{aligned} 1 &\leq |\lambda| = |rq_1 - qr_1| \leq |r| \cdot |q_1| + |q| \cdot |r_1| \\ &< \frac{1}{2}|r| \cdot |q|^{1+\gamma(\log \log |q|)^{-1/(m+1)}} + \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

откуда

$$|r| > |q|^{-1-\gamma(\log \log |q|)^{-1/(m+1)}},$$

что завершает доказательство теоремы 1.

#### § 4. Доказательство теоремы 2 и следствий из нее

Изложенная выше конструкция существенно использует условие алгебраической независимости над  $\mathbb{C}(z)$  рассматриваемых E-функций. Однако, в случае  $m = 2$  удается уточнить предложение 2.1 и тем самым ослабить это условие.

ЛЕММА 4.1. Пусть множество  $\Omega_1 \subset \tilde{\Omega}$  и отображение  $\sigma: \Omega_1 \rightarrow \Theta$  удовлетворяют свойствам 1)–3), описанным перед леммой 2.4. Тогда минор  $\det(\tilde{x}_{\bar{k}, \bar{s}})_{\bar{k} \in \Omega_1, \bar{s} \in \Theta_1}$ ,  $\Theta_1 = \sigma(\Omega_1)$ , матрицы (2.4) равен

$$\pm \prod_{\substack{\bar{k} \in \Omega_1 \\ \sigma(\bar{k}) = \bar{k} + \bar{e}_2}} \tilde{x}_{\bar{k}, \bar{k} + \bar{e}_2} \cdot \prod_{\substack{\bar{k} \in \Omega_1 \\ \bar{k} - \bar{e}_2 \in \Omega_1}} \det \begin{pmatrix} \tilde{x}_{\bar{k} - \bar{e}_2, \bar{k} - \bar{e}_2 + \bar{e}_1} & \tilde{x}_{\bar{k} - \bar{e}_2, \bar{k}} \\ \tilde{x}_{\bar{k}, \bar{k} - \bar{e}_2 + \bar{e}_1} & 1 \end{pmatrix}. \quad (4.1)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Переставим в матрице  $(\tilde{x}_{\bar{k}, \bar{s}})_{\bar{k} \in \Omega_1; \bar{s} \in \Theta_1}$  столбцы таким образом, чтобы на главной диагонали получившейся матрицы  $X$  стояли элементы  $\tilde{x}_{\bar{k}, \sigma(\bar{k})}$ ,  $\bar{k} \in \Omega_1$ , и покажем, что матрица  $X$  имеет “почти треугольный” вид.

Прежде всего отметим, что

$$\bar{s} \prec \bar{k}, \bar{s} \in \Theta, \bar{k} \in \tilde{\Omega} \implies \tilde{x}_{\bar{k}, \bar{s}} = 0 \quad (4.2)$$

согласно определению (2.5), так как в этом случае  $\bar{s} \prec \bar{k}$ ,  $\bar{s} - \bar{e}_2 \prec \bar{k}$  и  $\bar{s} - \bar{e}_1 \prec \bar{k}$ . Пусть  $\bar{k}$  – произвольный мультииндекс из  $\Omega_1$ . Рассмотрим отдельно две возможности.

а)  $|\bar{k}| = N - 1$ . Докажем, что в этом случае в строке с номером  $\bar{k}$  матрицы  $X$  левее главной диагонали расположены нулевые элементы. Для этого в силу (4.2) достаточно показать, что из условий  $\bar{k}' \prec \bar{k}$ ,  $\bar{k}' \in \Omega_1$  следует  $\sigma(\bar{k}') \prec \bar{k}$ .

Если  $|\bar{k}'| = N$ , то  $\sigma(\bar{k}') = \bar{k}' \prec \bar{k}$ .

Если  $|\bar{k}'| = N - 1$ , то  $\bar{k}' \preceq \bar{k} - \bar{e}_1 + \bar{e}_2$ , откуда  $\sigma(\bar{k}') \preceq \bar{k}' + \bar{e}_1 \preceq \bar{k} + \bar{e}_2$ . Равенство  $\sigma(\bar{k}') = \bar{k} + \bar{e}_2$  возможно лишь в случае  $\bar{k}' = \bar{k} - \bar{e}_1 + \bar{e}_2$ , и тогда  $\sigma(\bar{k}) \neq \sigma(\bar{k}') = \bar{k} + \bar{e}_2$ , т.е.  $\sigma(\bar{k}) = \bar{k} + \bar{e}_1$ . Из условия 3) и того, что  $\bar{k} + \bar{e}_2 \prec \bar{k} + \bar{e}_1 = \sigma(\bar{k})$  вытекает, что  $\bar{k}' = \sigma^{-1}(\bar{k} + \bar{e}_2) \succ \bar{k}$ , что противоречит предпосылке  $\bar{k}' \prec \bar{k}$ . Следовательно,  $\sigma(\bar{k}') \neq \bar{k} + \bar{e}_2$  и  $\sigma(\bar{k}') \prec \bar{k} + \bar{e}_2$ . Отсюда  $\sigma(\bar{k}') \preceq \bar{k}$ , и в то же время  $\sigma(\bar{k}') \neq \bar{k}$ , поскольку  $|\sigma(\bar{k}')| = N$ ,  $|\bar{k}| = N - 1$ .

Окончательно,  $\sigma(\bar{k}') \prec \bar{k}$ . Воспользовавшись утверждением (4.2), получаем:

$$\bar{k}' \prec \bar{k}, \bar{k}' \in \Omega_1 \implies \tilde{x}_{\bar{k}, \sigma(\bar{k}')} = 0. \quad (4.3)$$

б)  $|\bar{k}| = N$ . Покажем, что если  $\bar{k}' \prec \bar{k} - \bar{e}_2$ ,  $\bar{k}' \in \Omega_1$ , то  $\sigma(\bar{k}') \prec \bar{k}$ . Поскольку мультииндексы  $\bar{k} - \bar{e}_2$ ,  $\bar{k}$  соседние во множестве  $\Omega$ , это будет означать, что в строке с номером  $\bar{k}$  матрицы  $X$  левее главной диагонали стоят нулевые элементы, кроме, быть может, элемента  $\tilde{x}_{\bar{k}, \sigma(\bar{k} - \bar{e}_2)}$ , предшествующего  $\tilde{x}_{\bar{k}, \sigma(\bar{k})}$ , в случае  $\bar{k} - \bar{e}_2 \in \Omega_1$ .

Если  $|\bar{k}'| = N$ , то  $\sigma(\bar{k}') = \bar{k}' \prec \bar{k} - \bar{e}_2 \prec \bar{k}$ .

Если  $|\bar{k}'| = N - 1$ , то  $\bar{k}' \preceq \bar{k} - \bar{e}_1$  и  $\sigma(\bar{k}') \preceq \bar{k}' + \bar{e}_1 \preceq \bar{k}$ . Равенство  $\sigma(\bar{k}') = \bar{k}$  невозможно, так как  $\sigma^{-1}(\bar{k}) = \bar{k}$ . Поэтому  $\sigma(\bar{k}') \prec \bar{k}$ .

Воспользовавшись утверждением (4.2), в случае б) получаем:

$$\bar{k}' \prec \bar{k}, \bar{k}' \in \Omega_1 \implies \begin{cases} \tilde{x}_{\bar{k}, \sigma(\bar{k}')} = 0, & \text{если } \bar{k}' \prec \bar{k} - \bar{e}_2; \\ \tilde{x}_{\bar{k}, \sigma(\bar{k}')} = \tilde{x}_{\bar{k}, \sigma(\bar{k} - \bar{e}_2)}, & \text{если } \bar{k}' = \bar{k} - \bar{e}_2. \end{cases} \quad (4.4)$$

Если  $\bar{k} - \bar{e}_2 \in \Omega_1$ , то  $\sigma(\bar{k} - \bar{e}_2) = \bar{k} - \bar{e}_2 + \bar{e}_1$ , поскольку  $\sigma(\bar{k} - \bar{e}_2) \neq (\bar{k} - \bar{e}_2) + \bar{e}_2 = \bar{k} = \sigma(\bar{k})$ . С другой стороны, если  $\sigma(\bar{r}) = \bar{r} + \bar{e}_1$ ,  $\bar{r} \in \Omega_1$ , то согласно условию 3) выполнено  $\bar{r} + \bar{e}_2 \in \sigma(\Omega_1)$  и  $\sigma^{-1}(\bar{r} + \bar{e}_2) \succ \bar{r}$ , т.е.  $\sigma^{-1}(\bar{r} + \bar{e}_2) = \bar{r} + \bar{e}_2$  и  $\bar{r} + \bar{e}_2 \in \Omega_1$ .

Согласно утверждениям (4.4) и (4.3) вдоль главной диагонали матрицы  $X$  стоят одномерные блоки

$$(\tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}}), \quad \bar{\kappa} \in \Omega_1, \quad \sigma(\bar{\kappa}) = \bar{\kappa}, \quad \bar{\kappa} - \bar{e}_2 \notin \Omega_1,$$

или

$$(\tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \bar{e}_2}), \quad \bar{\kappa} \in \Omega_1, \quad \sigma(\bar{\kappa}) = \bar{\kappa} + \bar{e}_2,$$

или двумерные блоки

$$\begin{pmatrix} \tilde{x}_{\bar{\kappa} - \bar{e}_2, \bar{\kappa} - \bar{e}_2 + \bar{e}_1} & \tilde{x}_{\bar{\kappa} - \bar{e}_2, \bar{\kappa}} \\ \tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa} - \bar{e}_2 + \bar{e}_1} & \tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}} \end{pmatrix}, \quad \bar{\kappa} \in \Omega_1, \quad \sigma(\bar{\kappa}) = \bar{\kappa}, \quad \bar{\kappa} - \bar{e}_2 \in \Omega_1,$$

а в левее и ниже этих блоков расположены нули. Поэтому и с учетом того, что  $\tilde{x}_{\bar{\kappa}, \sigma(\bar{\kappa})} = 1$  в случае  $\sigma(\bar{\kappa}) = \bar{\kappa}$  согласно формуле (2.5), определитель  $\det(\tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{s}})_{\bar{\kappa} \in \Omega_1; \bar{s} \in \Theta_1} = \pm \det X$  равен (4.1), что и требовалось.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 2.** Функции  $f_1(z), f_2(z)$  не являются многочленами, поскольку каждая из них линейно независима над  $\mathbb{C}(z)$  с единицей. Как целые функции, отличные от многочленов,  $f_1(z)$  и  $f_2(z)$  являются трансцендентными функциями. Покажем, что для некоторого  $l \in \{1, 2\}$  функции  $1, f_1(z), f_2(z), f_l^2(z)$  линейно независимы над  $\mathbb{C}(z)$ .

Предположим, что это не так. Тогда

$$\begin{aligned} f_l^2(z) &= E_{l0}(z) + E_{l1}(z)f_1(z) + E_{l2}(z)f_2(z), \quad l = 1, 2; \\ E_{lj} &\in \mathbb{C}(z), \quad l = 1, 2, \quad j = 0, 1, 2, \end{aligned} \tag{4.5}$$

поскольку функции  $1, f_1(z), f_2(z)$  линейно независимы над  $\mathbb{C}(z)$ . Если  $E_{12} \equiv 0$ , то трансцендентная функция  $f_1(z)$  удовлетворяет алгебраическому уравнению  $y^2 - E_{11}y - E_{10} = 0$ , что невозможно. Поэтому

$$f_2(z) = \frac{f_1^2(z) - E_{11}(z)f_1(z) - E_{10}(z)}{E_{12}(z)}, \quad E_{12} \neq 0,$$

и после подстановки этого выражения в уравнение (4.5) при  $l = 2$  заключаем, что трансцендентная функция  $f_1(z)$  удовлетворяет алгебраическому уравнению

$$(y^2 - E_{11}y - E_{10})^2 - E_{22}E_{12}(y^2 - E_{11}y - E_{10}) - E_{21}E_{12}^2y - E_{20}E_{12}^2 = 0,$$

что опять же невозможно. Полученное противоречие показывает, что по крайней мере одна из функций  $f_l^2(z)$ ,  $l \in \{1, 2\}$ , не выражается линейно с коэффициентами из  $\mathbb{C}(z)$  через функции  $1, f_1(z), f_2(z)$ . Не ограничивая общности, можно считать, что  $l = 2$ , т.е. что функции  $1, f_1(z), f_2(z), f_2^2(z)$  линейно независимы над  $\mathbb{C}(z)$ .

Пусть множества  $\Omega_1$  и  $\Theta_1$  выбраны по заданному  $\tilde{\Omega} \subset \Omega$  в соответствии с предложением 2.1 и рациональные функции (2.3) представлены в виде (3.6). Обозначим через  $\sigma : \Omega_1 \rightarrow \Theta_1$  такое биективное отображение, что пара  $(\Omega_1, \sigma)$  удовлетворяет условиям 1)–3). Согласно формуле (2.5) имеем:

$$\tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \bar{e}_2} = y_2 + D_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \bar{e}_2}, \quad \text{если } \sigma(\bar{\kappa}) = \bar{\kappa} + \bar{e}_2;$$

$$\begin{aligned} \tilde{x}_{\bar{\kappa} - \bar{e}_2, \bar{\kappa} - \bar{e}_2 + \bar{e}_1} &= y_1 + D_{\bar{\kappa} - \bar{e}_2, \bar{\kappa} - 2\bar{e}_2 + \bar{e}_1} y_2 \\ &\quad + D_{\bar{\kappa} - \bar{e}_2, \bar{\kappa} - \bar{e}_2 + \bar{e}_1}, \quad \text{если } \sigma(\bar{\kappa}) = \bar{\kappa}, \bar{\kappa} - \bar{e}_2 \in \Omega_1; \end{aligned}$$

$$\tilde{x}_{\bar{\kappa} - \bar{e}_2, \bar{\kappa}} = y_2, \quad \text{если } \sigma(\bar{\kappa}) = \bar{\kappa}, \bar{\kappa} - \bar{e}_2 \in \Omega_1;$$

$$\begin{aligned} \tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa} - \bar{e}_2 + \bar{e}_1} &= D_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa} - 2\bar{e}_2 + \bar{e}_1} y_2 \\ &\quad + D_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa} - \bar{e}_2 + \bar{e}_1}, \quad \text{если } \sigma(\bar{\kappa}) = \bar{\kappa}, \bar{\kappa} - \bar{e}_2 \in \Omega_1, \end{aligned}$$

откуда, если воспользоваться леммой 4.1,

$$\begin{aligned}
\chi &= \pm \det \left( B(z) \tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{s}}(\bar{f}) \right)_{\bar{\kappa} \in \Omega_1; \bar{s} \in \Theta_1} \\
&= \pm \prod_{\substack{\bar{\kappa} \in \Omega_1 \\ \sigma(\bar{\kappa}) = \bar{\kappa} \\ \bar{\kappa} - \bar{e}_2 \notin \Omega_1}} B(z) \cdot \prod_{\substack{\bar{\kappa} \in \Omega_1 \\ \sigma(\bar{\kappa}) = \bar{\kappa} + \bar{e}_2}} \{ B(z) f_2(z) + B_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa} + \bar{e}_2}(z) \} \\
&\times \prod_{\substack{\bar{\kappa} \in \Omega_1 \\ \bar{\kappa} - \bar{e}_2 \in \Omega_1}} B(z) \{ -B_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa} - 2\bar{e}_2 + \bar{e}_1}(z) f_2^2(z) + B(z) f_1(z) \\
&+ (B_{\bar{\kappa} - \bar{e}_2, \bar{\kappa} - 2\bar{e}_2 + \bar{e}_1}(z) - B_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa} - \bar{e}_2 + \bar{e}_1}(z)) f_2(z) + B_{\bar{\kappa} - \bar{e}_2, \bar{\kappa} - \bar{e}_2 + \bar{e}_1}(z) \}.
\end{aligned}$$

Поскольку  $B(z) \not\equiv 0$  и функции  $1, f_1(z), f_2(z), f_2^2(z)$  линейно независимы над  $\mathbb{C}(z)$ , последнее произведение отлично от нуля. Выражения в фигурных скобках можно рассматривать как многочлены от  $z, f_1(z), f_2(z)$  степени не выше  $C_5 \omega N$  по  $z$  и не выше 2 по группе  $f_1, f_2$ . Согласно следствию из теоремы 1 [8] порядок нуля каждого такого выражения в точке  $z = 0$  не выше

$$C_{14}(C_5 \omega N + 1)2^{3^3} \leq C_{15} \omega N,$$

где постоянная  $C_{14}$ , а следовательно, и  $C_{15}$ , зависит только от функций  $f_1(z), f_2(z)$ . Кроме того,

$$\text{ord}_{z=0} B(z) \leq \deg B(z) \leq C_5 \omega N \leq C_{15} \omega N.$$

Поэтому

$$\begin{aligned}
\text{ord}_{z=0} \chi &\leq \sum_{\substack{\bar{\kappa} \in \Omega_1 \\ \sigma(\bar{\kappa}) = \bar{\kappa} \\ \bar{\kappa} - \bar{e}_2 \notin \Omega_1}} C_{15} \omega N + \sum_{\substack{\bar{\kappa} \in \Omega_1 \\ \sigma(\bar{\kappa}) = \bar{\kappa} + \bar{e}_2}} C_{15} \omega N \\
&+ \sum_{\substack{\bar{\kappa} \in \Omega_1 \\ \bar{\kappa} - \bar{e}_2 \in \Omega_1}} (C_{15} \omega N + C_{15} \omega N) \\
&= \text{Card } \Omega_1 \cdot C_{15} \omega N \leq C_{15} \omega^2 N.
\end{aligned}$$

Осталось в доказательстве леммы 3.3 выбрать  $M_* = M_*(f_1, f_2)$  так, чтобы для всех  $M > M_*$  выполнялось неравенство

$$\omega^2 t + \theta \omega + C_{15} \omega^2 N < \frac{\varepsilon}{\theta} M.$$

Все остальные рассуждения остаются без изменений. Это завершает доказательство теоремы 2.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СЛЕДСТВИЯ 1.** Если функции  $1, f(z), f'(z)$  линейно независимы над  $\mathbb{C}(z)$ , то справедливость неравенства

$$\left| f(\alpha) - \frac{p}{q} \right| > |q|^{-2-\gamma(\log \log |q|)^{-1/3}} \quad (4.6)$$

вытекает из теоремы 2. В противном случае функция  $f(z)$  либо линейно зависима с единицей и, как целая функция, является многочленом, либо удовлетворяет дифференциальному уравнению первого порядка

$$E_1(z)y' + E_0(z)y = F(z), \quad E_1, E_0, F \in \mathbb{C}[z],$$

в котором многочлены  $E_1, E_0, F$  взаимно просты, а кроме того,  $E_1, E_0, F \in \mathbb{Q}[z]$  согласно лемме 3 [20, гл. 3]. В первом случае  $f(\alpha)$  является рациональным числом, поскольку  $f(z) \in \mathbb{Q}[z]$ . Во втором случае, если  $E_1(\alpha) \neq 0$ , то справедливость неравенства (4.6) следует из результата (0.7) А.Б. Шидловского при  $m = 1$ . Если же  $E_1(\alpha) = 0$ , то  $E_0(\alpha)f(\alpha) = F(\alpha)$ , откуда  $f(\alpha) = F(\alpha)/E_0(\alpha) \in \mathbb{Q}$ , так как равенство  $E_0(\alpha) = 0$  невозможно ввиду взаимной простоты многочленов  $E_1, E_0, F$ . Тем самым мы доказали (4.6) в случае, когда  $f(\alpha)$  не является рациональным числом. Если  $f(\alpha) = a/b \in \mathbb{Q}$ , то для всех  $p, q \in \mathbb{Z}$ ,  $|q| \geq |b|$ , либо  $f(\alpha) = p/q$  либо

$$\left| f(\alpha) - \frac{p}{q} \right| = \frac{|aq - bp|}{|bq|} \geq \frac{1}{|bq|} \geq \frac{1}{q^2},$$

откуда следует неравенство (4.6). Утверждение доказано полностью.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СЛЕДСТВИЯ 2. Докажем, что при любых значениях параметров  $\lambda, \mu \in \mathbb{Q} \setminus \{-1, -2, \dots\}$  функции  $1, K_{\lambda, \mu}(z), K'_{\lambda, \mu}(z)$  линейно независимы над  $\mathbb{C}(z)$ . Предположим, что это не так, и для некоторой пары  $\lambda, \mu$  эти функции связаны уравнением

$$P_0(z) + P_1(z)K_{\lambda, \mu}(z) + P_2(z)K'_{\lambda, \mu}(z) = 0, \quad P_0, P_1, P_2 \in \mathbb{C}[z], \quad (4.7)$$

где  $P_0(z) + P_1(z)y_1 + P_2(z)y_2 \in \mathbb{C}[z, y_1, y_2]$  – неприводимый многочлен. Заменяя в уравнении (4.7)  $z$  на  $-z$  и пользуясь тем, что  $K_{\lambda, \mu}(z)$  и  $K'_{\lambda, \mu}(z)$  являются соответственно четной и нечетной функциями, получим

$$P_0(-z) + P_1(-z)K_{\lambda, \mu}(z) - P_2(-z)K'_{\lambda, \mu}(z) = 0.$$

Поскольку функция  $K_{\lambda, \mu}(z)$  линейно независима над  $\mathbb{C}(z)$  с единицей, многочлен  $P_0(-z) + P_1(-z)y_1 - P_2(-z)y_2$  делится на многочлен  $P_0(z) + P_1(z)y_1 + P_2(z)y_2$  в кольце  $\mathbb{C}[z, y_1, y_2]$ . Это возможно лишь в одном из двух случаев:

$$P_0(-z) \equiv P_0(z), \quad P_1(-z) \equiv P_1(z), \quad P_2(-z) \equiv -P_2(z),$$

или

$$P_0(-z) \equiv -P_0(z), \quad P_1(-z) \equiv -P_1(z), \quad P_2(-z) \equiv P_2(z).$$

Следовательно, функции  $1, K_{\lambda, \mu}(z), K'_{\lambda, \mu}(z)/z$  связаны линейным уравнением с коэффициентами из  $\mathbb{C}[z^2]$ . В первом случае это уравнение

$$P_0(z) + P_1(z)K_{\lambda, \mu}(z) + (zP_2(z))\frac{K'_{\lambda, \mu}(z)}{z} = 0,$$

во втором –

$$\frac{P_0(z)}{z} + \frac{P_1(z)}{z} K_{\lambda, \mu}(z) + P_2(z) \frac{K'_{\lambda, \mu}(z)}{z} = 0.$$

Поэтому функции  $1, \psi(z), \psi'(z)$ , где

$$K_{\lambda, \mu}(z) = \psi(z^2), \quad K'_{\lambda, \mu}(z) = 2z\psi'(z^2),$$

линейно зависимы над  $\mathbb{C}(z)$ . С другой стороны,

$$\psi(z) = 1 + \sum_{\nu=1}^{\infty} z^{\nu} \prod_{x=1}^{\nu} \frac{1}{b(x)}, \quad b(x) = -4(x + \lambda)(x + \mu),$$

и по теореме 2 работы [3] функции  $1, \psi(z), \psi'(z)$ , линейно независимы над  $\mathbb{C}(z)$ . Полученное противоречие доказывает линейную независимость над  $\mathbb{C}(z)$  функций  $1, K_{\lambda, \mu}(z), K'_{\lambda, \mu}(z)$  при любых значениях параметров  $\lambda, \mu \in \mathbb{Q} \setminus \{-1, -2, \dots\}$ . Функция  $K_{\lambda, \mu}(z)$  является решением дифференциального уравнения

$$y'' + \frac{2\lambda + 2\mu + 1}{z} y' + \left(1 + \frac{4\lambda\mu}{z^2}\right) y = \frac{4\lambda\mu}{z^2}.$$

Осталось воспользоваться утверждением теоремы 2.

**Доказательство следствия 3.** Функция  $A_{\lambda, \mu, \beta}(z)$  является решением дифференциального уравнения

$$y'' + \left(\frac{\lambda + \mu + 1}{z} - 1\right) y' + \frac{\lambda\mu - (\beta + 1)z}{z^2} y = \frac{\lambda\mu}{z^2}$$

и представима в виде

$$A_{\lambda, \mu, \beta}(z) = 1 + \sum_{\nu=1}^{\infty} z^{\nu} \prod_{x=1}^{\nu} \frac{a(x)}{b(x)}, \quad a(x) = x + \beta, \quad b(x) = (x + \lambda)(x + \mu).$$

Согласно теореме 2 [3] при любых значениях параметров  $\lambda, \mu, \beta \in \mathbb{Q} \setminus \{-1, -2, \dots\}$  таких, что  $\beta - \lambda, \beta - \mu \notin \mathbb{N} \cup \{0\}$ , функции  $1, A_{\lambda, \mu, \beta}(z), A'_{\lambda, \mu, \beta}(z)$  линейно независимы над  $\mathbb{C}(z)$  и поэтому можно воспользоваться теоремой 2 настоящей работы. Если  $\beta - \lambda = 0$ , то функция  $A_{\lambda, \mu, \beta}(z)$  является решением дифференциального уравнения

$$y' + \left( \frac{\mu}{z} - 1 \right) y = \frac{\mu}{z}$$

и для нее можно воспользоваться результатом (0.7) при  $m = 1$ . Аналогично рассматривается случай  $\beta - \mu = 0$ . Утверждение доказано полностью.

ЗАМЕЧАНИЕ. Если  $\beta - \lambda \in \mathbb{N}$ , то для некоторых  $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$  число  $A_{\lambda, \mu, \beta}(\alpha)$  может быть рациональным. Так, например,

$$A_{\lambda, \mu, \lambda+1}(\mu - \lambda - 1) = \frac{\mu}{\lambda + 1}.$$

## ГЛАВА II

**Мера иррациональности значений G-функций****§ 1. Градуированные приближения Паде**

Докажем прежде всего два вспомогательных утверждения: об оценке сверху высоты произведения произвольных многочленов и об оценке сверху степеней и высот многочленов  $T^n(z)S_{jl}^{[n]}(z) \in \mathbb{Q}[z]$ ,  $j, l = 1, \dots, m$ ,  $n \in \mathbb{N}$  (тот факт, что эти функции являются многочленами непосредственно следует из выбора многочлена  $T_*(z)$  и того, что он делит  $T(z)$  согласно (0.12)).

**ЛЕММА 1.1.** Пусть  $w_1(z), \dots, w_N(z)$  – произвольный набор многочленов с вещественными коэффициентами, а степень многочлена  $w(z) = w_1(z) \cdots w_N(z)$  не выше  $n$ . Тогда

$$H(w) \leq (n + 1)^N H(w_1) \cdots H(w_N).$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Если коэффициенты формальных степенных рядов

$$f(z) = \sum_{\nu=0}^{\infty} f_{\nu} z^{\nu}, \quad F(z) = \sum_{\nu=0}^{\infty} F_{\nu} z^{\nu}$$

удовлетворяют условиям  $|f_{\nu}| \leq F_{\nu}$ ,  $\nu = 0, 1, 2, \dots$ , то условимся обозначать  $f(z) \ll F(z)$ . Как следует из определения высоты многочлена,

$$w_i(z) \ll H(w_i) \sum_{\nu=0}^{\deg w_i} z^{\nu} \ll H(w_i)(1 + z + \cdots + z^n), \quad i = 1, \dots, N,$$

откуда

$$w(z) \ll H(w_1) \cdots H(w_N)(1 + z + \cdots + z^n)^N.$$

Поскольку высота многочлена с неотрицательными вещественными коэффициентами не превосходит сумму всех его коэффициентов, равную значению многочлена в точке  $z = 1$ , получаем требуемое утверждение.

**ЛЕММА 1.2.** *Справедливы оценки:*

$$\begin{aligned} \deg T^n S_{jl}^{[n]} &\leq tn, & H(T^n S_{jl}^{[n]}) &\leq C_1 (2(t+1)^2 H)^n n!, \\ C_1 &= C_1(m, t) > 0, & j, l &= 1, \dots, m, \quad n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Воспользуемся рекуррентными соотношениями (0.14), в которых  $T_*(z)$  заменено на  $T(z)$ . Из них непосредственно вытекает, что  $\deg T^n S_{jl}^{[n]} \leq tn$ ,  $j, l = 1, \dots, m$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Кроме того, полагая

$$H_n = \max_{1 \leq j, l \leq m} \{H(T^n S_{jl}^{[n]})\}, \quad n \in \mathbb{N},$$

получаем:

$$\begin{aligned} T(z) \frac{d}{dz} (T^n(z) S_{jl}^{[n]}(z)) &\ll H \sum_{\nu=0}^{t+1} z^\nu \cdot H_n \frac{d}{dz} \sum_{\mu=0}^{tn} z^\mu \\ &\ll H \sum_{\nu=0}^{t+1} z^\nu \cdot tn H_n \sum_{\mu=0}^{tn-1} z^\mu \\ &\ll (t+2)H \cdot tn H_n \sum_{\nu=0}^{tn+t} z^\nu, \quad j, l = 1, \dots, m; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
T^n(z)S_{ji}^{[n]}(z) \cdot T(z)S_{il}(z) &\ll H_n \sum_{\nu=0}^{tn} z^\nu \cdot H \sum_{\mu=0}^t z^\mu \\
&\ll H_n \cdot (t+1)H \sum_{\nu=0}^{tn+t} z^\nu, \quad j, i, l = 1, \dots, m; \\
nT'(z)T^n(z)S_{jl}^{[n]}(z) &\ll nH \frac{d}{dz} \sum_{\nu=0}^{t+1} z^\nu \cdot H_n \sum_{\mu=0}^{tn} z^\mu \\
&\ll (t+1)nH \sum_{\nu=0}^t z^\nu \cdot H_n \sum_{\mu=0}^{tn} z^\mu \\
&\ll (t+1)^2 nH \cdot H_n \sum_{\nu=0}^{tn+t} z^\nu, \quad j, l = 1, \dots, m, \\
& \qquad \qquad \qquad n \in \mathbb{N},
\end{aligned}$$

откуда и из рекуррентных соотношений имеем:

$$\begin{aligned}
T^{n+1}(z)S_{jl}^{[n+1]}(z) &\ll (t(t+2)nHH_n + (t+1)mHH_n + (t+1)^2nHH_n) \sum_{\nu=0}^{tn+t} z^\nu \\
&\ll 2(t+1)^2(n+1) \left(1 - \frac{1}{2(t+1)^2} + \frac{m}{2(t+1)(n+1)}\right) HH_n \sum_{\nu=0}^{tn+t} z^\nu, \\
& \qquad \qquad \qquad j, l = 1, \dots, m, \quad n \in \mathbb{N},
\end{aligned}$$

или

$$H_{n+1} \leq 2(t+1)^2(n+1) \left(1 - \frac{1}{2(t+1)^2} + \frac{m}{2(t+1)(n+1)}\right) HH_n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Так как  $H_1 \leq H$ , получаем:

$$H_{n+1} \leq 2^n (t+1)^{2n} H^{n+1} (n+1)! \prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{1}{2(t+1)^2} + \frac{m}{2(t+1)(i+1)}\right),$$

$n \in \mathbb{N}$ .

Поскольку

$$1 - \frac{1}{2(t+1)^2} + \frac{m}{2(t+1)(i+1)} \geq 1 \quad \text{при } i \leq m(t+1) - 1;$$

$$1 - \frac{1}{2(t+1)^2} + \frac{m}{2(t+1)(i+1)} \leq 1 \quad \text{при } i \geq m(t+1) - 1,$$

для любого натурального  $n$  выполнено неравенство

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n \left( 1 - \frac{1}{2(t+1)^2} + \frac{m}{2(t+1)(i+1)} \right) \\ \leq C_1 = \prod_{i=1}^{m(t+1)-1} \left( 1 - \frac{1}{2(t+1)^2} + \frac{m}{2(t+1)(i+1)} \right), \end{aligned}$$

которое и завершает доказательство леммы.

Перейдем теперь к построению систем приближающих линейных форм.

**ЛЕММА 1.3.** Пусть совокупность функций  $f_1(z), \dots, f_m(z)$  принадлежит классу  $G(C, \Phi)$ . Тогда для любых натуральных чисел  $N$  и  $M$  существуют многочлены  $P_{\bar{\kappa}}(z) \in \mathbb{Q}[z]$ ,  $\bar{\kappa} \in \Omega$ , удовлетворяющие следующим условиям:

- 1) не все они тождественно равны нулю;
- 2)  $\deg P_{\bar{\kappa}} < M$  для всех  $\bar{\kappa} \in \Omega$ ;
- 3)  $P_{\bar{\kappa}}(z) \in \mathbb{Z}[z]$ ,  $\bar{\kappa} \in \Omega \setminus \Theta$ , и для произвольного  $\varepsilon_1 > 0$  при  $M > M_1(N, \varepsilon_1)$  высота многочленов удовлетворяет неравенству

$$H(P_{\bar{\kappa}}) < C_2^{(1+\varepsilon_1/2)M}, \quad \bar{\kappa} \in \Omega \setminus \Theta,$$

$$C_2 = (C\Phi)^{\omega(\omega-\theta)/(\varepsilon\theta)} = (C\Phi)^{\frac{1}{\varepsilon}} \left( 2 - \frac{m-1}{N+m-1} \right) \binom{N+m-2}{m-1};$$

- 4) порядок нуля в точке  $z = 0$  каждой из линейных функциональных форм (0.21) не ниже

$$K = \left\lceil \frac{(\omega - \varepsilon)M}{\theta} \right\rceil = \left\lceil \left( 2 - \frac{m-1}{N+m-1} - \frac{\varepsilon}{\theta} \right) M \right\rceil.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим разложение в степенной ряд требуемых многочленов:

$$P_{\bar{\kappa}}(z) = \sum_{\nu=0}^{M-1} P_{\bar{\kappa},\nu} z^{\nu}, \quad \bar{\kappa} \in \Omega,$$

Имеем:

$$\sum_{j=1}^m P_{\bar{s}-\bar{e}_j}(z) f_j(z) = \sum_{j=1}^m \sum_{\mu=0}^{\infty} \sum_{\nu=0}^{\min\{\mu, M-1\}} P_{\bar{s}-\bar{e}_j,\nu} f_{j,\mu-\nu} z^{\mu}, \quad \bar{s} \in \Theta.$$

Будем искать совокупность целых чисел  $P_{\bar{\kappa},\nu}$ ,  $\bar{\kappa} \in \Omega \setminus \Theta$ ,  $\nu = 0, 1, \dots, M-1$ , таких, что

$$\sum_{j=1}^m \sum_{\nu=0}^{M-1} P_{\bar{s}-\bar{e}_j,\nu} f_{j,\mu-\nu} = 0, \quad \mu = M, M+1, \dots, K-1, \quad \bar{s} \in \Theta. \quad (1.1)$$

Тогда, полагая

$$P_{\bar{s},\mu} = - \sum_{j=1}^m \sum_{\nu=0}^{\mu} P_{\bar{s}-\bar{e}_j,\nu} f_{j,\mu-\nu}, \quad \mu = 0, 1, \dots, M-1, \quad \bar{s} \in \Theta,$$

получим:

$$R_{\bar{s}}(z) = P_{\bar{s}}(z) + \sum_{j=1}^m P_{\bar{s}-\bar{e}_j}(z) f_j(z) = \sum_{\mu=K}^{\infty} \sum_{j=1}^m \sum_{\nu=0}^{M-1} P_{\bar{s}-\bar{e}_j, \nu} f_{j, \mu-\nu} z^{\mu},$$

$$\bar{s} \in \Theta,$$

иными словами, что

$$\text{ord}_{z=0} R_{\bar{s}}(z) \geq K, \quad \bar{s} \in \Theta.$$

Возьмем последовательность  $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{N}$  из определения класса  $G(C, \Phi)$  и умножим уравнения (1.1) на  $\varphi_K$ :

$$\sum_{j=1}^m \sum_{\nu=0}^{M-1} P_{\bar{s}-\bar{e}_j, \nu} \varphi_{\bar{s}i z e K} f_{j, \mu-\nu} = 0, \quad \mu = M, M+1, \dots, K-1, \quad \bar{s} \in \Theta.$$

Получившиеся  $\theta(K-M)$  уравнений относительно  $(\omega - \theta)M$  неизвестных  $P_{\bar{k}, \nu}$ ,  $\bar{k} \in \Omega \setminus \Theta$ ,  $\nu = 0, 1, \dots, M-1$ , имеют целочисленные коэффициенты, ограниченные по модулю величиной  $\gamma^2(C\Phi)^{(1+\varepsilon_1/4)K}$ , где постоянная  $\gamma$  зависит только от  $\varepsilon_1 > 0$ . Согласно лемме Зигеля (см. лемму 11 [20, гл. 3]) существует нетривиальный набор многочленов  $P_{\bar{k}}(z) \in \mathbb{Z}[z]$ ,  $\bar{k} \in \Omega \setminus \Theta$ , высота каждого из которых не превосходит

$$\begin{aligned} & ((\omega - \theta)M \gamma^2(C\Phi)^{(1+\varepsilon_1/4)K})^{\theta(K-M)/((\omega - \theta)M - \theta(K-M))} \\ & \leq ((C\Phi)^{(1+\varepsilon_1/2)\omega M/\theta})^{(\omega - \theta)/\varepsilon} \end{aligned}$$

при любом  $\varepsilon_1 > 0$  и произвольных  $N, M > M_1(N, \varepsilon_1)$ . Утверждение леммы доказано.

Положим

$$\begin{aligned}
\mathcal{R}^{[n]}(z; \bar{a}) &= \sum_{\bar{s}: |\bar{s}|=N} \bar{a}^{\bar{s}} \mathcal{R}_{\bar{s}}^{[n]}(z) \\
&= \sum_{\bar{\kappa}: |\bar{\kappa}|=N} \bar{a}^{\bar{\kappa}} \mathcal{P}_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) + \sum_{\bar{\kappa}: |\bar{\kappa}|=N-1} \bar{a}^{\bar{\kappa}} \mathcal{P}_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) \sum_{j=1}^m a_j f_j(z) \\
&= D^n \left( \sum_{\bar{\kappa}: |\bar{\kappa}|=N} \bar{a}^{\bar{\kappa}} P_{\bar{\kappa}}(z) + \sum_{\bar{\kappa}: |\bar{\kappa}|=N-1} \bar{a}^{\bar{\kappa}} P_{\bar{\kappa}}(z) \sum_{j=1}^m a_j f_j(z) \right) \\
&= D^n \left( \sum_{\bar{s}: |\bar{s}|=N} \bar{a}^{\bar{s}} R_{\bar{s}}(z) \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots, \tag{1.2}
\end{aligned}$$

где  $P_{\bar{\kappa}}(z)$ ,  $\bar{\kappa} \in \Omega$ , и  $R_{\bar{s}}(z)$ ,  $\bar{s} \in \Theta$ , – построенные в лемме 1.3 многочлены и отвечающие им линейные формы (0.21).

ЛЕММА 1.4. *Для элементов последовательности функциональных форм (1.2) справедливы рекуррентные соотношения*

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}_{\bar{\kappa}}^{[n+1]}(z) &= \frac{d}{dz} \mathcal{P}_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) - \sum_{l,j=1}^m (\kappa_j - \delta_{lj} + 1) Q_{lj}(z) \mathcal{P}_{\bar{\kappa} - \bar{e}_l + \bar{e}_j}^{[n]}(z) \\
&\quad + (|\bar{\kappa}| - N + 1) \sum_{l=1}^m Q_{l0}(z) \mathcal{P}_{\bar{\kappa} - \bar{e}_l}^{[n]}(z), \quad \bar{\kappa} \in \Omega, \quad n \geq 0; \tag{1.3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{R}_{\bar{s}}^{[n+1]}(z) &= \frac{d}{dz} \mathcal{R}_{\bar{s}}^{[n]}(z) - \sum_{l,j=1}^m (s_j - \delta_{lj} + 1) Q_{lj}(z) \mathcal{R}_{\bar{s} - \bar{e}_l + \bar{e}_j}^{[n]}(z), \\
&\hspace{20em} \bar{s} \in \Theta, \quad n \geq 0. \tag{1.4}
\end{aligned}$$

Отсюда, в частности:

а) функции

$$P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) = \frac{T^n(z)}{n!} \mathcal{P}_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z), \quad \bar{\kappa} \in \Omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \tag{1.5}$$

являются многочленами степени не выше  $M + tn - 1$ ;

б) порядок нуля в точке  $z = 0$  функциональных линейных форм

$$R_{\bar{s}}^{[n]}(z) = \frac{T^n(z)}{n!} \mathcal{R}_{\bar{s}}^{[n]}(z), \quad \bar{s} \in \Theta, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (1.6)$$

не ниже  $K - n$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Требуемые рекуррентные формулы (1.3), (1.4) вытекают из соотношения

$$\mathcal{R}^{[n+1]}(z; \bar{a}) = D\mathcal{R}^{[n]}(z; \bar{a}), \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

и определения (0.22) оператора  $D$ .

а) Из рекуррентных соотношений (1.3) и поскольку

$$T^{n+1}(z) \frac{d}{dz} \mathcal{P}(z) = T(z) \frac{d}{dz} (T^n(z) \mathcal{P}(z)) - nT'(z)T^n(z) \mathcal{P}(z),$$

$$n = 0, 1, 2, \dots,$$

для любой функции  $\mathcal{P}(z)$ , имеем:

$$\begin{aligned} T^{n+1}(z) \mathcal{P}_{\bar{\kappa}}^{[n+1]}(z) &= T(z) \frac{d}{dz} (T^n(z) \mathcal{P}_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z)) - nT'(z)T^n(z) \mathcal{P}_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) \\ &\quad - \sum_{l,j=1}^m (\kappa_j - \delta_{lj} + 1) T(z) Q_{lj}(z) \cdot T^n(z) \mathcal{P}_{\bar{\kappa} - \bar{e}_l + \bar{e}_j}^{[n]}(z) \\ &\quad + (|\bar{\kappa}| - N + 1) \sum_{l=1}^m T(z) Q_{l0}(z) \cdot T^n(z) \mathcal{P}_{\bar{\kappa} - \bar{e}_l}^{[n]}(z), \end{aligned}$$

$$\bar{\kappa} \in \Omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

При  $n = 0$  функции  $\mathcal{P}_{\bar{\kappa}}^{[0]}(z) = P_{\bar{\kappa}}(z)$ ,  $\bar{\kappa} \in \Omega$ , являются многочленами степени не выше  $M - 1$  согласно лемме 1.3. Простой индукцией по  $n = 0, 1, 2, \dots$  убеждаемся, что функции (1.5) также являются многочленами и имеют степень не выше  $M + tn - 1$ . Отсюда следует утверждение пункта а).

б) Из рекуррентных соотношений (1.4) и ввиду того, что функции  $\mathcal{R}_{\bar{s}}^{[0]}(z) = R_{\bar{s}}(z)$ ,  $\bar{s} \in \Theta$ , имеют в точке  $z = 0$  порядок нуля не ниже  $K$ , индукцией по  $n = 0, 1, 2, \dots$  заключаем, что

$$\text{ord}_{z=0} \mathcal{R}_{\bar{s}}^{[n]}(z) \geq K - n, \quad \bar{s} \in \Theta.$$

Отсюда следует оценка снизу порядка нуля линейных форм (1.6).

В дальнейшем будем пользоваться символами  $\bar{\kappa}^*$  и  $\bar{s}^*$  для обозначения мультииндексов  $(N - 1)\bar{e}_{l^*}$  и  $N\bar{e}_{l^*}$  соответственно. Через  $\psi'_n$  обозначим наименьший общий знаменатель коэффициентов многочлена  $P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}(z)$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots$

**ЛЕММА 1.5.** Пусть  $\varepsilon_1 > 0$  выбрано в соответствии с пунктом 3) леммы 1.3. Тогда для натуральных чисел  $\psi'_n$ , многочленов  $P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}(z)$  и форм  $R_{\bar{s}^*}^{[n]}(z)$  при  $M > M_2(N, \varepsilon_1) \geq M_1(N, \varepsilon_1)$ ,  $n < (K - M)/(t + 1)$  и  $|\alpha| < 1/(2C)$  справедливы оценки

$$\begin{aligned} \psi'_n &\leq C_3 \Psi^{(1+\varepsilon_1/2)n(1+\log N)}, \\ |P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}(\alpha)| &\leq C_4 \binom{M}{n} (2(t+1)^2 H)^{n(1+\log N)} C_2^{(1+\varepsilon_1)M}, \\ |R_{\bar{s}^*}^{[n]}(\alpha)| &\leq C_5 \binom{M}{n} (2(t+1)^2 H)^{n(1+\log N)} C_2^{(1+\varepsilon_1)M} (C|\alpha|)^{K-n}, \end{aligned}$$

$$C_3 = C_3(N, \varepsilon_1) > 0, \quad C_4 = C_4(N) > 0, \quad C_5 = C_5(N) > 0.$$

Кроме того, если выполнено неравенство  $n < (K - M)/(t + 1)$ , то многочлен  $\varphi_{M+tn} \psi'_n P_{\bar{s}^*}^{[n]}(z) \in \mathbb{Z}[z]$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из соотношений (1.2), (1.3) и свойства (0.23) следует, что

$$\sum_{\bar{\kappa}:|\bar{\kappa}|=N-1} \bar{a}^{\bar{\kappa}} P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) = \frac{T^n(z)}{n!} \cdot D^n \left( \sum_{\bar{\kappa}:|\bar{\kappa}|=N-1} \bar{a}^{\bar{\kappa}} P_{\bar{\kappa}}(z) \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Поэтому многочлен  $P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}(z)$  является коэффициентом при  $\bar{a}^{\bar{\kappa}^*}$  в функциональной форме

$$\frac{T^n(z)}{n!} \cdot D^n \left( \sum_{\bar{\kappa}:|\bar{\kappa}|=N-1} \bar{a}^{\bar{\kappa}} P_{\bar{\kappa}}(z) \right).$$

Для его нахождения определим сначала коэффициент при  $\bar{a}^{\bar{\kappa}^*}$  в выражении  $D^n(\bar{a}^{\bar{\kappa}} P_{\bar{\kappa}}(z))$  для каждого  $\bar{\kappa}$ ,  $|\bar{\kappa}| = N - 1$ .

Пусть элемент  $\bar{\kappa} \in \Omega \setminus \Theta$  фиксирован. Рассмотрим произвольное решение  $a_1(z), \dots, a_m(z)$  системы (0.10). Для него выполнено

$$D^n(\bar{a}^{\bar{\kappa}}(z) P_{\bar{\kappa}}(z)) = \frac{d^n}{dz^n}(\bar{a}^{\bar{\kappa}}(z) P_{\bar{\kappa}}(z)).$$

Положим

$$\begin{aligned} b_1(z) &= \dots = b_{\kappa_1}(z) = a_1(z); \\ b_{\kappa_1+1}(z) &= \dots = b_{\kappa_1+\kappa_2}(z) = a_2(z); \\ &\dots\dots\dots; \\ b_{\kappa_1+\dots+\kappa_{m-1}+1}(z) &= \dots = b_{N-1}(z) = a_m(z); \\ b_N(z) &= P_{\bar{\kappa}}(z). \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} \frac{d^n}{dz^n} (\bar{a}^{\bar{\kappa}}(z) P_{\bar{\kappa}}(z)) &= \frac{d^n}{dz^n} (b_1(z) \cdots b_N(z)) \\ &= \sum_{\substack{n_1, \dots, n_N \geq 0 \\ n_1 + \dots + n_N = n}} \frac{n!}{n_1! \cdots n_N!} b_1^{(n_1)}(z) \cdots b_N^{(n_N)}(z). \end{aligned} \quad (1.7)$$

Если  $b_i(z) = a_j(z)$  для некоторого  $j$ ,  $1 \leq j \leq m$ , то

$$b_i^{(n_i)}(z) = \sum_{l=1}^m S_{jl}^{[n_i]}(z) a_l(z)$$

согласно уравнениям (0.11). Поэтому вклад каждого такого множителя из (1.7) в коэффициент при  $\bar{a}^{\bar{\kappa}^*}(z)$ , где  $\bar{\kappa}^* = (N-1)\bar{e}_{l^*}$ , будет в точности равен  $S_{jl^*}^{[n_i]}(z)$ , и, следовательно, этот коэффициент будет равен

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{n_1, \dots, n_N \geq 0 \\ n_1 + \dots + n_N = n}} \frac{n!}{n_1! \cdots n_N!} S_{1l^*}^{[n_1]}(z) \cdots S_{1l^*}^{[n_{\kappa_1}]}(z) S_{2l^*}^{[n_{\kappa_1+1}]}(z) \cdots S_{2l^*}^{[n_{\kappa_1+\kappa_2}]}(z) \cdots \\ \times S_{ml^*}^{[n_{\kappa_1+\dots+\kappa_{m-1}+1}]}(z) \cdots S_{ml^*}^{[n_{N-1}]}(z) P_{\bar{\kappa}}^{(n_N)}(z). \end{aligned}$$

Таким образом,

$$P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}(z) = \sum_{\bar{\kappa}: |\bar{\kappa}|=N-1} \sum_{\substack{n_1, \dots, n_N \geq 0 \\ n_1 + \dots + n_N = n}} w(\bar{\kappa}; n_1, \dots, n_N), \quad (1.8)$$

где

$$\begin{aligned} w(\bar{\kappa}; n_1, \dots, n_N) &= \frac{T^{n_1}(z) S_{1l^*}^{[n_1]}(z)}{n_1!} \cdots \frac{T^{n_{\kappa_1}}(z) S_{1l^*}^{[n_{\kappa_1}]}(z)}{n_{\kappa_1}!} \\ &\times \frac{T^{n_{\kappa_1+1}}(z) S_{2l^*}^{[n_{\kappa_1+1}]}(z)}{n_{\kappa_1+1}!} \cdots \frac{T^{n_{\kappa_1+\kappa_2}}(z) S_{2l^*}^{[n_{\kappa_1+\kappa_2}]}(z)}{n_{\kappa_1+\kappa_2}!} \cdots \\ &\times \frac{T^{n_{\kappa_1+\dots+\kappa_{m-1}+1}}(z) S_{ml^*}^{[n_{\kappa_1+\dots+\kappa_{m-1}+1}]}(z)}{n_{\kappa_1+\dots+\kappa_{m-1}+1}!} \cdots \frac{T^{n_{N-1}}(z) S_{ml^*}^{[n_{N-1}]}(z)}{n_{N-1}!} \\ &\times T^{n_N}(z) \frac{P_{\bar{\kappa}}^{(n_N)}(z)}{n_N!}. \end{aligned}$$

Упорядочим числа  $n_1, n_2, \dots, n_N$  в порядке убывания:  $n_{i_1} \geq n_{i_2} \geq \dots \geq n_{i_N}$ . Тогда, поскольку  $n_1 + n_2 + \dots + n_N = n$ , выполнены неравенства

$$n_{i_1} \leq n, n_{i_2} \leq \left[\frac{n}{2}\right], \dots, n_{i_N} \leq \left[\frac{n}{N}\right].$$

Следовательно,

$$H\left(\frac{T^{n_{i_j}}(z)S_{.l^*}^{[n_{i_j}]}(z)}{n_{i_j}!}\right) \leq C_1(2(t+1)^2H)^{n/j}, \quad j = 1, \dots, N, \quad i_j \neq N,$$

согласно лемме 1.2 и

$$H(T^{n_{i_j}}(z)) \leq ((t+2)H)^{n_{i_j}} \leq C_1(2(t+1)^2H)^{n/j}, \quad i_j = N.$$

Кроме того, для последовательности  $\{\psi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  из определения 2 ввиду (0.12) выполнено

$$\psi_{[n/j]} \frac{T^{n_{i_j}}(z)S_{.l^*}^{[n_{i_j}]}(z)}{n_{i_j}!} \in \mathbb{Z}[z], \quad j = 1, \dots, N, \quad i_j \neq N.$$

Поэтому и с учетом того, что

$$H\left(\frac{P_{\bar{\kappa}}^{(n_N)}(z)}{n_N!}\right) \leq \binom{M}{n_N} H(P_{\bar{\kappa}}) \leq \binom{M}{n} C_2^{(1+\varepsilon_1/2)M},$$

$$\frac{P_{\bar{\kappa}}^{(n_N)}(z)}{n_N!} \in \mathbb{Z}[z], \quad T^{n_N}(z) \in \mathbb{Z}[z],$$

$$n_N \leq n < M/2, \quad M > M_1(N, \varepsilon_1),$$

получаем:

$$\prod_{j=1}^N \psi_{[n/j]} \cdot w(\bar{\kappa}; n_1, \dots, n_N) \in \mathbb{Z}[z],$$

$$\bar{\kappa} \in \Omega \setminus \Theta, \quad n_1, \dots, n_N \geq 0, \quad n_1 + \dots + n_N = n < M/2,$$

и согласно леммам 1.2 и 1.1

$$\begin{aligned} \deg w(\bar{\kappa}; n_1, \dots, n_N) &\leq t(n_1 + \dots + n_{N-1}) \\ &\quad + (t+1)n_N + (M + tn_N - 1) \\ &\leq M + (2t+1)n - 1, \\ H(w(\bar{\kappa}; n_1, \dots, n_N)) &\leq (M + (2t+1)n)^{N+1} \cdot C_1^N (2(t+1)^2 H)^{ng_N} \\ &\quad \times \binom{M}{n} C_2^{(1+\varepsilon_1/2)M}, \end{aligned}$$

$$\bar{\kappa} \in \Omega \setminus \Theta, \quad n_1, \dots, n_N \geq 0, \quad n_1 + \dots + n_N = n < M/2,$$

где

$$g_N = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{N} \leq 1 + \log N.$$

Пользуясь представлением (1.8), находим, что для заданного  $\varepsilon_1 > 0$

$$\psi'_n \leq \prod_{j=1}^N \psi_{[n/j]} \leq (\gamma')^N \Psi^{(1+\varepsilon_1/2)ng_N} \leq C_3 \Psi^{(1+\varepsilon_1/2)n(1+\log N)},$$

$$n < M/2,$$

с некоторой постоянной  $C_3$ , зависящей только от  $N$  и  $\varepsilon_1$ ,

$$\begin{aligned} H(P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}) &\leq \binom{N+m-2}{N-1} \binom{n+N-1}{n} \cdot (M+(2t+1)n)^{N+1} \\ &\quad \times C_1^N (2(t+1)^2 H)^{ng_N} \cdot \binom{M}{n} C_2^{(1+\varepsilon_1/2)M} \\ &\leq C_6 (3M)^{2N} (2(t+1)^2 H)^{n(1+\log N)} \cdot \binom{M}{n} C_2^{(1+\varepsilon_1/2)M}, \\ &\quad C_6 = C_6(N) > 0, \quad n < M/2, \end{aligned}$$

и для  $|\alpha| < 1$ ,  $M > M'_2(N, \varepsilon_1)$  выполнено

$$\begin{aligned} |P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}(\alpha)| &\leq (M+tn) H(P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}) \\ &\leq C_4 \binom{M}{n} (2(t+1)^2 H)^{n(1+\log N)} C_2^{(1+\varepsilon_1)M}, \quad n < M/2, \end{aligned}$$

с некоторой положительной постоянной  $C_4 = C_4(N)$ .

Если положить

$$P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}(z) = \sum_{\nu=0}^{M+tn-1} P_{\bar{\kappa}^*, \nu}^{[n]} z^\nu, \quad n \in \mathbb{Z}^+,$$

то

$$\begin{aligned} R_{\bar{s}^*}^{[n]}(z) - P_{\bar{s}^*}^{[n]}(z) &= P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}(z) f_{l^*}(z) = \sum_{\mu=0}^{\infty} \sum_{\nu=0}^{\min\{\mu, M+tn-1\}} P_{\bar{\kappa}^*, \nu}^{[n]} f_{l^*, \mu-\nu} z^\mu, \\ &\quad n \in \mathbb{Z}^+. \end{aligned}$$

Поскольку

$$\deg P_{\bar{s}^*}^{[n]}(z) \leq M + tn - 1 < K - n \leq \operatorname{ord}_{z=0} R_{\bar{s}^*}^{[n]}(z), \quad n < \frac{K - M}{t + 1},$$

имеем:

$$\begin{aligned} R_{\bar{s}^*}^{[n]}(z) &= \sum_{\mu=K-n}^{\infty} \sum_{\nu=0}^{M+tn-1} P_{\bar{\kappa}^*, \nu}^{[n]} f_{l^*, \mu-\nu} z^{\mu}; \\ P_{\bar{s}^*}^{[n]}(z) &= - \sum_{\mu=0}^{M+tn-1} \sum_{\nu=0}^{\mu} P_{\bar{\kappa}^*, \nu}^{[n]} f_{l^*, \mu-\nu} z^{\mu}, \end{aligned} \quad n < \frac{K - M}{t + 1}.$$

Отсюда для  $M > M_2''(N, \varepsilon_1)$ ,  $|\alpha| < 1/(2C)$  получаем:

$$\begin{aligned} |R_{\bar{s}^*}^{[n]}(\alpha)| &\leq (M + tn) H(P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}) \sum_{\mu=K-n}^{\infty} C^{(1+\varepsilon_1/8)\mu} |\alpha|^{\mu} \\ &\leq (M + tn) H(P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}) C^{\varepsilon_1(K-n)/8} (C|\alpha|)^{K-n} \sum_{\mu=0}^{\infty} \left( \frac{C^{1+\varepsilon_1/8}}{2C} \right)^{\mu} \\ &\leq (M + tn) H(P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}) C^{\varepsilon_1 M/4} (C|\alpha|)^{K-n} \sum_{\mu=0}^{\infty} \left( \frac{2}{3} \right)^{\mu} \\ &\leq C_5 \binom{M}{n} (2(t+1)^2 H)^{n(1+\log N)} C_2^{(1+\varepsilon_1)M} (C|\alpha|)^{K-n}, \end{aligned} \quad n < \frac{K - M}{t + 1},$$

и

$$\varphi_{M+tn} \psi_n' P_{\bar{s}^*}^{[n]}(z) = - \sum_{\mu=0}^{M+tn-1} \sum_{\nu=0}^{\mu} \psi_n' P_{\bar{\kappa}^*, \nu}^{[n]} \cdot \varphi_{M+tn} f_{l^*, \mu-\nu} z^{\mu} \in \mathbb{Z}[z].$$

Осталось положить  $M_2(N, \varepsilon_1) = \max\{M_2'(N, \varepsilon_1), M_2''(N, \varepsilon_1)\}$ .

Лемма доказана полностью.

## § 2. Переход к числовым линейным формам

ЛЕММА 2.1. При  $M > M_3(N)$  функциональный определитель

$$\det \left( P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) \right)_{n=0,1,\dots,\omega-1; \bar{\kappa} \in \Omega} \quad (2.1)$$

отличен от нуля.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО этого факта повторяет общую схему доказательства леммы 3.3 главы I, однако, значительно проще последнего.

Предположим, что определитель (2.1) равен нулю тождественно, т.е. ранг совокупности форм  $R^{[0]}(z; \bar{a}), R^{[1]}(z; \bar{a}), R^{[2]}(z; \bar{a}), \dots$  равен  $\tilde{\omega}$ ,  $1 \leq \tilde{\omega} < \omega$ . Согласно лемме 6 [20, гл. 3] это означает линейную независимость функциональных форм

$$R^{[n]}(z; \bar{a}) = \sum_{\bar{\kappa}: |\bar{\kappa}|=N} \bar{a}^{\bar{\kappa}} P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) + \sum_{\bar{\kappa}: |\bar{\kappa}|=N-1} \bar{a}^{\bar{\kappa}} P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) \sum_{j=1}^m a_j f_j(z),$$

$$n = 0, 1, \dots, \tilde{\omega} - 1,$$

Таким образом, в матрице

$$\left( P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) \right)_{n=0,1,\dots,\tilde{\omega}-1; \bar{\kappa} \in \Omega}$$

(ранга  $\tilde{\omega}$ ) можно выбрать  $\tilde{\omega}$  линейно независимых столбцов. Если делать такой выбор последовательно двигаясь “слева направо” (в лексикографическом порядке) по столбцам с номерами  $\bar{\kappa} \in \Omega$ , то базисные столбцы будут иметь номера из некоторого множества  $\tilde{\Omega} \subset \Omega$ , причем с некоторыми рациональными функциями

$$D_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'}(z) \in \mathbb{C}(z), \quad \bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}, \quad \bar{\kappa}' \in \Omega \setminus \tilde{\Omega}, \quad (2.2)$$

$$D_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'}(z) \equiv 0, \quad \bar{\kappa}' \prec \bar{\kappa},$$

выполняются равенства

$$P_{\bar{\kappa}'}^{[n]}(z) = \sum_{\bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}} P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) D_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'}(z) = \sum_{\substack{\bar{\kappa} \in \tilde{\Omega} \\ \bar{\kappa} \prec \bar{\kappa}'}} P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z) D_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'}(z),$$

$$n = 0, 1, \dots, \tilde{\omega} - 1, \quad \bar{\kappa}' \in \Omega \setminus \tilde{\Omega}.$$

Таким образом,

$$\Delta = \Delta(z) = \det(P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z))_{n=0,1,\dots,\tilde{\omega}-1; \bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}} \neq 0,$$

и согласно лемме 1.4а) находим, что

$$\deg \Delta < \tilde{\omega} M + \frac{\tilde{\omega}(\tilde{\omega} - 1)}{2} t. \quad (2.3)$$

Как уже отмечалось в главе I, рациональные функции  $D_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'}$ ,  $\bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}$ ,  $\bar{\kappa}' \in \Omega \setminus \tilde{\Omega}$ , могут быть представлены в виде

$$D_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'} = -\frac{\lambda_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'}}{\lambda}, \quad \lambda \neq 0, \quad \bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}, \quad \bar{\kappa}' \in \Omega \setminus \tilde{\Omega}, \quad (2.4)$$

где  $\lambda$  и  $\lambda_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'}$  – миноры порядка  $(\omega - \tilde{\omega})$  некоторой фундаментальной матрицы решений системы

$$\frac{d}{dz} x_{\bar{\kappa}} = - \sum_{l,j=1}^m \kappa_j Q_{lj}(z) x_{\bar{\kappa} - \bar{e}_j + \bar{e}_l} + (N - |\bar{\kappa}|) \sum_{l=1}^m Q_{l0}(z) x_{\bar{\kappa} + \bar{e}_l}, \quad \bar{\kappa} \in \Omega, \quad (2.5)$$

порядка  $\omega$ . В доказательстве леммы 8 [20, гл. 3, с. 102–103] было показано, что сумма степеней числителя каждой рациональной функции (2.4)

и их общего знаменателя не превосходит некоторой постоянной  $C_7$ , зависящей только от системы линейных дифференциальных уравнений (2.5), которая, в свою очередь, однозначно определяется системой (0.5) и числом  $N$ . Но ввиду линейной независимости функций  $1, f_1(z), \dots, f_m(z)$  над  $\mathbb{C}(z)$  по лемме 3 [20, гл. 3] система (0.5) определена функциями  $f_1(z), \dots, f_m(z)$  однозначно. Поэтому  $C_7 = C_7(f_1, \dots, f_m; N)$ .

Сравнивая коэффициенты при  $\bar{a}^{\bar{s}}, \bar{s} \in \Theta$ , в (1.2), согласно (1.5) и (1.6) получаем:

$$\begin{aligned} R_{\bar{s}}^{[n]}(z) &= P_{\bar{s}}^{[n]}(z) + \sum_{j=1}^m P_{\bar{s}-\bar{e}_j}^{[n]}(z) f_j(z) \\ &= \sum_{\bar{k} \in \Omega} P_{\bar{k}}^{[n]}(z) x_{\bar{k}, \bar{s}}(\bar{f}), \quad n = 0, 1, \dots, \tilde{\omega} - 1, \quad \bar{s} \in \Theta, \end{aligned}$$

где функции  $x_{\bar{k}, \bar{s}}(\bar{f}), \bar{k} \in \Omega, \bar{s} \in \Theta$ , определяются равенствами

$$\begin{aligned} x_{\bar{k}, \bar{s}}(\bar{f}) &= \delta_{\bar{k}, \bar{s}}, & \text{если } |\bar{k}| = N; \\ x_{\bar{k}, \bar{s}}(\bar{f}) &= \sum_{j=1}^m \delta_{\bar{k} + \bar{e}_j, \bar{s}} f_j(z), & \text{если } |\bar{k}| = N - 1, \quad \bar{s} \in \Theta. \end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{aligned} R_{\bar{s}}^{[n]}(z) &= \sum_{\bar{k} \in \tilde{\Omega}} P_{\bar{k}}^{[n]}(z) x_{\bar{k}, \bar{s}}(\bar{f}) + \sum_{\bar{k}' \in \Omega \setminus \tilde{\Omega}} P_{\bar{k}'}^{[n]}(z) x_{\bar{k}', \bar{s}}(\bar{f}) \\ &= \sum_{\bar{k} \in \tilde{\Omega}} P_{\bar{k}}^{[n]}(z) \left( x_{\bar{k}, \bar{s}}(\bar{f}) + \sum_{\bar{k}' \in \Omega \setminus \tilde{\Omega}} D_{\bar{k}, \bar{k}'}(z) x_{\bar{k}', \bar{s}}(\bar{f}) \right) \\ &= \sum_{\bar{k} \in \tilde{\Omega}} P_{\bar{k}}^{[n]}(z) \tilde{x}_{\bar{k}, \bar{s}}(\bar{f}), \quad n = 0, 1, \dots, \tilde{\omega} - 1, \quad \bar{s} \in \Theta, \quad (2.6) \end{aligned}$$

где

$$\tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{s}}(\bar{f}) = x_{\bar{\kappa}, \bar{s}}(\bar{f}) + \sum_{\bar{\kappa}' \in \Omega \setminus \tilde{\Omega}} D_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'}(z) x_{\bar{\kappa}', \bar{s}}(\bar{f}), \quad \bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}, \quad \bar{s} \in \Theta.$$

Согласно предложению 2.1 (и лемме 4.1 в случае  $m = 2$ ) главы I для множества  $\tilde{\Omega} \subset \Omega$  найдутся множества  $\Omega_1 \subset \tilde{\Omega}$  и  $\Theta_1 \subset \Theta$ , для которых

$$\det(\tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{s}}(\bar{f}))_{\bar{\kappa} \in \Omega_1; \bar{s} \in \Theta_1} \neq 0, \quad (2.7)$$

и величина  $\tilde{\theta} = \text{Card } \Omega_1 = \text{Card } \Theta_1$  удовлетворяет неравенству

$$\frac{\tilde{\omega}}{\tilde{\theta}} \leq \frac{\omega - \frac{1}{N+m-1}}{\theta} \leq \frac{\omega - \varepsilon - \frac{\varepsilon}{N+m-1}}{\theta}.$$

Обозначая через  $D(z)$  наименьший общий знаменатель рациональных функций (2.2), получаем, что определитель  $\chi = \chi(z, f_1(z), \dots, f_m(z))$  матрицы

$$(D(z)\tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{s}}(\bar{f}) \mid \delta_{\bar{\kappa}, \bar{r}})_{\bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}; \bar{s} \in \Theta_1, \bar{r} \in \tilde{\Omega} \setminus \Omega_1}, \quad (2.8)$$

с точностью до знака равный произведению  $D^{\tilde{\theta}}(z)$  и (2.7), есть отличный от нуля многочлен от функций  $f_1(z), \dots, f_m(z)$  с коэффициентами из  $\mathbb{C}[z]$ . В то же время

$$\deg D(z) < C_7, \quad \deg(D(z) \cdot D_{\bar{\kappa}, \bar{\kappa}'}(z)) < C_7, \quad \bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}, \quad \bar{\kappa}' \in \Omega \setminus \tilde{\Omega},$$

и функции  $D(z)\tilde{x}_{\bar{\kappa}, \bar{s}}(\bar{f})$ ,  $\bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}$ ,  $\bar{s} \in \Theta_1$ , являются линейными формами от  $1, f_1(z), \dots, f_m(z)$  с коэффициентами из  $\mathbb{C}[z]$  и оценкой  $C_7$  на степени этих коэффициентов. Поэтому степень  $\chi$  как многочлена от  $z$

не выше  $\tilde{\theta}C_7$  и по лемме 4 [20, гл. 3] порядок нуля  $\chi(z)$  как линейной формы от всевозможных мономов  $f_1^{\nu_1}(z) \cdots f_m^{\nu_m}(z)$  степени не выше  $\tilde{\theta}$  в точке  $z = 0$  ограничен сверху некоторой положительной постоянной  $C_8 = C_8(f_1, \dots, f_m; \tilde{\theta}; \tilde{\theta}C_7) = C_8(f_1, \dots, f_m; N)$ .

Умножим теперь матрицу

$$(P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z))_{n=0,1,\dots,\tilde{\omega}-1; \bar{\kappa} \in \tilde{\Omega}},$$

определитель которой равен  $\Delta$ , справа на матрицу (2.8) и согласно соотношениям (2.6) получим матрицу

$$(D(z)R_{\bar{s}}^{[n]}(z) \mid P_{\bar{r}}^{[n]}(z))_{n=0,1,\dots,\tilde{\omega}-1; \bar{s} \in \Theta_1, \bar{r} \in \tilde{\Omega} \setminus \Omega_1}.$$

Ее определитель равен  $\Delta\chi \neq 0$ . В первых  $\tilde{\theta}$  столбцах этой матрицы стоят функции, порядок нуля которых в точке  $z = 0$  не ниже  $K - \tilde{\omega}$  по лемме 1.4б). Таким образом,

$$\text{ord}_{z=0} \Delta\chi \geq \tilde{\theta}(K - \tilde{\omega}).$$

С другой стороны,

$$\text{ord}_{z=0} \Delta\chi = \text{ord}_{z=0} \Delta + \text{ord}_{z=0} \chi \leq \text{ord}_{z=0} \Delta + C_8,$$

и значит,

$$\text{ord}_{z=0} \Delta > \tilde{\theta}(K - \tilde{\omega}) - C_8. \quad (2.9)$$

Отсюда и согласно (2.3) имеем:

$$\begin{aligned}
0 \leq \deg \Delta - \operatorname{ord}_{z=0} \Delta &< \tilde{\omega} M - \tilde{\theta} K + \frac{\tilde{\omega}(\tilde{\omega} - 1)}{2} t + \tilde{\theta} \tilde{\omega} + C_8 \\
&\leq \tilde{\omega} M - \tilde{\theta} \frac{\omega - \varepsilon}{\theta} M + C_9 \\
&\leq \tilde{\theta} \frac{\omega - \varepsilon - \frac{\varepsilon}{N+m-1}}{\theta} M - \tilde{\theta} \frac{\omega - \varepsilon}{\theta} M + C_9 \\
&= -\frac{\tilde{\theta}}{\theta} \cdot \frac{\varepsilon}{N+m-1} M + C_9 \\
&\leq -\frac{\varepsilon}{\theta(N+m-1)} M + C_9, \\
C_9 &= C_9(f_1, \dots, f_m; N). \quad (2.10)
\end{aligned}$$

Поскольку величины  $\varepsilon$  и  $N + m - 1$  положительны, для всех  $M > M_3(\varepsilon, N) = M_3(N)$  неравенство (2.10) становится противоречивым. Следовательно, при этих значениях  $M$  предположение о том, что определитель (2.1) равен нулю, неверно. Это завершает доказательство леммы.

**ЛЕММА 2.2.** *При  $M > M_3(N)$  справедливо равенство*

$$\Delta(z) = \det(P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(z))_{n=0,1,\dots,\omega-1; \bar{\kappa} \in \Omega} = z^{\operatorname{ord}_{z=0} \Delta} \Delta_0(z),$$

где  $\Delta_0(z)$  – многочлен,  $\Delta_0 \neq 0$  и  $\deg \Delta_0 < \varepsilon M + C_{10}$ , где положительная постоянная  $C_{10}$  зависит только от  $N$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Воспользуемся неравенствами (2.3) и (2.9) с  $\tilde{\omega} = \omega$ ,  $\tilde{\theta} = \theta$ :

$$\deg \Delta_0 = \deg \Delta - \operatorname{ord}_{z=0} \Delta < \omega M + \frac{\omega(\omega - 1)}{2} t - \theta(K - \omega) + C_8 \leq \varepsilon M + C_{10},$$

что и требовалось.

Следующие два утверждения (второе является непосредственным следствием первого) реализуют переход от построенных градуированных приближений Паде к приближающим числовым линейным формам. Доказательство первой леммы осуществляется с помощью ставших уже стандартными рассуждений Зигеля, и поэтому опускается (см., например, доказательство леммы 10 [20, гл. 3]).

**ЛЕММА 2.3.** *При  $M > M_3(N)$  ранг числовой матрицы*

$$\left( P_{\bar{\kappa}}^{[n]}(\alpha) \right)_{n=0,1,\dots,\omega+[\varepsilon M]+C_{10}; \bar{\kappa} \in \Omega}$$

*равен в точности  $\omega$ .*

**ЛЕММА 2.4.** *При  $M > M_3(N)$  ранг числовой матрицы*

$$\left( P_{\bar{s}^*}^{[n]}(\alpha) \quad P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}(\alpha) \right)_{n=0,1,\dots,\omega+[\varepsilon M]+C_{10}},$$

*где, как и раньше,  $\bar{s}^* = N\bar{e}_{l^*}$ ,  $\bar{\kappa}^* = (N-1)\bar{e}_{l^*}$ , равен двум.*

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 3.** Выберем по заданным  $\eta > \eta_0$  и  $\varepsilon > 0$  число  $\varepsilon_1(\eta, \varepsilon, \alpha) > 0$  таким образом, чтобы для постоянной

$$C_{11} = b^{(t+1)\varepsilon_1} (C|\alpha|)^{-\varepsilon\varepsilon_1} C_0^{1+\varepsilon_1}$$

выполнялось неравенство

$$\begin{aligned} \eta_1 &= \frac{\eta + \eta_0}{2} \\ &> \frac{(1+t\varepsilon)\log b + \log C_{11}}{(1-(m+t+1)\varepsilon)\log b - \log C_{11} - (2-(m+1)\varepsilon)\log(C|a|)}. \end{aligned} \tag{2.11}$$

Положим

$$\begin{aligned} M_* &= M_*(N, \varepsilon_1, \alpha) \\ &= \max \left\{ M_2(N, \varepsilon_1), M_3(N), \frac{\log(C_3 C_4 C_5)}{\varepsilon_1 \log b}, \frac{(2 + \varepsilon_1)(C_{10} + \omega)}{\varepsilon \varepsilon_1} \right\}. \end{aligned}$$

Тогда при любых натуральных  $M > M_*$  справедливы утверждения лемм 1.5, 2.4 и неравенства

$$C_3 C_4 C_5 \leq b^{\varepsilon_1 M},$$

$$\varepsilon M + C_{10} + \omega < \left(1 + \frac{\varepsilon_1}{2}\right)(\varepsilon M + C_{10} + \omega) \leq (1 + \varepsilon_1)\varepsilon M.$$

Кроме того, при всех  $M > M_*$  и  $n < \varepsilon M + C_{10} + \omega$  выполняются неравенства

$$\begin{aligned} \binom{M}{n} &= \frac{(M - n + 1) \cdots (M - 1)M}{n!} < \frac{M^n}{(n/e)^n} \leq \left(\frac{e}{\varepsilon}\right)^{\varepsilon M + C_{10} + \omega} \\ &\leq \exp\{(1 - \log \varepsilon)(1 + \varepsilon_1)\varepsilon M\}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K - n &\geq \left(\frac{\omega - \varepsilon}{\theta} - \varepsilon - \varepsilon \varepsilon_1\right)M = \left(2 - \frac{m - 1}{N + m - 1} - \frac{\varepsilon}{\theta} - \varepsilon - \varepsilon \varepsilon_1\right)M \\ &\geq \left(2 - \frac{m - 1}{\frac{1}{\varepsilon} - 1} - \varepsilon\left(1 + \frac{1}{m}\right) - \varepsilon \varepsilon_1\right)M \geq (2 - (m + 1)\varepsilon - \varepsilon \varepsilon_1)M. \end{aligned}$$

Поэтому для заданной  $C_{11} > C_0$  и всех  $M > M_*$  при  $n < \varepsilon M + C_{10} + \omega$  согласно лемме 1.5 справедливы оценки:

$$\begin{aligned} \varphi_{M+tn} \psi'_n b^{M+tn} |P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}(\alpha)| &\leq (b^{1+t\varepsilon} (C|\alpha|)^{\varepsilon \varepsilon_1} C_{11})^M \leq (b^{1+t\varepsilon} C_{11})^M, \\ \varphi_{M+tn} \psi'_n b^{M+tn} |R_{\bar{s}^*}^{[n]}(\alpha)| &\leq (b^{1+t\varepsilon} (C|\alpha|)^{\varepsilon \varepsilon_1} C_{11})^M (C|\alpha|)^{K-n} \\ &\leq (b^{1+t\varepsilon} C_{11} (C|a/b|)^{2-(m+1)\varepsilon})^M. \end{aligned} \tag{2.12}$$

Возьмем теперь

$$q_* = \max \left\{ \frac{1}{2} \exp \left\{ \frac{(1+t\varepsilon) \log b + \log C_{11}}{\eta_1} M_* \right\}, \right. \\ \left. \exp \left\{ \frac{(\eta_1 + 1) \log 2 + (1+t\varepsilon) \log b + \log C_{11}}{\eta - \eta_1} \right\} \right\}.$$

Тогда, полагая для произвольной числовой линейной формы  $r = qf_{l^*}(\alpha) - p$ ,  $p \in \mathbb{Z}$ ,  $q \in \mathbb{N}$ ,  $q > q_*$ ,

$$M = \left[ \frac{\eta_1 \log(2q)}{(1+t\varepsilon) \log b + \log C_{11}} \right] + 1, \quad (2.13)$$

получим, что  $M > M_*$ . Кроме того, при  $q > q_*$  выполняется неравенство

$$M \cdot ((1+t\varepsilon) \log b + \log C_{11}) \leq \eta_1 \log(2q) + (1+t\varepsilon) \log b + \log C_{11} \\ < \eta \log q - \log 2. \quad (2.14)$$

Согласно лемме 2.4 для  $M > M_*$  существует  $n < \varepsilon M + C_{10} + \omega$  такое, что

$$qP_{\bar{s}^*}^{[n]}(\alpha) + pP_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}(\alpha) \neq 0.$$

Тогда

$$P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}(\alpha)r = -(qP_{\bar{s}^*}^{[n]}(\alpha) + pP_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}(\alpha)) + q(P_{\bar{s}^*}^{[n]}(\alpha) + P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}(\alpha)f_{l^*}(\alpha))$$

и поскольку

$$\varphi_{M+tn} \psi'_n b^{M+tn} (qP_{\bar{s}^*}^{[n]}(a/b) + pP_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}(a/b))$$

является целым числом, отличным от нуля,

$$\varphi_{M+tn} \psi'_n b^{M+tn} |P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}(\alpha)| \cdot |r| \geq 1 - \varphi_{M+tn} \psi'_n b^{M+tn} |R_{\bar{s}^*}^{[n]}(\alpha)| \cdot q.$$

Согласно оценкам (2.12) и выбору (2.11), (2.13) имеем:

$$\begin{aligned} \varphi_{M+tn} \psi'_n b^{M+tn} |R_{\bar{s}^*}^{[n]}(\alpha)| &\leq \exp \left\{ M \cdot \left( -(1 - (m + t + 1)\varepsilon) \log b \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \log C_{11} + (2 - (m + 1)\varepsilon) \log(C|a|) \right) \right\} \\ &\leq \exp \left\{ -\frac{\eta_1 \log(2q)}{(1 + t\varepsilon) \log b + \log C_{11}} \right. \\ &\quad \left. \times \frac{(1 + t\varepsilon) \log b + \log C_{11}}{\eta_1} \right\} \\ &= \frac{1}{2} q^{-1}, \end{aligned}$$

откуда

$$\varphi_{M+tn} \psi'_n b^{M+tn} |P_{\bar{\kappa}^*}^{[n]}(\alpha)| \cdot |r| \geq \frac{1}{2}.$$

С помощью оценок (2.12), выбора (2.13) и неравенства (2.14) получаем:

$$|r| \geq \frac{1}{2} \exp \left\{ -M \cdot ((1 + t\varepsilon) \log b + \log C_{11}) \right\} > q^{-\eta}.$$

Последнее неравенство завершает доказательство теоремы 3.

### § 3. Рациональные приближения обобщенных полилогарифмов

Рассматриваются функции

$$f_l(z) = \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{z^\nu}{(\nu + \lambda)^l}, \quad l = 1, \dots, m, \quad \lambda \in \mathbb{Q} \setminus \{-1, -2, \dots\}, \quad (3.1)$$

(обобщенные полилогарифмы).

**ЛЕММА 3.1.** *Функции (3.1) алгебраически независимы над  $\mathbb{C}(z)$ .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО этого утверждения проводится с помощью так называемого “арифметического” метода (см. [20, гл. 8]). Пусть  $\lambda = a/b$ , где  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $b \in \mathbb{N}$  – взаимно простые числа. Обозначим через  $t$  произвольное натуральное число. По теореме Дирихле в арифметической прогрессии  $\{a + b\nu\}_{\nu=0}^{\infty}$  содержится бесконечное множество простых чисел. Поэтому можно выбрать натуральное  $\mu > \max\{t, -2a/b\}$  такое, что число  $a + b\mu$  является простым. Тогда точные знаменатели чисел

$$\frac{1}{(\mu + \lambda)^l} = \frac{b^\mu}{(a + b\mu)^l}, \quad l = 1, \dots, m,$$

содержат простое число  $a + b\mu$  в степенях  $l$ ,  $l = 1, \dots, m$ , соответственно, и в то же время знаменатели чисел

$$\frac{1}{(\nu + \lambda)^l} = \frac{b^\nu}{(a + b\nu)^l}, \quad \nu = 0, 1, \dots, \mu - 1, \quad l = 1, \dots, m,$$

не делятся на число  $a + b\mu$  в силу его простоты и поскольку  $a + b\mu > |a + b\nu|$  для всех  $\nu = 0, 1, \dots, \mu - 1$ . Полагая в лемме 1 [20, гл. 8]  $u = 0$ ,  $\varphi_0(z) = z$ ,  $v = m$ ,  $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$ , получаем, что функции  $z, f_1(z), \dots, f_m(z)$  алгебраически независимы над  $\mathbb{C}$ . Лемма доказана.

*ЛЕММА 3.2. Для взаимно простых  $a \in \mathbb{Z}$  и  $b \in \mathbb{N}$  через  $D_n$  обозначим наименьшее общее кратное чисел*

$$a + b\mu, \quad \mu = 1, \dots, n.$$

*Тогда*

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\log D_n}{n} \leq \rho(b),$$

*где функция  $\rho(b)$  определяется равенством (0.17).*

Доказательство этого факта мы заимствуем из работы [24] (см. доказательство теоремы 7.1). Не ограничивая общности, считаем  $a > 0$ , поскольку утверждение леммы можно доказывать с заменой  $a$  на  $a + b\nu > 0$  для некоторого фиксированного  $\nu \in \mathbb{N}$ .

Пусть  $n \in \mathbb{N}$  и разложение  $D_n$  на простые множители имеет вид

$$D_n = \prod p^{\tau_p},$$

где, очевидно, с некоторым  $\mu$ ,  $1 \leq \mu \leq n$ , выполнено

$$\tau_p \leq \frac{\log(a + b\mu)}{\log p} \leq \frac{\log(a + bn)}{\log p}.$$

Поэтому

$$D_n \leq \prod p^{\log(a+bn)/\log p} \leq (a + bn)^{N_n},$$

где  $N_n$  есть количество простых чисел  $p$ , делящих  $a + b\mu$  для некоторого  $\mu$ ,  $1 \leq \mu \leq n$ . Следовательно,

$$N_n = \sum_{1 \leq j \leq b} N_{n,j} = \sum_{\substack{1 \leq j \leq b \\ (j,b)=1}} N_{n,j} + \sum_{\substack{1 \leq j \leq b \\ (j,b)>1}} N_{n,j}, \quad (3.2)$$

где  $N_{n,j}$  есть количество простых чисел  $p$ , удовлетворяющих сравнению  $p \equiv j \pmod{b}$  и делящих  $a + b\mu$  для некоторого  $\mu$ ,  $1 \leq \mu \leq n$ . Пусть простое  $p$  удовлетворяет последним двум условиям. Если  $(j, b) > 1$ , то из сравнения  $p \equiv j \pmod{b}$  вытекает, что  $(p, b) > 1$ , т.е.  $p$  является делителем числа  $b$  и равенство (3.2) можно записать в виде

$$N_n = \sum_{\substack{1 \leq j \leq b \\ (j,b)=1}} N_{n,j} + O(1),$$

где значение постоянной  $O(1)$  не превосходит количества делителей  $b$ . Если  $(j, b) = 1$ , то для некоторых натуральных  $u, v$  выполнено  $p - j = ub$  и  $pv = a + b\mu$ . Тогда  $ju \equiv a \pmod{b}$ , и значит,  $v \geq i_j$ , где  $i_j$  – единственное целое решение сравнения  $ji_j \equiv a \pmod{b}$  в интервале  $1 \leq i_j \leq b$ . Следовательно,

$$p = \frac{a + b\mu}{v} \leq \frac{a + bn}{i_j}$$

и

$$N_{n,j} \leq \pi((a + bn)/i_j, b, j),$$

где  $\pi(x, b, j)$  обозначает число простых  $p$ , не превосходящих  $x$ , таких, что  $p \equiv j \pmod{b}$ . По теореме о распределении простых чисел в арифметической прогрессии имеем

$$\pi((a + bn)/i_j, b, j) \sim \frac{(a + bn)/i_j}{\varphi(b) \log((a + bn)/i_j)} \sim \frac{b}{i_j \varphi(b)} \cdot \frac{n}{\log(a + bn)}$$

при  $n \rightarrow \infty$ . Окончательно получаем:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\log D_n}{n} \leq \sum_{\substack{1 \leq j \leq b \\ (j, b) = 1}} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{N_{n,j} \log(a + bn)}{n} \leq \frac{b}{\varphi(b)} \sum_{\substack{1 \leq j \leq b \\ (j, b) = 1}} \frac{1}{i_j}.$$

Осталось заметить, что когда  $j$  пробегает полную систему вычетов по модулю  $b$  соответствующие  $i_j$  также пробегают эту систему вычетов.

**ЛЕММА 3.3.** *Совокупность функций (3.1) принадлежит классу  $G(1, e^{m\rho(\text{den } \lambda)})$ .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Радиус сходимости степенных рядов (3.1) равен 1. Если  $\lambda = a/b$ ,  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $b \in \mathbb{N}$ , и последовательность  $\{D_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  для заданных  $a, b$  взята из леммы 3.2, то

$$\frac{D_n^m}{(\nu + \lambda)^l} \in \mathbb{Z}, \quad l = 1, \dots, m, \quad \nu = 1, \dots, n.$$

Осталось воспользоваться оценкой леммы 3.2.

Совокупность функций (3.1) удовлетворяет системе линейных дифференциальных уравнений

$$\frac{d}{dz} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{1-z} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{\lambda}{z} & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{z} & -\frac{\lambda}{z} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \frac{1}{z} & -\frac{\lambda}{z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}. \quad (3.3)$$

Поэтому матрица  $S = (S_{jl}(z))_{j,l=1,\dots,m}$  системы линейных дифференциальных уравнений (0.10) имеет вид  $S = \frac{1}{z}\Lambda$ , где

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda \end{pmatrix} \quad (3.4)$$

– числовая матрица.

ЛЕММА 3.4. Пусть матрица системы линейных дифференциальных уравнений (0.10) имеет вид  $S = \frac{1}{z}\Lambda$ , где  $\Lambda$  – числовая матрица. Тогда для матриц

$$S^{[n]} = (S_{jl}^{[n]}(z))_{j,l=1,\dots,m}, \quad n \in \mathbb{N},$$

систем линейных дифференциальных уравнений (0.11) справедливо представление

$$S^{[n]} = \frac{1}{z^n} \Lambda(\Lambda - E)(\Lambda - 2E) \cdots (\Lambda - (n-1)E), \quad n \in \mathbb{N}, \quad (3.5)$$

где  $E$  – единичная матрица размера  $m$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Будем доказывать утверждение леммы индукцией по  $n \in \mathbb{N}$ . При  $n = 1$  его истинность непосредственно вытекает из условия. Пусть представление (3.5) выполнено для некоторого  $n \in \mathbb{N}$ . Согласно рекуррентным соотношениям (0.13) имеем:

$$\begin{aligned} S^{[n+1]} &= \frac{d}{dz} S^{[n]} + S^{[n]} \cdot S \\ &= -\frac{n}{z^{n+1}} \Lambda(\Lambda - E)(\Lambda - 2E) \cdots (\Lambda - (n-1)E) \\ &\quad + \frac{1}{z^{n+1}} \Lambda(\Lambda - E)(\Lambda - 2E) \cdots (\Lambda - (n-1)E) \cdot \Lambda \\ &= \frac{1}{z^{n+1}} \Lambda(\Lambda - E)(\Lambda - 2E) \cdots (\Lambda - (n-1)E)(\Lambda - nE), \end{aligned}$$

что доказывает утверждение леммы для  $n + 1$ , а значит, и для всех натуральных  $n$ .

Определим целозначный многочлен

$$\Delta_n(\lambda) = \frac{\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2) \cdots (\lambda - n + 1)}{n!}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Согласно лемме 3.4 выполнено

$$\frac{z^n S^{[n]}}{n!} = \Delta_n(\Lambda), \quad n \in \mathbb{N}, \quad (3.6)$$

где матрица  $\Lambda$  определяется равенством (3.4).

ЛЕММА 3.5. Пусть матрица  $\Lambda$  определяется равенством (3.4).

Тогда

$$\Delta_n(\Lambda) = \begin{pmatrix} \varkappa_{0,n}(\lambda) & \varkappa_{1,n}(\lambda) & \varkappa_{2,n}(\lambda) & \dots & \varkappa_{m-1,n}(\lambda) \\ 0 & \varkappa_{0,n}(\lambda) & \varkappa_{1,n}(\lambda) & \dots & \varkappa_{m-2,n}(\lambda) \\ 0 & 0 & \varkappa_{0,n}(\lambda) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \varkappa_{1,n}(\lambda) \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \varkappa_{0,n}(\lambda) \end{pmatrix}, \quad n \in \mathbb{N},$$

где

$$\varkappa_{j,n}(\lambda) = \frac{(-1)^j}{j!} \Delta_n^{(j)}(\lambda), \quad j = 0, 1, \dots, m-1, \quad n \in \mathbb{N},$$

а дифференцирование ведется по переменной  $\lambda$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Запишем многочлен  $\Delta_n(\lambda)$  в виде

$$\Delta_n(\lambda) = \sum_{\nu=1}^n r_{\nu,n} \lambda^\nu, \quad n \in \mathbb{N},$$

и воспользуемся этим разложением с заменой  $\lambda$  на  $\Lambda$ :

$$\Delta_n(\Lambda) = \sum_{\nu=1}^n r_{\nu,n} \Lambda^\nu, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Поскольку матрица (3.4) имеет “почти жорданову” форму, ее степени выглядят достаточно просто, а именно:

$$\Lambda^\nu = \begin{pmatrix} \tau_{0,\nu}(\lambda) & \tau_{1,\nu}(\lambda) & \tau_{2,\nu}(\lambda) & \dots & \tau_{m-1,\nu}(\lambda) \\ 0 & \tau_{0,\nu}(\lambda) & \tau_{1,\nu}(\lambda) & \dots & \tau_{m-2,\nu}(\lambda) \\ 0 & 0 & \tau_{0,\nu}(\lambda) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \tau_{1,\nu}(\lambda) \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \tau_{0,\nu}(\lambda) \end{pmatrix}, \quad \nu \in \mathbb{N},$$

где

$$\tau_{j,\nu}(\lambda) = \begin{cases} (-1)^j \binom{\nu}{j} \lambda^{\nu-j}, & \text{если } j \leq \nu, \\ 0, & \text{если } j > \nu, \end{cases} \quad j = 0, 1, \dots, m-1, \quad \nu \in \mathbb{N}.$$

Таким образом, матрица  $\Delta_n(\Lambda)$  имеет треугольный вид, указанный в формулировке леммы 3.5, причем

$$\begin{aligned} \varkappa_{j,n} &= \sum_{\nu=1}^n r_{\nu,n} \tau_{j,\nu}(\lambda) = \frac{(-1)^j}{j!} \sum_{\nu=\max\{1,j\}}^n r_{\nu,n} \frac{\nu!}{(\nu-j)!} \lambda^{\nu-j} \\ &= \frac{(-1)^j}{j!} \Delta_n^{(j)}(\lambda), \quad j = 0, 1, \dots, m-1, \quad n \in \mathbb{N}, \end{aligned}$$

что и требовалось.

**ЛЕММА 3.6.** *Для  $\lambda = \frac{a}{b}$ ,  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $b \in \mathbb{N}$ ,  $(a, b) = 1$ , через  $E_n$  обозначим наименьший общий знаменатель чисел*

$$\frac{b^\mu \Delta_\mu^{(j)}(\lambda)}{j!}, \quad j = 0, 1, \dots, m-1, \quad \mu = 1, \dots, n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Тогда

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\log E_n}{n} \leq \chi(b) + m - 1,$$

где функция  $\chi(b)$  определяется равенством (0.17).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Полагая в теореме работы [7]  $L = H = n$ ,  $Q = b$ ,  $x = -a$ ,  $M = m - 1$ ,  $\Lambda = 1$ , получаем, что  $E_n$  делит число

$$\prod_{p|b} p^{\left[\frac{n}{p-1}\right]} \cdot D_n^{m-1}, \quad n \in \mathbb{N},$$

где  $D_n$  – наименьшее общее кратное чисел  $1, 2, \dots, n$ . Учитывая, что

$$\prod_{p|b} p^{\left[\frac{n}{p-1}\right]} \leq e^{n\chi(b)}, \quad n \in \mathbb{N},$$

и

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\log D_n}{n} \leq \rho(1) = 1$$

согласно лемме 3.2, получаем требуемое.

*ЛЕММА 3.7. Система однородных линейных дифференциальных уравнений, сопряженная к однородной части системы (3.3), принадлежит классу  $G(e^{\chi(\text{den } \lambda) + m - 1})$ .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО непосредственно следует из равенства (3.6), результатов лемм 3.5, 3.6 и того факта, что  $T_*(z) = \text{den } \lambda \cdot z$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СЛЕДСТВИЯ 2 получается теперь подстановкой результатов лемм 3.3, 3.7, неравенств (0.16) и  $t = 1$  в теорему 3 для функции  $f_m(z)$ .

## Литература

1. ГАЛОЧКИН А. И. Оценки снизу многочленов от значений аналитических функций одного класса // Математический сборник. 1974. Т. 95(137). № 3(11). С. 396–417.
2. ГАЛОЧКИН А. И. Оценки снизу линейных форм от значений некоторых  $G$ -функций // Математические заметки. 1975. Т. 18. № 4. С. 541–552.
3. GALOCHKIN A. I. On effective bounds for certain linear forms // New Advances in Transcendence Theory / ed. A. Baker. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 207–214.
4. ГАНТМАХЕР Ф. Р. Теория матриц. М.: Наука, 1983.
5. ЗУДИЛИН В. В. О рациональных приближениях значений одного класса целых функций // Математический сборник. 1995. Т. 186. № 4. С. 89–124.
6. ЗУДИЛИН В. В. О рациональных приближениях значений  $G$ -функций // II Международная конференция “Алгебраические, вероятностные, геометрические, комбинаторные и функциональные методы в теории чисел”. Тезисы докладов. Воронеж: ВГУ, 1995. С. 67.
7. МАТВЕЕВ Е. М. Об арифметических свойствах значений обобщенных биномиальных многочленов // Математические заметки. 1993. Т. 54. № 4. С. 76–81.
8. НГУЕН ТЪЕН ТАЙ. Об оценках порядков нулей многочленов от аналитических функций и их приложении к оценкам мер взаимной трансцендентности значений  $E$ -функций // Математический сборник. 1983. Т. 120(162). № 1. С. 112–142.
9. НЕСТЕРЕНКО Ю. В. Оценки порядков нулей функций одного класса и их приложение в теории трансцендентных чисел // Известия АН СССР. Серия математики. 1977. Т. 41. № 2. С. 253–284.
10. НЕСТЕРЕНКО Ю. В. Оценки числа нулей функций некоторых классов // Acta Arithmetica. 1989. Т. LIII. № 1. С. 29–46.

11. НУРМАГОМЕДОВ М. С. Об арифметических свойствах значений  $G$ -функций // Математический сборник. 1971. Т. 85 (127). № 3 (7). С. 339–365.
12. НУРМАГОМЕДОВ М. С., ЧИРСКИЙ В. Г. Об арифметических свойствах значений некоторых функций // Вестник МГУ. Серия 1. Математика, механика. 1973. № 1. Р. 19–26; № 2. Р. 38–45.
13. ОЛЕЙНИКОВ В. А. О дифференциальной неприводимости линейного неоднородного уравнения // Доклады АН СССР. 1970. Т. 194. № 5. С. 1017–1020.
14. САЛИХОВ В. Х. Критерий алгебраической независимости значений одного класса гипергеометрических  $E$ -функций // Математический сборник. 1990. Т. 181. № 2. С. 189–211.
15. САЛИХОВ В. Х. Неприводимость гипергеометрических уравнений и алгебраическая независимость значений  $E$ -функций // Acta Arithmetica. 1990. Т. LIII. № 5. С. 453–471.
16. СПРИНДЖУК В. Г. Метрическая теория диофантовых приближений. М.: Наука, 1977.
17. ШИДЛОВСКИЙ А. Б. Об оценках меры трансцендентности значений  $E$ -функций // Математические заметки. 1967. Т. 2. № 1. С. 33–44.
18. ШИДЛОВСКИЙ А. Б. Об оценках меры трансцендентности значений  $E$ -функций // Успехи математических наук. 1967. Т. 22. № 3 (135). С. 245–246.
19. SHIDLOVSKY A. B. On the estimates of the algebraic independence measures of the values of  $E$ -functions // Journal of Australian Mathematical Society. Series A. 1979. V. 27. P. 385–407.
20. ШИДЛОВСКИЙ А. Б. Трансцендентные числа. М.: Наука, 1987.
21. ANDRÉ Y.  $G$ -Functions and Geometry. Aspects of Mathematics. V. E13. Braunschweig: Vieweg, 1989.
22. CHUDNOVSKY D. V., CHUDNOVSKY G. V. Applications of Padé approximations to Diophantine inequalities in values of  $G$ -functions // Lecture Notes in Mathematics. 1985. V. 1135. P. 9–51.
23. CHUDNOVSKY G. V. On some applications of diophantine approximations // Proceedings of National Academy of Sciences USA. 1984. V. 81. March. P. 1926–1930.
24. НАТА М. On the linear independence of the values of polylogarithmic functions // Journal de Mathématiques pures et appliquées. 1990. V. 69. № 2. P. 133–173.

25. LANG S. Introduction to Transcendental Numbers. Reading: Addison Wesley Publishing Co., 1966.
26. SIEGEL C. L. Über einige Anwendungen diophantischer Approximationen // Abh. Preuss. Wiss. Phys.-Math. Kl. 1929–1930. № 1. P. 1–70.
27. SIEGEL C. L. Transcendental numbers. Princeton: Princeton University Press, 1949.

Оригинал-макет диссертации  
подготовлен автором с использованием  
издательской системы  $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}$ - $\text{T}\mathcal{E}\mathcal{X}$  &  $\mathcal{M}\mathcal{I}\mathcal{P}\mathcal{A}\mathcal{H}$ - $\text{T}\mathcal{E}\mathcal{X}$